

Yan təsirləri:

- Reaksiya (ağrı, şişlik, qızartı) enjeksiya yerində
- Baş ağrısı
- Yorgunluq,
- Əzələ ağrısı
- Taqətsizlik
- üşütmə
- Hərərət
- oynaqlarda ağrı
- Ürək bulanması
- Limfa düyünlərinin şişməsi (limfadenopati)



COVID-19-a qarşı vaksinlər pandemiyani dayandıрмаq üçün təsirli vasitədir!



Həkimə nə vaxt müraciət etməlisiniz?

Peyvənddən sonra səhhətinizlə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, ailə həkiminizə müraciət edin. Mümkün qədər qısa müddətdə ciddi yan təsirlər aşkar edildikdə, 112-yə zəng edin və ya ən yaxın tibb müəssisəsinə baş çəkin!

COVID-19 vaksinasiyası fərdi hüquq və ümümi məsuliyyətdir!



#vaksinçalışır
#StopCoV

StopCoV.ge; Moh.Gov.ge; NCDC.ge; 116 001; 15 05

StopCoV.ge



საქართველოს ექსპერტიზის ეროვნული ცენტრი
საქართველოს ექსპერტიზის ეროვნული ცენტრი
საქართველოს ექსპერტიზის ეროვნული ცენტრი



საქართველოს ექსპერტიზის ეროვნული ცენტრი
საქართველოს ექსპერტიზის ეროვნული ცენტრი
საქართველოს ექსპერტიზის ეროვნული ცენტრი



UNITED NATIONS
GEORGIA



Vaksinasiya özünüzü, ailənizi və cəmiyyətinizi COVID-19-dan qorumaq üçün doğru seçimdir!

Vaksin olunmaq könüllüdür



Peyvənd yoluxma, xəstəlik və ölüm riskini azaldır.



Artıq COVID-19 xəstəliyini keçirmiş olsanız belə vaksinasiya tövsiyə olunur



Pandemiyanı dayandırmaq üçün COVID-19 peyvəndi ilə paralel olaraq ən azı 1 metr məsafə və əl gigiyenasını qoruyaraq tibbi maska taxmağa davam etmək lazımdır.

COVID-19-un qarşısını almaq vaksinlər



COVID-19 peyvəndləri, rekord nəzərdə tutan qısa müddətdə yaradılmış, analoqu olmayan iş birliyinin və yatırımın nəticəsidir hansı ki, bütün təhlükəsizlik standartlarına tam uyğundur.



Gürcüstanda keyfiyyət, təhlükəsizlik və effektivliyə zəmanət verən yalnız ÜST və ya onun ciddi tənzimləyiciləri tərəfindən icazə verilən peyvəndlər tətbiq olunur.




COVID-19 peyvəndləri artıq 110-dən çox ölkədə və 280 milyondan çox dozada tətbiq edilmişdir.

COVID-19-un qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş vaksinlərin bir çoxu iki dozalıdır.

COVID-19 əleyhinə müxtəlif vaksinlər arasındakı interval interval fərqlidir və vaksinlə ilə əlaqəli şərhdə təsvir edilmişdir.

Tam immunitetin formalaşdırılması üçün peyvəndin hər iki dozası da vurulmalıdır.

Peyvəndin birinci dozasından ortaya çıxacaq mümkün yan təsirlər ikinci doza təqdirində əks təsir deyildir. İkinci doza qəbul etməmək qərarı həkim tərəfindən verilir.



İmuniteti inkişaf etdirmək üçün vaxt lazımdır. COVID-19-a qarşı əksər iki dozalı peyvəndlərdə imunitet ikinci dozadan sonra bir-iki həftə ərzində inkişaf edir.

Peyvənddə yan təsirlər müşahidə oluna bilər, bu normaldır və orqanizmin inkişaf etdiyini göstərir. Vaksinasiyanın yan təsirləri əsasən mülayimdir və bir-iki gündə keçəcəkdir.

#vaksinçalışır