



საქართველოს მრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-78/ნ

30 ოქტომბერი 2014 წ.

ქ. თბილისი

„პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის  
მართვის წესებისა და საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშებო ფორმების  
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური  
დაცვის მინისტრის 2010 წლის 25 ივნისის N183/ნ ბრძანებაში ცვლილების  
შეტანის თაობაზე

„ნორმტული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მუ-20 მუხლის მუ-4 პუნქტის შესაბამისად,  
ვწრიდნენ:

### მუხლი 1

„პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის, აგრეთვე იმუნიზაციის მართვის წესებისა  
და საჭირო სააღრიცხვო-საანგარიშებო ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მრომის,  
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 25 ივნისის N183/ნ ბრძანებაში (სსმ  
III, 28.06.2010 №75 მუხ.1100) შეტანილ აქტებ შემდეგი დალიღება:

1. ბრძანების პროველი პუნქტით დამტკიცებული სააღრიცხვო-საანგარიშებო ფორმები (NN 1.3; 063; 1.4; 1.8; 1.9; 2.3; 2.9; 2.10) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ბრძანებით დამტკიცებული დანართის („პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული  
კალენდრის“ და იმუნიზაციის მართვის წესები):

ა) მუ-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრი

	ასევი ვაქცინა	0-12 საათი	0-5 დღე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	12 თვე	18 თვე	5 წელი	14 წელი
1	BCG (BCG)		X							
2	HepB (HepB)		X							
3	დიტოტრია-ტეტანუსი- ჟივანაზეცვლა-ჟიბ B- ჟიბ (DPT-HepB-Hib)			X	X	X				
4	დიტოტრია-ტეტანუსი- ჟივანაზეცვლა (DPT)						X			

5	ობეგი/იბე (OPV/IPV)		X	X	X	X	X	
6	წილულა-წილურა-ტინაფერია (MMR)				X		X	
7	დიფთურია-ტენებანული (DT)					X		
8	ტენტანუსი-დიფთურია (Td)*						X	
9	როტავირუსული ვაქცინა (Rotavirus)		X	X				
10	პნევმოკონიური კონიურონუსული ვაქცინა (PCV)		X	X	X			
11	ადამიანის პაპილომავირუსული (HPV)	სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში აცრუბის დაწყების პირზე უსაფრთხო წელი და აცრადასკემდებარებული ასაკობრივი კონტინგენტები განისაზღვრება სმახსედ სამინისტროს ცალკე შრმანებით						
12	ჩილდრონია (VZV)							

შენიშვნა: \* ტე - შემდეგ ცალკელ მუ-10 წელს, 55 წლის ასაკამდე.

### ბ) მუ-4 შეცხლის:

ბ.ა) მუ-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. პნევმოკონიური ინფექციების საწინააღმდეგო თხევადი, პოლისაქტინდელი კონიურონუსული ვაქცინით (აცრამისტებული) აცრა იქნება 2 თვეს ასაკიდან და მთავრდება 12 თვეს ასაკში, კურსი შედგება 3 ინჯექციისგან – 2 პირველიდან ვაქცინაციისა და ერთი შესატერ დოზისგან, აცრა კუთხედა კუნძული, მარძაყის ანტიროლაციურ ზედაპირზე, ერთი საინცეკციო დოზა შეადგენს 0,5 მლ-ს. ასეთით, პნევმოკონიური ვაქცინის:

- პირველი დოზა უნდა გაეცემოდეს 2 თვეს ასაკში;
- მეორე დოზა უნდა გაკეთდეს 3 თვეს ასაკში;
- მესამე დოზა უნდა გაკეთდეს 12 თვეს ასაკში;
- პირველ და მეორე აცრას მორის დასაშეცნი მინიმალური ინტენსივობით არის 4 კვირა;
- მეორე და მესამე აცრას მორის დასაშეცნი მინიმალური ინტენსივობით არის 6 თვე;
- მესამე აცრა უნდა გაკეთდეს არანაკლებ 12 თვეს და არა უდინაონეს 15 თვეს ასაკისა.“;

ბ.ბ) მუ-7 პუნქტი შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 7<sup>1</sup> პუნქტი:

„7<sup>1</sup>. დაცვანებით დაწესებული ვაქცინების შემთხვევაში:

ა) 7-11 თვეს ჩილდრონის ვაქცინით კურსი შედგება 3 ინჯექციისგან – 2 პირველადან ვაქცინაციისგან და მესამე დამატებითი აცრისგან. პირველ და მეორე დოზის მორის რეკომენდებული მინიმალური ინტენსივობით 4 კვირა, ხოლო მესამე დამატებითი დოზის გაკეთება რეკომენდებული სიყოფხლის მეორე წელს, ხოლო აცრიდან 2 თვეს მინიმალური ინტენსივობით 15 თვეს ასაკამდე.

ბ) თუ რაოდ მიზნების გამო, ბავშვს აცრა არ გაუკეთდა 12 თვეს ასაკამდე, 12-23 თვეს ასაკის ბავშვებისათვის გაქცევანითი კურსი არის იმ დაზიანი, ერთი ასატრევლი დოზა შეადგენს 0,5 მლ დოზებს მორის მინიმალური ინტენსივობით არის 8 კვირა;

გ) უფროსი ასაკის ბავშვებში აცრა კუთხედა მერის გარეთა „ზედაპირზე დელტიცენტრ კუნითი.“.

პუნქტი შემდეგი რედაქტირდა:

\*\*

		უპურვენება*
		მიმიუ აღურგილული რეაქცია ვაქცინის წილა დოზაზე ან ვაქცინის კომპონენტზე;
11.	პრევენციური კონსულტინგული ვაქცინა (PCV)	<u>გაფრითხილება*</u> ვამონაცა არ ტარდება 6 კვირაზე ნიკლეტ საკვი; ზომიერი ან მიმიუ შეფაცვ დაავალება ტემპერატურით დაან მის გარეშე – გადადგით ვაქცინაცა გამოყენირთელებამდე!  *პრევენციური კონსულტინგული ვაქცინაზე ზოგჯერ ამ წესის მუ-12 მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშვნული ჩატარებები და გაფრითალუნებები

”.

დ) მუ-14 მუხლის მუ-2 პუნქტს დაემატოს „ნ“ და „ო“ კვეპურებები შემდეგი რედაქტირდა:

(ნ) პრევენციური კონსულტინგული ვაქცინის ფლაკონის გასძინდნ გასულია 6 საათი და მეტი (რადგანაც ვაქცინა არ შეიცვალ კონსერვანტებს);

(ო) პრევენციური კონსულტინგული ვაქცინის ფლაკონზე არ არის მითითებული ფლაკონის გასძინის თარიღი, საათი და წუთი.“.

მუხლი 2

მრავალება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს მმართველობა,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

11/2

დაფილ სერგეევნა