


# შეფასებით, ყოველწლიურად, სეზონური გრიპის რესპირატორული ბართულეები იწვევს 290 000-650 000 ადამიანის სიკვდილს

შეფასებების მიხედვით, ყოველწლიურად, სეზონური გრიპით გამოწვეული სიკვდილი უფრო მაღალია, ვიდრე თვლიდნენ აქამდე

ახალი შეფასებით  
290 000-650 000 სიკვდილის  
შემთხვევა, გამოწვეულია  
მხოლოდ სეზონურ გრიპთან  
დაკავშირებული  
რესპირატორული  
ბართულეებით  
(2017 წლის მონაცემები)



წინა შეფასებებით  
250 000-500 000  
სიკვდილის შემთხვევა, იყო  
გამოწვეული როგორც  
რესპირატორული, ასევე სხვა  
ბართულეებით (მაგ.  
გულსისხლძარღვთა  
სისტემის)



ჯანმო და მისი პარტნიორები მუშაობენ ყოველწლიურად სეზონურ გრიპთან დაკავშირებული სიკვდილის შემთხვევების შეფასების განახლებაზე

მოსალოდნელია, რომ მიმდინარე კვლევების შედეგები უახლოეს წლებში გამოავლენს გრიპთან დაკავშირებული სიკვდილის უფრო მაღალ მაჩვენებელს

## ახალი შეფასებები ითვალისწინებს



უახლეს  
მონაცემებს\*



მონაცემებს  
ბევრი  
ქვეყნიდან



გაუმჯობესებას:  
გრიპის  
ზედამხედველობაში  
ვირუსის გამოვლენაში  
მონაცემების ხარისხში

## ახალი შეფასებები ქვეყნებს და რეგიონებს აძლევს საშუალებას



შეადარონ  
თავისი  
მონაცემები სხვა  
ქვეყნების და  
რეგიონების  
მონაცემებს



მოახდინონ  
ზეგავლენა  
პოლიტიკაზე



მიიღონ  
გადაწყვეტილებები  
პროფილაქტიკური  
ლონისძიებებისა და  
კონტროლის შესახებ

## ჯანმო ხელს უწყობს ქვეყნებს ეროვნული შეფასების ჩატარებაში რათა



შეფასდეს პროფილაქტიკის  
სტრატეგიის და გრიპთან  
ბრძოლის ეფექტურობა



იცოდეს დაავადების  
ტვირთი ეროვნულ  
დონეზე



მიიღონ გადაწყვეტილება  
ჩარევის შესახებ



უკეთ აღიქვას გრიპის  
გლობალური ტვირთი

\* The Lancet, [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)33293-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33293-2)