

Կողմասկի ազդեցություններ.

- Ռեակցիա (ցավ, այտուց, կարմրություն) ներարկման տեղում
- Գլխացավ
- Հոգնածություն
- Մկանների ցավ
- Թուլություն
- Մրսածության զգացում
- Տաքություն
- Հոդացավ
- Սրտխառնոց
- Ավշային հանգույցների ուռուցք (լիմֆադենոպաթիա)



**COVID-19-ի դեմ
պատվաստանյութը**

համավարակը կասեցնելու
արդյունավետ միջոցներից մեկն է:



Ե՞րբ պետք է դիմեք բժշկին:

Պատվաստումից հետո, եթե առողջության հետ կապված հարցեր ունենաք, դիմեք ձեր ընտանեկան բժշկին: Հնարավոր լուրջ կողմասկի ազդեցություններ առաջանալուն պես զանգահարեք 112 կամ այցելեք մոտակա բժշկական հաստատություն:

**COVID-19 պատվաստումը անհատական
իրավունք է և համընդանուր
պատասխանատվություն է:**





Պատվաստումը ճիշտ ընտրություն է ինքդ քեզ, ընտանիքիդ և հասարակությանը COVID-19-ից պաշտպանելու համար.

Պատվաստումները կատարվում են կամավորական սկզբունքով



Պատվաստումը նվազեցնում է վարակվելու, հիվանդանալու և մահացության ռիսկը:



Պատվաստումը խորհրուրդ է տրվում նաև այն դեպքում, եթե Դուք արդեն ունեցել եք COVID-19:



Համավարակը կասեցնելու COVID-19-ի դեմ պատվաստմանը զուգահեռ, անպայման պետք է շարունակեք դիմակ կրել, առնվազն 1 մետր հեռավորություն պահպանել և մշակել ձեռքերը հատուկ հեղուկով:

Պատվաստանյութեր COVID-19-ի դեմ



COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերը շատ արագ են ստեղծվել, դրանք աննախադեպ համագործակցության և ներդրումների արդյունք են և լիովին համապատասխանում են անվտանգության բոլոր չափանիշներին:



Վրաստանում ներկայացված են միայն Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ճանաչված խիստ վերահսկման մարմինների կողմից լիազորված պատվաստանյութերը, ինչը որակի, անվտանգության և արդյունավետության երաշխիք է:




COVID-19-ի դեմ պատվաստումներն արդեն ներկայացված են 110-ից ավելի երկրում և օգտագործվել է 280 միլիոնից ավելի դեղաբաժին:

COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի մեծամասնությունը երկու դեղաբաժնից է կազմված:

COVID-19-ի դեմ տարբեր պատվաստանյութի դեպքում, պատվաստվելու միջև ընկած ժամանակը տարբեր է և նկարագրված է պատվաստանյութի ծանոթագրությունում:

Լիարժեք իմունիտետ ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է ընդունել պատվաստանյութի երկու դեղաբաժին:

Պատվաստանյութի առաջին դեղաբաժնի արդյունքում ի հայտ եկած հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները չեն ներկայացնում երկրորդ դեղաբաժինն ընդունելու հակացուցում: Երկրորդ դեղաբաժինը չընդունելու մասին որոշումը կայացնում է բժիշկը:



Իմունիտետի ձեռքբերմանը ժամանակ է հարկավոր:

COVID-19-ի դեմ երկու դեղաբաժնից կազմված պատվաստանյութերի մեծամասնության դեպքում իմունիտետ է առաջանում երկրորդ դեղաբաժինն ընդունելուց մեկ-երկու շաբաթվա ընթացքում:

Պատվաստումը հնարավոր է ունենա կողմնակի ազդեցություններ, ինչը նորմալ է և նշանակում է, որ Ձեր օրգանիզմն իմունիտետ է ձեռք բերում:

Պատվաստման կողմնակի ազդեցությունները հիմնականում թեթև են և կանցնեն մեկ կամ երկու օրում:

#պատվաստումնաշխատումե