

პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდარი

ასაკი	0-12 სთ	0 - 5 დღე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	12 თვე	18 თვე	5 წელი	14 წელი
ვაქცინა									
B ჰეპატიტი (ჰეპB /Hep B)	X								
ბცვ (BCG)		X							
დიფთერია, ყივანახველა (არაუჯრედული), ტეტანუსი, ჰემოფილუს ინფლუენცა ტიპი b, პოლიომიელიტი (ინაქტივირებული), B ჰეპატიტი (ჰეპსა/DPaT+HepB+Hib+IPV)			X	X	X				
პნევმოკოკი (პნევმო/PCV)			X		X	X			
როტავირუსი (როტა/Rota)			X	X					
წითელა, წითურა, ყბაყურა (წწყ/MMR)						X		X	
დიფთერია, ტეტანუსი, ყივანახველა (არაუჯრედული), პოლიომიელიტი (ინაქტივირებული) (ტეტრა/ (DTaP/P)							X	X	
ტეტანუსი-დიფთერია (Td)*									X
ადამიანის პაპილომაღვირუსი (აპვ (HPV))	გოგონების და ბიჭების ასაკი			აცრის ჯერადობა			აცრებს შორის მინიმალური ინტერვალი		
	10 -11 - 12 წელი			2			6 თვე		

*შენიშვნა: 14 წლის შემდეგ ტეტანუსი - დიფთერიის საწინააღმდეგო აცრა ტარდება ყოველ მე-10 წელს 55 წლის ასაკამდე.