



საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის
და სოციალური დაცვის სამინისტრო

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ჯანმრთელობის დაცვა

საქართველო, 2009

სტატისტიკური ცნობარი




საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური
დაცვის სამინისტრო

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ჯანმრთელობის დაცვა

საქართველო, 2009

სტატისტიკური ცნობარი



თბილისი

2010

ცნობარი მომზადებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, თავდაცვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროების და რკინიგზის დეპარტამენტის სამედიცინო დაწესებულებების სტატისტიკური ანგარიშების საფუძველზე. ცნობარში გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის დემოგრაფიული მონაცემები.

ცნობარი მომზადდა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამედიცინო სტატისტიკის და სამედიცინო კლასიფიკატორების შემუშავების და დანერგვის სამსახურების მიერ.

გამოქვეყნებული მასალებით სარგებლობის და მათი რეპროდუქციისთვის სპეციალური ნებართვა საჭირო არ არის. სასურველია წყაროს მითითება.

გამოცემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიმართეთ შემდეგ მისამართზე:

თბილისი, ასათიანის ქ. №9, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.

ტელეფონი: (995 32) 39 64 38, ფაქსებითი 217, 218

E-mail: CMSI@CAUCASUS.NET

ცნობარი განთავსებულია: www.ncdc.ge

წინასიტყვაობა

სტატისტიკური ცნობარი “ჯანმრთელობის დაცვა” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ყოველწლიური გამოცემაა, რომელშიც წარმოდგენილია ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ჯანდაცვის რესურსების ამსახველი ძირითადი სტატისტიკური მაჩვენებლები. ცნობარი გამოიცემა 1996 წლიდან.

ცნობარი მომზადებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ დარგობრივი სტატისტიკური ანგარიშგების საფუძველზე.

2006-2009 წლის მონაცემები წარმოდგენილია ავადმყოფობათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაციის მე-10 გადახედვის შესაბამისად.

ცნობარში მოყვანილი მაჩვენებლების გაანგარიშებისას გამოყენებულია გაეროს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული მეთოდოლოგია, რაც განაპირობებს საქართველოს მაჩვენებლების შედარებითობას სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებთან. ცნობარს ლექსიკონის სახით თან ახლავს მაჩვენებელთა გამოთვლის ფორმულები.

ცნობარში განხილულია მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების მაჩვენებლები, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მონაცემები ცალკეულ დაავადებათა კლასების მიხედვით: ინფექციური და პარაზიტული, ონკოლოგიური, სისხლის მიმოქცევის სისტემის, ენდოკრინული, სუნთქვის ორგანოთა, შარდსასქესო სისტემის, ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები და სხვა. ცნობარში წარმოდგენილია საქართველოს რეგიონების და რაიონების მონაცემები, რაც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს ჯანდაცვის სისტემის პრიორიტეტული მიმართულებები არა მარტო ქვეყნის მასშტაბით, არამედ რეგიონულ ჯგუფშიც.

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მადლობას უხდის გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისს (ქ-ნ თამარ ხომასურიძეს, ქ-ნ ლელა ბაქრაძეს, ქ-ნ ნატალია ზაქარეიშვილს) ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერისთვის.

შინაარსი

- | | |
|--------|--|
| თავი 1 | დემოგრაფიული სტატისტიკა |
| თავი 2 | მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება |
| თავი 3 | დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა |
| თავი 4 | მოსახლეობის ჯანმრთელობის
მდგომარეობა |
| თავი 5 | ზოგიერთი დემოგრაფიული და ჯანდაცვის
მონაცემი საქართველოს რაიონების
მიხედვით |

ბანსაზღვრებების და მაჩვენებლების
ლექსიკონი

ანბანური მაძიებელი

გამოყენებული ლიტერატურა

၀၇၃၀ ၁

დემოგრაფიული სტატისტიკა*

საქართველოს მონაცემებით, 2009 წელს	სტატისტიკის დეპარტამენტის 2009 წელს	საქართველოს 2009 წელს
მოსახლეობის რიცხოვნობა, კვადრატული კმ-ით	4410900	4410900
ქვეყნის მოსახლეობის (ცხოვრობდა) 2009 წელს	52,9%	47,1%

მოსახლეობის მამაკაცი.	52,5% 15	ქალია, საკის	47,5% ბავშვთა
პოპულაცია	17,1%-ია,	65	წელზე მეტი
ასაკობრივი	ჯგუფი კი	-	14,1%. ბავშვთა
პროცენტული	წილი 2002	წლიდან	3,6%-ით
შემცირდა,	65	წლის	ზევით ასაკის
მოსახლეობის	წილი კი	1,2%-ით	გაიზარდა
(ცხრილი 1.5).			

საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა 2010 წლის 1 იანვრისთვის 4436400 შეადგენდა (ცხრილი 13).


საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მიერ 2009 წელს აღრიცხულია 63377 ცოცხალშობილი, მათ შორის 32385 (51,1%) ვაჟი და 30992 (48,9%) (ცხრილი 1.6, 1.11) გოგონა. 2009 წელს ცოცხალშობილ გოგონათა რაოდენობა 5%-ით გაიზარდა.




საქართველოში 1994 წლიდან აღინიშნა სექსტა მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობის მცირე გადახრა ნორმიდან (ცხრილი 1.11, სურათი 1.1), რომელსაც მოჰყვა თანაფარდობის მნიშვნელოვანი დარღვევა და 2008 წელს იგი 127,7-მდე გაიზარდა. 2009 წლის მონაცემებით, სექსტა მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობა ნორმას მიუახლოვდა და 104,5 გახდა, რაც შეიძლება მიუთითებდეს შობადობის სტატისტიკური აღრიცხვის მოწესრიგებაზე. (ვოცხალ-

შობილთა 77,5% მოდის 30 წლამდე ასაკის დედებზე, თუმცა მატება აღირიცხება 40 წლამდე ასაკის ქალთა ყველა ასაკობრივ ჯგუფში (ცხრილი 1.10).

90-იანი წლებიდან 2007 წლის ჩათვლით, საქართველოს მოსახლეობაში აღინიშნებოდა მეორე და მესამე ბავშვის ყოლის სამომავლოდ გადაღების ტენდენცია. თუმცა 2008 წელს მეორე ბავშვის წილმა 3,5%-ით, ხოლო მესამე ბავშვის წილმა - 1,3%-ით მოიმატა. 2009 წელს, 2008 წელთან შედარებით, მეორე ბავშვის წილმა 1,2%-ით, ხოლო მესამე ბავშვის წილმა 1%-ით მოიმატა (ცხრილი I.12, სურათი I.2).




საქართველოში 1989 წლიდან აღინიშნებოდა **შობადობის** და **ბუნებრივი მატების** მაჩვენებლების კლება. 2006-2008 წლებში გამოიკვეთა ორივე მაჩვენებლის ზრდის ტენდენცია. 2009 წელს დაფიქსირდა ბოლო პერიოდის მაქსიმალური მნიშვნელობები: შობადობის მაჩვენებელი - 14,4, ხოლო ბუნებრივი მატების მაჩვენებელი - 3,8. უარყოფითი ბუნებრივი მატება აღირიცხა ქვეყნის მხოლოდ ერთ რეგიონში - რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი (ცხრილი 1.7, 1.17, სურათი 1.3).



საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების
ყველა ეტაპზე სოფლის მოსახლეობა მაღალი

* საქართველოს სტატისტიკის (საქსტატი) დეპარტამენტის მონაცემები

შობადობის მაჩვენებლით ხასიათდებოდა. ბოლო ათწლეულში ეს მაჩვენებელი შემცირდა და 2009 წელს ცოცხალშობილთა მხოლოდ 31,1% იყო სოფელში მაცხოვრებელი (ცხრილი 1.9, სურათი 1.4).




შესაბამისად, საქართველოს 4 რეგიონის (გურია, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, იმერეთი, კახეთი) სოფლის მოსახლეობაში ბუნებრივი მატება უარყოფითია. აჭარის გარდა, ბუნებრივი მატების ზრდას ყველა რეგიონში ძირითადად განსაზღვრავს ქალაქის მოსახლეობა (ბუნებრივი მატება სულ 16752, მ.შ. ქალაქში 14141, სოფელში 2611 (ცხრილი 1.17).

საქართველოში **შობადობის ჯამობრივი მაჩვენებელი** მოსახლეობის მარტივი აღწარმოებისთვის საჭირო მნიშვნელობას უკანასკნელად 80-იანი წლების ბოლოს აღწევდა. 1991 წლიდან მაჩვენებელი იკლებს და 2005 წელს მინიმუმს აღწევს (1,39). შემდგომ წლებში დაიწყო მაჩვენებლის მატება და 2009 წელს ის 1,86-ს გაუტოლდა, მოიმატა აღწარმოების ბრუტო (0,910) და ნეტო (0,887) კოეფიციენტებმა (ცხრილი 1.8).

საქართველოში 1991 წლიდან **სიკვდილიანობის მაჩვენებლის** მაქსიმალური მნიშვნელობა 11,3 აღირიცხა 2004 წელს (ცხრილი 1.8). 2009 წელს აღირიცხულია 46625 გარდაცვლილი ადამიანი, მ.შ. 51,9% მამაკაცია, 48,1% ქალი. გარდაცვლილთა 63,3%-ს ქალაქის, ხოლო 36,7%-ს - სოფლის მაცხოვრებლები შეადგენდნენ (ცხრილი 1.16). მამაკაცებში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (11,5) მეტია, ვიდრე ქალებში (9,7). 20 წელზე მეტი ასაკის მამაკაცთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2-ჯერ და ზოგ ასაკობრივ ჯგუფში 3-ჯერაც მეტია იმავე ასაკობრივ ჯგუფში ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელზე (ცხრილი 1.13).

დაავადებათა საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკატორის მე-10 გადახედვის კლასების მიხედვით, 2009 წელს

სიკვდილიანობის სტრუქტურაში 55,2% სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებებზე და 10,8% სიმსივნეებზე მოდის. სიმპტომების, ნიშნების და არაზუსტად აღნიშნული მდგომარეობების კლასი, რომელშიც შედის სიკვდილის უცნობი მიზეზების ბლოკი, მეორე ადგილზეა - 20,9%. აღნიშნულ კლასში აღირიცხული 9746 გარდაცვალების შემთხვევიდან 27,8%-ში (2710) სიკვდილის მიზეზად „უცნობი“ არის მითითებული (ცხრილი 1.15, სურათი 1.5).




საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, **ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი** 1000 ცოცხალშობილზე 2005-2007 წლებში შემცირდა, თუმცა 2008 წელს მაჩვენებელმა მოიმატა და 17,0 შეადგინა. 2009 წელს გარდაიცვალა 1 წლამდე ასაკის 945 ბავშვი, მათ შორის 0-6 დღემდე 561 (59,4%), 0-28 დღემდე 749 (79,3%). ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა 14,9-მდე დაიკლო. გარდაცვლილ ბავშვთა 58,1% ვაჟია, 41,9% გოგონა (ცხრილი 1.14).

სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, 2009 წელს საქართველოში დაიბადა 484 მკვდარი ბავშვი (**მკვდარ შობადობის მაჩვენებელი** 1000 დაბადებულზე - 7,6) (ცხრილი 1.6).


სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემების მიხედვით, 2009 წელს, 2008 წელთან შედარებით, დაბადებისას სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა შემცირდა და 73,6-ს გაუტოლდა (მამაკაცებში - 69,2; ქალებში - 77,7) (ცხრილი 1.18).

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების მიერ 2004 წლისთვის გამოთვლილ იქნა სიკვდილის ალბათობა და ჯანმრთელი სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის წლები საქართველოსთვის, ევროკავშირის და დსთ-ს ქვეყნებისთვის. სიკვდილის ალბათობის მონაცემები საქართველოსთვის უფრო მაღალია, ვიდრე

ევროკავშირის, მაგრამ თითქმის ორჯერ ნაკლებია, ვიდრე დსთ-ს ქვეყნებში (სურათი 1.6).



უკეთესი მაჩვენებლებია ჯანმრთელი სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის მხრივ დსთ-ს ქვეყნებთან შედარებით, თუმცა საქართველოს მონაცემები ჩამორჩება ევროკავშირის ქვეყნებს (სურათი 1.7).



ცხრილი 1.1 საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი) რეგიონების მიხედვით, 2008 – 2009						
	2008			2009		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი		ქალაქი	სოფელი
აჭარა	381,3	167,4	213,9	384,6	168,9	215,7
თბილისი	1106,7	1106,6	0,1	1145,4	1115,3	30,1
კახეთი	401,7	81,1	320,6	403,1	82,1	321,0
იმერეთი	693,9	326,0	367,9	697,1	329,5	367,6
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	467,9	187,3	280,6	471,0	189,3	281,7
შიდა ქართლი	312,9	114,5	198,4	309,0	119,0	190,0
ქვემო ქართლი	504,8	188,0	316,8	495,7	192,0	303,7
გურია	138,8	36,0	102,8	139,3	36,5	102,8
სამცხე-ჯავახეთი	207,9	64,2	143,7	209,7	64,9	144,8
მცხეთა-მთიანეთი	118,1	26,4	91,7	108,3	26,1	82,2
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	47,9	9,0	38,9	47,7	9,1	38,6
საქართველო	4383,8	2306,5	2077,3	4410,9	2332,7	2078,2

ცხრილი 1.2 საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი) ასაკის და სქესის მიხედვით, 2008 – 2009						
	2008			2009		
	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები
-1	52,0	28,3	23,7	59,0	31,5	27,5
1-4	187,8	99,2	88,6	193,0	102,8	90,2
5-9	232,2	122,4	109,8	229,1	120,8	108,3
10-14	280,2	145,5	134,7	271,8	141,9	129,9
15-19	360,9	183,2	177,7	348,3	177,3	171,0
20-24	360,3	182,2	178,1	362,2	183,2	179,0
25-29	332,2	166,2	166,0	338,0	169,6	168,4
30-34	310,8	152,6	158,2	315,0	154,9	160,1
35-39	299,7	144,4	155,3	303,1	146,7	156,4
40-44	302,2	142,2	160,0	296,4	139,9	156,5
45-49	334,7	155,3	179,4	336,0	155,9	180,1
50-54	286,3	131,6	154,7	296,5	136,5	160,0
55-59	248,8	112,6	136,2	255,4	115,7	139,7
60-64	158,9	70,9	88,0	180,9	80,7	100,2
65-69	195,8	80,1	115,7	166,8	68,2	98,6
70-74	185,8	75,4	110,4	196,1	78,6	117,5
75-79	133,2	51,2	82,0	129,3	49,8	79,5
80-84	82,9	27,9	55,0	90,2	31,1	59,1
85+	39,1	8,4	30,7	43,8	9,7	34,1
ს უ ლ	4383,8	2079,6	2304,2	4410,9	2094,8	2316,1
-15	752,2	395,4	356,8	752,9	397,0	355,9
15-64	2994,8	1441,2	1553,6	3031,8	1460,4	1571,4
65+	636,8	243,0	393,8	626,2	237,4	388,8

ცხრილი 1.3 საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა (ათასი) 2010 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით			
	სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი
აჭარა	386,9	170,0	216,9
თბილისი	1152,5	1122,3	30,2
კახეთი	404,5	82,9	321,6
იმერეთი	700,4	332,4	368,0
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	474,1	191,0	283,1
შიდა ქართლი	310,6	119,9	190,7
ქვემო ქართლი	499,9	194,2	305,7
გურია	139,8	36,8	103,0
სამცხე-ჯავახეთი	211,3	65,5	145,8
მცხეთა-მთიანეთი	108,8	26,4	82,4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	47,6	9,1	38,5
საქართველო	4436,4	2350,5	2085,9

ცხრილი 1.4 საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა (ათასი) 2010 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და მისი პროცენტული განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით						
ასაკი	მოსახლეობის რაოდენობა (ათასი)			მოსახლეობის პროცენტული განაწილება		
	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები
-1	62,5	31,9	30,6	1,4	1,5	1,3
1-4	196,8	105,8	91,0	4,4	5,0	3,9
5-9	228,7	120,5	108,2	5,2	5,7	4,6
10-14	268,5	140,5	128,0	6,0	6,7	5,5
15-19	341,4	174,1	167,3	7,7	8,3	7,2
20-24	363,7	184,0	179,7	8,2	8,7	7,7
25-29	342,6	172,2	170,4	7,7	8,2	7,3
30-34	318,0	156,7	161,3	7,2	7,4	6,9
35-39	307,3	149,4	157,9	6,9	7,1	6,8
40-44	294,8	139,5	155,3	6,6	6,6	6,7
45-49	337,1	156,4	180,7	7,6	7,4	7,8
50-54	301,4	139,2	162,2	6,8	6,6	7,0
55-59	259,7	117,8	141,9	5,9	5,6	6,1
60-64	192,0	85,7	106,3	4,3	4,1	4,6
65-69	153,8	62,7	91,1	3,5	3,0	3,9
70-74	200,5	80,1	120,4	4,5	3,8	5,2
75-79	129,0	49,7	79,3	2,9	2,4	3,4
80-84	91,4	31,9	59,5	2,1	1,5	2,6
85+	47,2	10,8	36,4	1,1	0,4	1,5
ს უ ლ	4436,4	2108,9	2327,5	100,0	100,0	100,0
-15	756,5	398,7	357,8	17,1	18,9	15,4
15-64	3058,0	1475,0	1583,0	68,9	69,9	68,0
65+	621,9	235,2	386,7	14,0	11,2	16,6

ცხრილი 1.5 საქართველოს საშუალო წლიური მოსახლეობა (ათასი) პერიოდული ასაკობრივი ჯგუფების და სქესის მიხედვით, 2004 – 2009			
ასაკი	ორივე სქესი	მამაკაცები	ქალები
2004			
ს უ ლ	4318,3	2034,4	2283,9
-15	845,6	437,0	408,6
15-64	2874,1	1365,9	1508,2
65+	598,6	231,5	367,1
2005			
ს უ ლ	4361.4	2060.3	2301.1
-15	822.0	426.2	395.8
15-64	2921.4	1395.1	1526.3
65+	618.0	239.0	379.0
2006			
ს უ ლ	4398.0	2081.7	2316.3
-15	794.5	413.4	381.1
15-64	2966.3	1422.0	1544.3
65+	637.2	246.3	390.9
2007			
ს უ ლ	4388,4	2079,0	2309,4
-15	767,2	400,8	366,4
15-64	2978,1	1430,9	1547,2
65+	643,1	247,3	395,8
2008			
ს უ ლ	4383,8	2079,6	2304,2
-15	752,2	395,4	356,8
15-64	2994,8	1441,2	1553,6
65+	636,8	243,0	393,8
2009			
ს უ ლ	4410,9	2094,8	2316,1
-15	752,9	397,0	355,9
15-64	3031,8	1460,4	1571,4
65+	626,2	237,4	388,8

ცხრილი 1.6 ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები, საქართველო, 2008 – 2009				
	2008		2009	
	სულ	მარცხენა- ბელი	სულ	მარცხენა- ბელი
ცოცხალშობილთა რაოდენობა და მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე	56565	12,9	63377	14,4
ბუნებრივი მატება და მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე	13554	3,1	16752	3,8
გარდაცვლილთა რაოდენობა და მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე	43011	9,8	46625	10,6
მათ შორის გარდაიცვალა 1 წლამდე და მარცხენაპედი 1000 ცოცხალშობილზე	959	17,0	945	14,9
მკვლადშობადობა და მარცხენაპედი 1000 დაბადებულზე	660	11,5	484	7,6
ქორწინება და მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე	31414	7,2	31752	7,2
განქორწინება და მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე	3189	0,7	4030	0,9
მიგრაციული მატება და მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე	-10200	-2,3	34200	7,8

ცხრილი 1.7 ბუნებრივი მოძრაობის ზოგადი მაჩვენებლები, საქართველო, 1991 – 2009										
წელი	ცოცხალ დაბადებულები		გარდაცვლილები		ბუნებრივი მატება		ქორწინება		განქორწინება	
	რაოდენობა	მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე	რაოდენობა	მარცხენაპედი 1000 მოსახლეზე
1991	89091	16,3	52416	9,6	36675	6,7	38070	7,0	7440	1,4
1992	72631	13,4	55076	10,2	17555	3,2	26878	5,0	4890	0,9
1993	61594	12,0	57539	11,2	4055	0,8	24105	4,7	3211	0,6
1994	57311	11,8	50326	10,4	6985	1,4	21908	4,5	3089	0,6
1995	56341	11,9	49073	10,4	7268	1,5	21481	4,5	2685	0,6
1996	55000	11,9	47961	10,4	7039	1,5	19253	4,2	2269	0,5
1997	54000	11,9	47575	10,5	6425	1,4	17099	3,8	2267	0,5
1998	51526	11,5	47321	10,5	4205	0,9	15343	3,4	1758	0,4
1999	48695	10,9	47184	10,6	1511	0,3	13845	3,1	1622	0,4
2000	48800	11,0	47410	10,7	1390	0,3	12870	2,9	1854	0,4
2001	47589	10,9	46218	10,5	1371	0,3	13336	3,0	1987	0,5
2002	46605	10,7	46446	10,7	159	0,0	12535	2,9	1836	0,4
2003	46194	10,7	46055	10,6	139	0,0	12696	2,9	1825	0,4
2004	49572	11,5	48793	11,3	779	0,2	14866	3,4	1793	0,4
2005	46512	10,7	42984	9,9	3528	0,8	18012	4,1	1928	0,4
2006	47795	10,9	42255	9,6	5540	1,3	21845	5,0	2060	0,5
2007	49287	11,2	41178	9,4	8109	1,8	24891	5,7	2325	0,5
2008	56565	12,9	43011	9,8	13554	3,1	31414	7,2	3189	0,7
2009	63377	14,4	46625	10,6	16752	3,8	31752	7,2	4030	0,9

ცხრილი 1.8 შობადობის ასაკობრივი და მოსახლეობის აღწარმოების მაჩვენებლები, საქართველო, 1991 – 2009											
წელი	სულ (15-49)	ღმრის ასაკი							შობადობის ჯანმრთელობის კოეფიციენტი	აღწარმოების კოეფიციენტი	
		-20	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45+		ბრუტო	ნეტო
1991	64,5	58,0	165,6	100,4	60,7	23,9	6,1	0,1	2,07	1,005	0,976
1992	52,8	50,7	144,7	76,5	48,7	17,9	4,5	0,2	1,72	0,835	0,812
1993	47,4	56,6	122,0	66,7	42,2	15,4	4,2	0,3	1,54	0,741	0,714
1994	46,4	66,7	113,1	64,2	40,2	14,6	4,2	0,5	1,52	0,724	0,698
1995	46,0	64,2	113,3	66,4	41,9	16,6	4,2	0,7	1,54	0,725	0,700
1996	45,8	59,7	112,8	69,5	44,1	18,2	4,0	0,8	1,55	0,732	0,708
1997	45,6	55,2	111,3	72,2	44,6	19,4	5,2	3,0	1,55	0,737	0,715
1998	43,8	51,4	109,1	71,6	42,3	18,9	4,6	3,0	1,50	0,713	0,694
1999	41,5	46,5	104,0	70,3	42,5	19,1	4,7	0,9	1,44	0,682	0,665
2000	41,7	39,9	110,1	74,4	43,3	19,2	4,9	0,9	1,46	0,694	0,675
2001	40,9	32,5	112,3	71,1	45,2	21,0	5,4	1,4	1,44	0,684	0,665
2002	40,2	32,8	108,6	63,5	50,2	21,2	6,4	1,5	1,42	0,673	0,653
2003	40,0	33,2	99,4	78,8	46,8	19,0	5,2	0,5	1,41	0,665	0,645
2004	42,8	35,1	109,3	83,3	47,2	21,1	5,4	1,0	1,51	0,718	0,695
2005	39,6	38,5	97,2	75,2	44,0	18,6	4,2	0,5	1,39	0,654	0,634
2006	40,2	36,7	100,7	76,0	43,3	18,9	4,6	0,7	1,40	0,663	0,648
2007	41,7	36,3	103,1	79,2	46,5	19,7	4,4	0,5	1,45	0,688	0,674
2008	50,2	42,4	115,4	90,1	55,0	24,2	5,7	0,5	1,67	0,732	0,713
2009	54,1	52,0	128,2	102,4	58,8	25,1	5,5	0,5	1,86	0,910	0,887

ცხრილი 1.9 ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009						
	2008			2009		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი		ქალაქი	სოფელი
აჭარა	5391	2778	2613	6322	3339	2983
თბილისი	15105	15100	5	16696	16376	320
კახეთი	4981	2482	2499	5378	2703	2675
იმერეთი	8397	5879	2518	9776	6766	3010
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	5388	3347	2041	6187	3826	2361
შიდა ქართლი	4296	2685	1611	4801	2922	1879
ქვემო ქართლი	6870	3893	2977	7283	4209	3074
გურია	1708	852	856	2034	1070	964
სამცხე-ჯავახეთი	2625	1266	1359	2912	1424	1488
მცხეთა-მთიანეთი	1418	718	700	1465	754	711
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	386	206	180	523	274	249
საქართველო	56565	39206	17359	63377	43663	19714

ცხრილი 1.10 ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა ღმრის ასაკის მიხედვით, საქართველო, 1991 – 2009									
წელი	სულ	ღმრის ასაკი							
		- 20	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45+	უცნობი
1991	89091	12022	34953	23558	12931	4655	949	23	--
1992	72631	10487	30200	17503	10198	3500	717	26	--
1993	61594	11216	24174	14305	8324	2888	639	48	--
1994	57311	12597	21155	12810	7444	2612	624	69	--
1995	56341	11893	20578	12691	7474	2928	676	101	--
1996	55000	10862	19903	12715	7591	3153	649	127	--
1997	54000	9920	19223	12743	7465	3343	857	449	--
1998	51526	9212	18609	12287	6939	3256	768	455	--
1999	48695	8313	17552	11751	6861	3281	806	131	--
2000	48800	7124	18394	12100	6868	3305	868	141	--
2001	47589	5784	18571	11379	7073	3610	955	217	--
2002	46605	5833	17945	10077	7834	3541	1150	225	--
2003	46194	5907	16463	12449	7269	3040	929	81	56
2004	49572	6246	18258	13196	7316	3278	971	159	148
2005	46512	6903	16703	12110	6896	2870	752	87	191
2006	47795	6633	17666	12409	6831	2929	791	121	415
2007	49287	6549	18216	13021	7323	3058	727	79	314
2008	56565	7775	21025	14982	8392	3487	817	86	1
2009	63377	8896	22954	17250	9409	3920	864	84	--

ცხრილი 1.11 ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა სქესის მიხედვით და სქესთა მემორული რაოდენობები თანაფარდობა, საქართველო, 1991 – 2009				
წელი	ორივე სქესი	გამარობითი	მდედრობითი	(გამარობითი / მდედრობითი) * 100
1991	89091	45924	43167	106,4
1992	72631	37276	35355	105,4
1993	61594	31904	29690	107,4
1994	57311	29964	27347	109,6
1995	56341	29745	26596	111,8
1996	55000	28936	26064	111,0
1997	54000	28409	25591	111,0
1998	51526	27108	24418	111,0
1999	48695	25618	23077	111,0
2000	48800	25674	23126	111,0
2001	47589	25037	22552	111,0
2002	46605	24519	22086	111,0
2003	46194	24469	21725	112,6
2004	49572	26039	23533	110,6
2005	46512	24654	21858	112,8
2006	47795	25236	22559	111,9
2007	49287	25882	23405	110,6
2008	56565	31720	24845	127,7
2009	63377	32385	30992	104,5

ცხრილი 1.12 ცოცხალ დაბადებულთა რაოდენობა დაბადების რიგითობის მიხედვით, საქართველო, 1991 – 2009						
წელი	დაბადების რიგითობა					სულ
	I	II	III	IV	V+	
რაოდენობა						
1991	40940	30176	13054	3344	1577	89091
1992	36183	24392	8772	2303	981	72631
1993	32006	20264	6738	1794	792	61594
1994	31020	18510	5605	1505	671	57311
1995	30012	18352	5642	1621	714	56341
1996	28380	18535	5830	1595	660	55000
1997	27432	18036	6102	1674	756	54000
1998	26227	17210	5925	1494	670	51526
1999	25225	16069	5405	1363	633	48695
2000	25327	16250	5270	1318	635	48800
2001	25460	15086	5187	1285	571	47589
2002	24952	14878	5060	1146	569	46605
2003	28875	11752	3929	1025	613	46194
2004	28100	15773	4207	1037	455	49572
2005	27356	13743	4043	942	428	46512
2006	28935	13371	4107	938	444	47795
2007	29883	14075	4077	830	422	49287
2008	31307	18147	5400	1184	527	56565
2009	33651	21093	6627	1412	594	63377

ცხრილი 1.13 გარდაცვლილთა რაოდენობა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლები ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2009						
ასაკი	გარდაცვლილთა რაოდენობა			სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (1000 მოსახლზე)		
	ორივე სქესი	მამაკაცი	ქალები	ორივე სქესი	მამაკაცი	ქალები
-1	945	546	399	16,0	17,3	14,5
1-4	98	43	55	0,5	0,4	0,6
5-9	69	34	35	0,3	0,3	0,3
10-14	83	46	37	0,3	0,3	0,3
15-19	170	105	65	0,5	0,6	0,4
20-24	370	252	118	1,0	1,4	0,7
25-29	476	367	109	1,4	2,2	0,6
30-34	567	427	140	1,8	2,8	0,9
35-39	776	588	188	2,6	4,0	1,2
40-44	1138	834	304	3,8	6,0	1,9
45-49	1591	1175	416	4,7	7,5	2,3
50-54	1972	1422	550	6,7	10,4	3,4
55-59	2245	1496	749	8,8	12,9	5,4
60-64	2292	1352	940	12,7	16,8	9,4
65-69	5951	3548	2403	35,7	52,0	24,4
70-74	6559	3440	3119	33,4	43,8	26,5
75-79	8238	3990	4248	63,7	80,1	53,4
80-84	6944	2800	4144	77,0	90,0	70,1
85+	6141	1726	4415	140,2	177,9	129,5
ს უ ლ	46625	24191	22434	10,6	11,5	9,7

ცხრილი 1.14 ერთი წლამდე გარდაცვლილ ბავშვთა განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009				
	2008		2009	
	ბავშვები	გოგონები	ბავშვები	გოგონები
	549	410	546	399
1 დღე	266	228	176	134
1 ღღე	32	21	54	35
2 ღღე	20	21	35	23
3 ღღე	15	20	28	15
4 ღღე	19	13	22	10
5 ღღე	20	10	19	10
6 ღღე	14	11	13	7
7 - 27 ღღე	54	25	90	78
28 ღღე – 2 თვე	24	15	31	24
2 თვე	16	7	18	10
3 თვე	13	7	10	11
4 თვე	11	6	6	4
5 თვე	9	7	10	9
6 თვე	7	3	5	7
7 თვე	8	4	8	2
8 თვე	4	5	3	7
9 თვე	8	2	7	3
10 თვე	5	2	8	4
11 თვე	4	3	3	3

ცხრილი 1.15 სიკვდილიანობა პირითაღი მიჯნების მიხედვით (მარკინებლები 100 000 მოსახლესზე), საქართველო, 2007 – 2009						
	2007		2008		2009	
	რაოდენობა	მარკინებლები	რაოდენობა	მარკინებლები	რაოდენობა	მარკინებლები
სულ	41178	938,5	43011	981,1	46625	1057,0
ინფემცირები და პარაზიტული დაავადებები	285	6,5	368	8,4	328	7,4
სიმსივნეები	4511	102,8	4661	106,3	5039	114,2
სისხლისა და სისხლგამაღი ორგანოების დაავადებები და იმუნური სისტემის მიმდინარე ცალკეული დარღვევები	8	0,2	11	0,3	50	1,1
ენდოკრინული სისტემის, კვების და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები	487	11,1	630	14,4	562	12,7
ფსიქიკური და ქვევითი აზრობები	39	0,9	40	0,9	50	1,1
ნერვული სისტემის დაავადებები	265	6,0	283	6,5	367	8,3
თვალებისა და მისი დანამატების დაავადებები	0	0,0	0	0,0	0	0,0
მუცლისა და ღვრისებრი ორგანოების დაავადებები	0	0,0	0	0,0	0	0,0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	27560	628,0	27579	629,1	25725	583,2
სუნთქვის ორგანოების დაავადებები	1204	27,4	1237	28,2	766	17,4
საჭმლის მომკვლელობის ორგანოების დაავადებები	1071	24,4	1260	28,7	1189	27,0
კანისა და კანქვეშა უჯრედების დაავადებები	0	0,0	0	0,0	0	0,0
გვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	2	0,0	4	0,1	7	0,2
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	307	7,0	322	7,3	317	7,2
ორსულობა, მშობიარობა და ლოკინობის ხანა	2	0,1	1	0,0	32	0,7
პერინატალური პერიოდში ფარმოშობილი ცალკეული მდგომარეობები	574	13,1	783	17,9	787	17,8
თანდაყოლილი ანომალიები, დეფორმაციები და პროგრესირებადი დარღვევები	65	1,5	125	2,9	39	0,9
სიმკვრივეები, ნივნები და ნორმადან გადახრები, გამოვლენილი კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებისას, რომლებიც არ არიან კლასიფიცირებული სხვა რუბრიკებში	3473	79,1	3669	83,7	9746	221,0
ტრავმები, მოწამვლები და გარე მიჯნების ზემოქმედების ზოგადი სხვა შემთხვევები	1325	30,2	2038	46,5	1621	36,7

ცხრილი 1.16 გარდაცვლილთა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009						
	2008			2009		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		ქალაქი	სოფელი		ქალაქი	სოფელი
ატარა	2813	1620	1193	2950	1728	1222
თბილისი	12113	12027	86	12397	12209	188
კახეთი	4713	1856	2857	4972	1968	3004
იმერეთი	7659	4212	3447	8318	4596	3722
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	3836	1928	1908	4976	2677	2299
შიდა ქართლი	3442	1679	1763	3575	1778	1797
ქვემო ქართლი	3459	1861	1598	3896	2129	1767
გურია	1448	542	906	1610	614	996
სამცხე-ჯავახეთი	1647	885	762	1884	1015	869
მცხეთა-მთიანეთი	1248	549	699	1280	594	686
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	633	162	471	767	214	553
საქართველო	43011	27321	15690	46625	29522	17103

ცხრილი 1.17 ბუნებრივი მატება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009						
	2008			2009		
	სულ	პატ შორის		სულ	პატ შორის	
		ძალადი	სოფელი		ძალადი	სოფელი
აჭარა	2578	1158	1420	3372	1611	1761
თბილისი	2992	3073	-81	4299	4167	132
პანკისი	268	626	-358	406	735	-329
იმერეთი	738	1667	-929	1458	2170	-712
სამეგრელო-ზემო სვანეთი	1552	1419	133	1211	1149	62
შიდა ქართლი	854	1006	-152	1226	1144	82
ქვემო ქართლი	3411	2032	1379	3387	2080	1307
გურია	260	310	-50	424	456	-32
სამცხე-ჯავახეთი	978	381	597	1028	409	619
მცხეთა-მთიანეთი	170	169	1	185	160	25
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	-247	44	-291	-244	60	-304
საქართველო	13554	11885	1669	16752	14141	2611

ცხრილი 1.18 სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას, საქართველო, 1995 – 2009											
	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
სულ	70,3	71,3	71,6	71,5	72,1	71,6	74,0	74,3	75,1	74,2	73,6
მამაკაცი	66,3	67,5	68,1	68,0	68,7	67,9	70,0	69,8	70,5	69,3	69,2
ქალი	74,2	75,0	74,9	74,9	75,3	75,1	77,6	78,6	79,4	79,0	77,7

ცხრილი 1.19 მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა (აღწერის წლების მიხედვით), საქართველო						
	1989				2002	
	რაოდენობა (ათასი)*	%*	რაოდენობა (ათასი)**	%**	რაოდენობა (ათასი)**	%**
ქართველები	3787,4	70,1	3519,0	73,7	3661,2	83,8
სომხები	437,2	8,1	359,9	7,5	248,9	5,7
რუსები	341,2	6,3	264,2	5,5	67,7	1,5
აზერბაიჯანელები	307,6	5,7	307,6	6,4	284,8	6,5
ოსები	164,1	3,0	97,7	2,0	38,0	0,9
ბერძნები	100,3	1,8	85,6	1,8	15,2	0,3
აფხაზები	95,9	1,8	2,6	0,1	3,5	0,1
უკრაინელები	52,4	1,0	40,7	0,9	7,0	0,2
ქურთები და უიღურები	33,3	0,6	33,3	0,7	18,3	0,4
მორაქმები	24,6	0,5	23,2	0,5	3,6	0,1
ბელორუსები	8,6	0,2	6,5	0,1	0,5	0,0
სხვა	48,2	0,9	37,1	0,8	22,8	0,5
სულ	5400,8	100,0	4777,2	100,0	4371,5	100,0

* აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ან მოსახლეობის ჩათვლით

** აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის გარეშე


თაზი 2

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემამ 1993 წლიდან მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით სამედიცინო მომსახურების ფინანსირებაში ეტაპობრივად იქნა ჩატარებული რეფორმები. სამედიცინო მომსახურების საბაზისო პაკეტთან ერთად დაინერგა სავალდებულო დაზღვევის სისტემა. ჩატარდა სამედიცინო მომსახურების სფეროს და ფარმაცევტული სექტორის პრივატიზაცია. სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისთვის შემუშავდა ანაზღაურების ახალი მექანიზმები. რეფორმის შედეგად რეორგანიზაცია ჩატარდა ცენტრალური, რეგიონული და მუნიციპალური დონეების მართვის სისტემაში. რეფორმის ფარგლებში ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ძირითადი ყურადღება პირველადი ჯანდაცვის განვითარების და ჰოსპიტალური სიმძლავრეების შემცირების პროექტებს დაუთმო.


2008 წელს, ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების მიხედვით, ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯების ხვედრითმა წილმა ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში მოიმატა და 8,7% შეადგინა (ცხრილი 2.1).

ამასთან 2008 წელს 1,8%-მდე გაიზარდა ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ხვედრითი წილი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტიდან. ასევე 2007 წელთან შედარებით, 4,9%-მდე მოიმატა ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების წილმა მთლიან სახელმწიფო დანახარჯებში და 20,6%-მდე (2007 წელს - 18%) ჯანდაცვაზე მთლიან დანახარჯებში (სურათი 2.1, 2.2).



2009 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები გეგმის მიხედვით 5367,2


მლნ. ლარს შეადგენდა. ჯანმრთელობის დაცვაზე გამოყოფილი თანხები ბიუჯეტის 6,9%-ია.



აღსანიშნავია, რომ ჯანდაცვის ფინანსირების ძირითად წყაროს კერძო დანახარჯები წარმოადგენს - 67,8% მთლიანი დანახარჯებიდან. მიუხედავად კერძო დანახარჯების წილის კლების ტენდენციისა (2003 წელს - 78%, 2007 წელს - 73%), ის აღემატება არა მარტო ევროპის რეგიონის, არამედ დსთ-ს ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელსაც: 2007 წელს ევროკავშირის 27 ქვეყანაში - 26%, დსთ-ს 8 ქვეყანაში - 58%.


2008 წლის ჯანდაცვის ეროვნული ანგარიშების მონაცემების მიხედვით, რეფორმის მიუხედავად, არ მოხდა ფინანსური რესურსების გადანაწილების მნიშვნელოვანი ცვლილება. ჯანდაცვის სფეროზე ჯანდაცვის მთლიანი დანახარჯებიდან 39,1% სტაციონარულ მომსახურებაზე და 21,9% ამბულატორულ მომსახურებაზე იქნა დახარჯული. სტაციონარების დანახარჯების 22,8%-ს ჯანდაცვის მთლიანი დანახარჯებიდან აფინანსებს სახელმწიფო სექტორი, ხოლო 69,5%-ს - კერძო სექტორი. ამბულატორული მომსახურების დანახარჯების 20,8%-ს აფინანსებს სახელმწიფო სექტორი, ხოლო 49,5%-ს - კერძო სექტორი.

2001-2008 წლებში ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯები ერთ სულ მოსახლეზე 115 ლარიდან 379 ლარამდე გაიზარდა. ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯებმა ერთ სულ მოსახლეზე 17 ლარიდან 78 ლარამდე, ხოლო კერძო დანახარჯებმა 88 ლარიდან 261 ლარამდე მოიმატა. ამავ დროს 2007 წელს ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულმა ჯანდაცვითი სერვისების მოხმარების სამედიცინო დანახარჯების



საქართველოში 2009 წელს, 2008 წელთან შედარებით, რეგისტრირებული დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობამ 18,4%-ით, ხოლო სიცოცხლეში პირველად აღრიცხული დაავადებების შემთხვევათა რაოდენობამ 31%-ით მოიმატა. მატება აღირიცხა როგორც რეგიონულ ჭრილში (ცხრილი 2.15), ასევე დაავადებათა კლასების მიხედვით. 2009 წელს რეგისტრირებულ შემთხვევათა ზრდას მიმართვიანობის ზრდა არ გამოუწვევია.

2009 წელს პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში **მიმართვათა** რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე იყო 2, მათ შორის ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში - 1,8 (ცხრილი 2.16, სურათი 2.6). დაბალია სოფლის მოსახლეობის ამბულატორიაში და სოფლის ექიმებთან მიმართვათა რაოდენობა - 0,85 ერთ სულ სოფლის ექიმზე (ცხრილი 2.13).



არ შეცვლილა წლის განმავლობაში სრული დატვირთვით მომუშავე ერთ ექიმზე მიმართვათა (სპეციალისტებთან მიმართვის ჩათვლით) რაოდენობა - 725 მიმართვა.

ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ ქსელში ექიმების (სოფლის ექიმების ჩათვლით) პროდუქტიულობის შეფასების პირდაპირი მაჩვენებელი ამბულატორული სიმძლავრეების გამოყენებაა. ქსელის დატვირთვის მაჩვენებელი 2001-2006 წლებში 26,3%-დან

40,5%-მდე გაიზარდა, 2007-2008 წლებში აღინიშნა მაჩვენებლის მცირე კლება, ხოლო 2009 წელს ის 38,6%-ს გაუტოლდა (ცხრილი 2.17). ამასთან სოფლის ექიმი-მეწარმის მიერ სიმძლავრეთა გამოყენების მაჩვენებელმა 39,2% შეადგინა.

2009 წელს პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ექიმის თანამდებობაზე გაფორმებული იყო 10883,5 კონტრაქტი (ინდივიდუალური ხელშეკრულებების ჩათვლით), მათ შორის ოჯახის ექიმია - 327,5, სოფლის ექიმი - 1105. პჯდ დაწესებულებებში კონტრაქტი გაფორმებული იყო 7354,5 საშუალო სამედიცინო პერსონალთან, მათ შორის 1136 სოფლის ექთანთან. ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში (სოფლის ექიმების ჩათვლით) ერთ რეგისტრირებულ შემთხვევაზე საშუალოდ 3,6 მიმართვა მოდის (2008 წელს - 4,7).

საანგარიშო წელს საქართველოს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში **პროფილაქტიკური გასინჯვები** ჩატარდა 0-18 წლამდე ასაკის 671213 ბავშვს, მათ შორის 0-15 წლამდე ასაკის 530773 და ერთ წლამდე ასაკის 66203 ბავშვს. პროფილაქტიკური გასინჯვების შედეგად 0-18 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში შემთხვევათა 0,18%-ში სმენის, 0,69%-ში მხედველობის, 0,45%-ში მეტყველების დაქვეითება, 0,91%-ში სკოლიოზი, 0,60-ში ტანადობის დარღვევა გამოვლინდა. სკოლის დამთავრების წინ გაისინჯა 16-18 წლამდე ასაკის 87377 მოზარდი, მათ შორის 45984 ვაჟი (ცხრილი 2.18).

2009 წელს საქართველოში გამოკვლეულ იქნა 23731 **წვევადელი**, მათ შორის 3673 წლის ბოლოსთვის იმყოფებოდა დისპანსერულ მეთვალყურეობაზე (ცხრილი 2.19).

2009 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა 19 **დღის სტაციონარი** 267 საწოლზე. დღის სტაციონარებში მეურნალობდა 7727 ავადმყოფი (ცხრილი 2.20).

საქართველოს სტაციონარების სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების განყოფილებები მოემსახურა 23871 ავადმყოფს (14%-ით მეტს, ვიდრე 2008 წელს), მათ შორის 11214 ბავშვს. ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ჩატარდა 34398 ოპერაცია, რაც 2008 წელს ჩატარებული ოპერაციების რაოდენობაზე 25%-ით მეტია. თვალზე და მის დანამატებზე ჩატარებულია 6751 ოპერაცია, მათ შორის 3162 მიკროქირურგიული. ყელ-ყურ-ცხვირის ორგანოებზე ჩატარებულია 1240 ოპერაცია, კანზე და კანქვეშა ქსოვილებზე -

9070 და 9098 სამეანო-გინეკოლოგიური ოპერაცია (ცხრილი 2.21).

2009 წელს ანგარიში წარმოადგინა 84 დამოუკიდებელმა და 353 შემავალმა სტომატოლოგიურმა პოლიკლინიკამ (კაბინეტმა). მიმართვების საერთო რაოდენობაა 345057, მათ შორის 170017 - პირველადი. წარმოდგენილი ანგარიშების მიხედვით მოსახლეობას ემსახურებოდა 1115 სტომატოლოგი (ცხრილი 2.22, 2.23).

საანგარიშო წელს 81 **სასწრაფო დახმარების სადგურიდან** 77 იყო დამოუკიდებელი, 4 შემავალი. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურებს ემსახურებოდა 1591 ექიმი, 1034 საშუალო და 173 უმცროსი სამედიცინო მუშაკი, სხვა დანარჩენი - 1468. გამსვლელი ბრიგადების რაოდენობა - 288, მ.შ. სპეციალიზებულია - 20, პედიატრიულია - 8. შესრულებულია 907343 გასვლა, სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს 883129 პირს, მათ შორის 271821 სოფლის მცხოვრებს. 15 წლამდე ასაკის კონტინგენტთან შესრულდა 112699 გამოძახება. სამედიცინო დახმარებათა საერთო რიცხვიდან სახელმწიფო სტანდარტებით დახმარება გაეწია 864502 პირს, კოსპიტალიზაცია ჩატარდა 142583 შემთხვევაში (ცხრილი 2.24, 2.25, 2.26).

47 **სისხლის დამამზადებელი სადგურიდან** (კაბინეტიდან) 6 დამოუკიდებელი და 41 შემავალია. სისხლი ჩააბარა 33991 დონორმა (11,9%-ით მეტი 2008 წელთან შედარებით). დამზადებულია 20855,7 ლ. სისხლი ჰემოკონსერვანტის გარეშე (ცხრილი 2.27). სისხლის დამამზადებელ სადგურებში და სისხლის გადასხმის განყოფილებებში მუშაობდა 108 ექიმი, 130 საშუალო და 32 უმცროსი მედიკოსონალი.

წლის ბოლოს ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების და სოფლის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა 73176 **შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი**, მათ შორის საანგარიშო წლის მანძილზე პირველად აიყვანეს აღრიცხვაზე 9058. 2009 წელს პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებმა პირველად წარმოადგინეს ანგარიში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვების შესახებ. წლის ბოლოს დისპანსერული მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა 4622 ბავშვი, მათ შორის წლის განმავლობაში პირველად აღრიცხვაზე აყვანილი იქნა 854. 2009 წლის ბოლოს დისპანსერული მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფ შეზღუდული შესაძლებლობის პირიდან 6687 - მკვეთრად, 37025 - მნიშვნელოვნად, 6108 - ზომიერად ჰქონდა გამოხატული

ქმედითუნარიანობის შეზღუდვა. წლის განმავლობაში გარდაცვალების გამო აღრიცხვიდან მოიხსნა 2490 პირი, მათ შორის 20 ბავშვი (ცხრილი 2.28, 2.29).

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 11 ივლისის №215/ნ ბრძანების შესაბამისად, სავალდებულო პერიოდული სამედიცინო შემოწმება გაიარა 10741 მოქალაქემ, მათ შორის პროფესიის შეცვლას ან სამუშაოდან დროებით გადაყვანას საჭიროებდა 206.


პირველადი ჯანდაცვის ექიმების მიერ 95233 პაციენტი გამოსაკვლევად გაგზავნილ იქნა პოლიკლინიკაში, 5911 პაციენტი - დისპანსერში, 24471 - სტაციონარში.

2009 წელს სოფლის ექიმების და სოფლის ექთნების მეთვალყურეობის ქვეშ აყვანილია 2438 ტუბერკულოზით დაავადებული, რომელიც DOTS-ით მკურნალობდა, 4553 ინსულინდამოკიდებული დიაბეტით და 2207 - ფსიქიკურ და ქცევითი აშლილობის დიაგნოზით დაავადებული.

2009 წელს, ისევე როგორც წინა წლებში, ფუნქციონირებდა 2 **ჩვილ ბავშვთა სახლი** 200 ადგილზე. საანგარიშო წლის ბოლოს ბავშვთა სახლებში იმყოფებოდა 188 ბავშვი, მათ შორის 0-1 ასაკის 38, 1-3 წლის ასაკის 73, 3 წლის და მეტი ასაკის 77. წლის განმავლობაში გარდაიცვალა 33 ბავშვი (ცხრილი 2.30).

2009 წლის ანგარიშები წარმოადგინა 266 **სტაციონარულმა დაწესებულებამ** 13666 **საწოლზე**, მათ შორის 241 საავადმყოფოა 11886 საწოლით, 8 დისპანსერი 155 საწოლით, 17 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის კლინიკა 1625 საწოლით (ცხრილი 2.31).


2009 წელს სტაციონარებში კონტრაქტი გაფორმებული იყო 9978 ექიმის და 11131 საშუალო სამედიცინო პერსონალის თანამდებობაზე. სტაციონარებში ექიმების პროდუქტიულობის დღევანდელი დონე დაბალია ევროპის რეგიონის და დსთ-ს ქვეყნებთან შედარებით. ჯანმო-ს 2007 წლის მონაცემებით, კოსპიტალიზებული პაციენტების რაოდენობის თანაფარდობა სრული დატვირთვით მომუშავე ექიმის ექვიალენტურ რაოდენობასთან უნგრეთში შეადგენს 178, ყირგიზეთში - 144, ისრაელში - 94, სომხეთში - 53, აზერბაიჯანში - 45, საქართველოში - 29. 2008-2009 წლებში საქართველოში ეს მაჩვენებელი 32 ტოლია. საწოლთა უზრუნველყოფის მაჩვენებელმა 100000 მოსახლეზე 2009 წელს 309,1-მდე დაიკლო (სურათი 2.7).




საწოდების უზრუნველყოფის მაჩვენებელი, როგორც 2008 წელს, მაღალია ქ. თბილისში (499,0), რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში (450,7) და იმერეთში (342,1), ხოლო საქართველოს მაჩვენებელზე დაბალია მცხეთა-მთიანეთში (121,0), კახეთში (163,7), ქვემო ქართლში (170,5), გურიაში (189,5), შიდა ქართლში (192,2) (ცხრილი 2.32).

2009 წელს სტაციონარებში სამკურნალოდ შემოვიდა 318872 ავადმყოფი. უკანასკნელ წლებში აღინიშნებოდა **პოსპიტალიზაციის მაჩვენებლის** ზრდა. საანგარიშო წელს პოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100000 სულ მოსახლეზე შემცირდა და 7229,2 გახდა (ცხრილი 2.34). პაციენტთა მიერ გატარებული **საწოდლეების რაოდენობა**, წინა წელთან შედარებით, 7,8%-ით დაიკლო და 2012382 შეადგინა.

2009 წელს **საწოლთა ფონდის გამოყენების მაჩვენებლები**, წინა წელთან შედარებით, არ შეცვლილა: საშუალო დატვირთვა - 148,2, ბრუნვა - 23,4 და საწოლზე დაყოვნება - 6,3 (სურათი 2.8, 2.9).



დატვირთვის და დაყოვნების მაღალი მაჩვენებლებით ხასიათდება ონკოლოგიური/რადიოლოგიური, ფსიქიატრიული/ნარკოლოგიური და ტუბერკულოზის პროფილის საწოდები (ცხრილი 2.32, 2.33).




საანგარიშო წელს საქართველოს **სტაციონარებიდან გავიდა** 311458 ავადმყოფი. საავადმყოფოებში გარდაცვლილი 6500 ავადმყოფიდან მონაცემები ასაკის და დასკენითი დიაგნოზის შესახებ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენილია 6448-ის შესახებ. **ლეტალობის ზოგადმა მაჩვენებელმა** მოიმატა (2008 წელი - 1,9%, 2009 წელი - 2,1%). ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან 21,0%-ს 0-15 წლამდე (ლეტალობა - 1,5 %), ხოლო 7,5%-ს - 0-1 წლამდე (ლეტალობა - 3,6%) ასაკის ბავშვები შეადგენდნენ (ცხრილი 2.35, 2.36, 2.37). ქვეყნის საშუალო ლეტალობის მაჩვენებელზე მაღალი ლეტალობა აღირიცხა მცხეთა-მთიანეთში - 2,7%, ქ.თბილისში - 2,5%; დაბალი ლეტალობაა სამეგრელოში - 1,1%, რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში - 1,1% (ცხრილი 2.34).

დაავადებათა კლასების მიხედვით 311458 საავადმყოფოდან გასული ავადმყოფიდან 25% ორსულობის, მშობიარობის და ლოგინობის ხანის, 17,7% სუნთქვის ორგანოთა, 13,7% სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების კლასების დიაგნოზით არის გასული.

2009 წელს საქართველოს სტაციონარებში ჩატარებულია 123900 **ოპერაცია** (მაჩვენებელი - 28,1), მათ შორის 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში 11361 (მაჩვენებელი - 15,1) (ცხრილი 2.38, სურათი 2.10).

ოპერაცია გაუკეთდა 122757 ავადმყოფს, მათ შორის 11143 ბავშვს. გარდაიცვალა 570 ნაოპერაციევი (ლეტალობა - 0,5%), მათ შორის 55 ბავშვი (ლეტალობა - 0,5%). საერთო ნარკოზით ოპერაცია გაუკეთდა 73376 ავადმყოფს, მათ შორის გარდაიცვალა 8 (ცხრილი 2.39). ოპერაციითა საერთო რიცხვიდან ლაზერის გამოყენებით ჩატარდა 221, ენდოსკოპიური 2346, კრიოგენული 33.




ოპერაციების 43,4% შარდსასქესო სისტემის ორგანოებზე, 28,7% სამეანო-გინეკოლოგიური, 21,3% საჭმლის მომნელებელი სისტემის და მუცლის ღრუს ორგანოებზე ჩატარებული ოპერაციებია. გულზე ჩატარდა 1373 ოპერაცია (ლეტალობა - 3,5%), მათ შორის ბავშვებში 255 (ლეტალობა - 10,6%). ძვალ-კუნთოვან სისტემაზე ჩატარებულია 9323 ოპერაცია, მათ შორის 683 ბავშვებში. მენჯ-ბარძაყის სახსრის პროტეზირება ჩატარებულია 2380 შემთხვევაში, მათ შორის პირველადი პათოლოგიის დროს 595. მუხლის სახსრის პროტეზირება ჩატარებულია 425 შემთხვევაში, მათ შორის პირველადი პათოლოგიის დროს 289. კიდურების ან მისი ნაწილის ამპუტაცია ჩატარდა 862 შემთხვევაში, მათ შორის დიაბეტის გამო 467 (ცხრილი 2.40, 2.41, 2.42).

სტაციონარული ოპერაციების 49,7% ჩატარებულია თბილისში, 16,1% - იმერეთში, 10,2% - აჭარაში (ცხრილი 2.43).

2009 წელს ჩატარდა 21818 **გადაუდებელი ოპერაცია** (ლეტალობა - 1,3%), რაც სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების 17,6%-ს შეადგენს (ცხრილი 2.44, სურათი 2.11). ჩატარებულია მწვავე აპენდიციტის 8281, ჩაჭედილი თიაქრის - 3548, მწვავე ქოლეცისტიტის - 1925 ოპერაცია (ცხრილი 2.45, 2.46, 2.47). თუმცა ოპერაციებმა საჭმლის მომნელებელ და მუცლის ღრუს ორგანოებზე 2009 წელს დაიკლო თითქმის 8%-ით, ლეტალობის მაჩვენებელმა მოიმატა 1,2%-მდე (ცხრილი 2.48, 2.49). 2009 წელს დაიკლო ქირურგიული და ბავშვთა ქირურგიული საწოლების დატვირთვის, დაყოვნების და ბრუნვის მაჩვენებლებმა (ცხრილი 2.50, 2.51).

საანგარიშო წლის მონაცემებით, მკვეთრად შემცირდა **პათოლოგოანატომიური კვლევების** რაოდენობა. 2007 წელს მათი საერთო რაოდენობა იყო 672 (სტაციონარში გარდაცვლილთა 12,3%), 2008 წელს - 137 (სტაციონარში გარდაცვლილთა 2,2%), 2009 წელს კი - 90 (სტაციონარში

გარდაცვლილთა 1,4%) (ცხრილი 2.52). ჩატარებულია 23431 ავადმყოფის ბიოფსიური და 87887 ავადმყოფის ოპერაციული მასალის პათოპისტოლოგიური გამოკვლევა ბლოკების რაოდენობის აღნიშვნით.



საქართველოში **აგრების** ჩატარების უფლება აქვს ყველა ლიცენზირებულ ექიმს (ოჯახის და სოფლის ექიმები, პედიატრები და ა.შ.) და მედლა-ვაქცინატორს. 2009 წელს ქვეყნის სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში ფუნქციონირებდა 178 აგრების ჩასატარებელი და 80 ანტირაბიული კაბინეტი. 213 მედლა-ვაქცინატორიდან 149 მუშაობს პოლიკლინიკაში, ამბულატორიაში ან ქალთა კონსულტაციაში, ხოლო 64 - სტაციონარში.

2009 წელს საქართველოში ჩატარდა 59676 ბცუ-1-ს აცრა, მათ შორის 58199 დროული. ჩატარებულია ვირუსული ჰეპატიტი B-1 45660 აცრა, მათ შორის 34248 დროული. 29329 ბავშვს ჩაუტარდა ვირუსული ჰეპატიტი B-3 აცრა. დეც-3 ვაქცინირებულია 48385 ბავშვი. პოლიო-3-ით აცრილია 51151 ბავშვი (ცხრილი 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57).

ანტირაბიულ კაბინეტებს მიმართა 41208 პირმა, აცრილია 38670, მათ შორის აგრების პირობითი კურსი ჩატარდა 22237 შემთხვევაში (ცხრილი 2.58).

2009 წელს საქართველოს სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში ფუნქციონირებდა **დამხმარე განყოფილებები** (კაბინეტები) და **ლაბორატორიები**: პემოდიალიზის - 11, რენტგენოლოგიური - 301, ენდოსკოპიური - 77, კომპიუტერული ტომოგრაფიის - 20, ელექტროკარდიოგრაფიის და ფუნქციური დიაგნოსტიკის - 303, რადიოიზოტოპური დიაგნოსტიკის - 1, კლინიკურ-დიაგნოსტიკური - 540, ბაქტერიოლოგიური - 102, სეროლოგიური - 125, ბიოქიმიური - 363, ციტოლოგიური - 83 და სხვა (ცხრილი 2.65).

2009 წელს ჩატარებულია 553062 რენტგენოლოგიური გამოკვლევა. 37081

სპეციალური გამოკვლევები ჩატარდა 21036 კომპიუტერული ტომოგრაფია და 4560 მამოგრაფია (ცხრილი 2.59).

ჰემოდიალიზის განყოფილებებში 265 ადგილზე ჩატარებულია 107573 ჰემოდიალიზი (ცხრილი 2.60).

ულტრაბერითი გამოკვლევები ჩატარდა: გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე - 77886, მუცლის ღრუს ორგანოებზე - 231289, ქალის სასქესო ორგანოებზე - 221818 (მათ შორის ორსულობის დროს - 101990), სარძევე ჯირკვლის - 17280, ფარისებრი ჯირკვლის - 45222 (ცხრილი 2.61).


2009 წელს ჩატარდა 27084 ენდოსკოპიური გამოკვლევა (ცხრილი 2.62).

5103927 ლაბორატორიული კვლევებიდან 1823324 - ჰემატოლოგიური, 148076 - ციტოლოგიური, 1397881 - ბიოქიმიური, 266707 - მიკრობიოლოგიური, 649292 - იმუნოლოგიური იყო (ცხრილი 2.63).

ფუნქციური დიაგნოსტიკის კაბინეტებში გამოკვლეული იქნა 347342 პაციენტი, მათ შორის 16194 ბავშვი. სულ ჩატარებულია 391874 კვლევა (ცხრილი 2.64).

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით, ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში მიმართულების **შეფარდება** ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა რაოდენობასთან 2004 წლიდან 2008 წლის ჩათვლით მცირდებოდა. 2009

წელს წინა წელთან შედარებით აღინიშნა შეფარდების ზრდა 7,2%-ით (სურათი 2.12).



2009 წლის მონაცემები არ წარმოადგინა: ქობილისის 15 სტომატოლოგიურმა პოლიკლინიკამ (კაბინეტმა); 5 დისპანსერმა (კანის და ვენსნეულებების №1, №4, №8, №6; ფტიზიო-პულმონოლოგიურმა №1); 7 სამედიცინო ცენტრმა (სტუდენტთა სანატორიუმ-პროფილაქტორიუმი, შპს „რეაბილიტაცია“, ენდოკრინოლოგიური ცენტრი; შპს „თერაპიის სახლი“, სამედიცინო ცენტრი „ქორწინება და ოჯახი“, რესპუბლიკური სპორტული მედიცინის და რეაბილიტაციის ცენტრი; შპს „თანადგომა“, ზესტაფონის საკვანძო პოლიკლინიკამ; 3 უბნის ამბულატორიამ (ქარელის რაიონი, სოფ. ავლევი; მარნეულის რაიონი, სოფ. აღმაშენებელი; ამბროლაურის რაიონი სოფ. ხიდიკარი). სტაციონარებიდან მონაცემები არ წარმოადგინა ახალგორის რაიონულმა საავადმყოფომ (28 საწოლი), შპს „აფხაზეთმა“ (5 საწოლი).

ცხრილი 2.1 ჯანდაცვის დაზინანების ტენდენციები საქართველოში, 2001-2009

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ჯანდაცვაზე მიუღიან დანახარჯების ხვედრითი წილი გვა-დან, %	7,8	8,7	8,5	8,5	8,6	8,4	8,2	8,7
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ხვედრითი წილი გვა-დან, %	1,1	1,2	1,3	1,3	1,7	1,8	1,5	1,8
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ხვედრითი წილი მიუღიან სახელმწიფო დანახარჯებში, %	6,1	6,3	6,7	5,4	6,0	5,7	4,2	4,9
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ხვედრითი წილი ჯანდაცვაზე მიუღიან დანახარჯებში, %	14,4	13,5	15,0	15,5	19,6	21,9	18,4	20,6
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯების ხვედრითი წილი ჯანდაცვაზე მიუღიან დანახარჯებში, %	76,7	74,3	77,6	78,4	77,7	73,0	72,4	68,9
ჯანდაცვაზე სამრთავიანობის დაფინანსების ხვედრითი წილი ჯანდაცვაზე მიუღიან დანახარჯებში, %	8,9	12,1	7,4	6,1	2,7	5,1	9,2	10,5
ჯანდაცვაზე მიუღიან დანახარჯები. მლნ. ლარი	521,5	650,7	724,8	835,9	998,3	1159,6	1386,6	1660,7
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები. მლნ. ლარი	75,3	88,1	108,5	129,9	195,7	254,5	255,5	342,7
აღმოსაზრებით თვითმმართველობის ორგანოების დანახარჯები ჯანდაცვაზე. მლნ. ლარი	23,5	21,2	20	26,7	41,4	17,7	15,6	14,5
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯები. მლნ. ლარი	399,9	483,6	562,5	655,3	775,2	846,3	1003,4	1144,1
აქედან წინასწარი ხმებით გადახდილი. მლნ. ლარი	2,4	2,6	2,8	6,7	7,5	9,8	20,8	24,5
ჯანდაცვაზე სამრთავიანობის დაფინანსება. მლნ. ლარი	46,3	78,9	53,8	50,7	27,4	58,8	127,7	173,6
ჯანდაცვაზე მიუღიან დანახარჯები ერთ სულ მოსახლეზე. ლარი	115	149	168	194	229	264	316	379
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები ერთ სულ მოსახლეზე. ლარი	17	20	25	30	45	58	58	78
ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯები ერთ სულ მოსახლეზე. ლარი	88	111	130	152	178	192	229	261
ჯანდაცვაზე სამრთავიანობის დაფინანსება ერთ სულ მოსახლეზე. ლარი	10	18	12	12	6	13	29	40

ცხრილი 2.2 **ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ქსელი, საქართველო, 2009**

	სამპ-პროფილატიკური დაწესებულებები	მათ შორის წარმდგენილი ანგარიშების მიხედვით
სტაციონარული დაწესებულებები	266	264
დისპანსერები	72	67
დამოუკიდებელი:		
პოლიკლინიკური დაწესებულებები	252	236
მათ შორის: სტომატოლოგიური პოლიკლინიკები	84	69
ქალთა კონსულტაციები	24	24
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურები	77	76
სოფლის სამედიკო აგზულატორიები	95	90
სინხლის გადასხმის სადგურები	6	6
ჩვილ ბავშვთა სახლები	2	2
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები	19	18
სამკურნალო ცენტრები	49	45
შემაჯალი:		
საავადმყოფოში შემაჯალი პოლიკლინიკები	74	74
სამედიკო ჯანაუწყებები	10	10
სოფლის სამედიკო აგზულატორიები	44	44
საფერული - საბავშვო კუნძულები	64	64
სოფლის მედიკ-მეწარმე	1105	1088

ცხრილი 2.3 ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ქსელი წარდგენილი ანგარიშების მიხედვით, საქართველო, 2009					
	პოლიკლინიკა	დისპანსერი	სამკურნალო ცენტრი	ქალთა კონსულტაცია	დამოუკიდებელი სამედიკო აგზულატორია
აფხაზეთი	10	1	0	1	1
აჭარა	17	8	3	0	0
თბილისი	87	12	26	12	4
ქანეთი	22	7	2	0	3
იმერეთი	36	14	4	4	8
სამეგრელო	17	5	4	3	4
შიდა ქართლი	11	5	0	2	1
ქვემო ქართლი	11	6	3	1	38
გურია	6	4	3	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	12	5	0	1	0
მცხეთა-მთიანეთი	3	0	0	0	21
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	3	0	0	0	10
სსკა უფყვაბი	1	0	0	0	0
საქართველო	236	67	45	24	90

ცხრილი 2.4 კადრებით უზრუნველყოფა, საქართველო, 2009						
	მედიკი, ფიზიკური პირი	უზრუნველყოფა 100000 სულ მოსახლეზე	საუბალო სამედიცინო პერსონალი	უზრუნველყოფა 100000 სულ მოსახლეზე	უმიტოსი სამედიცინო პერსონალი	უზრუნველყოფა 100000 სულ მოსახლეზე
აფხაზეთი	240	--	156	--	13	--
აჭარა	1258	327,1	1979	519,0	561	145,9
თბილისი	10098	881,6	7079	639,6	2636	230,1
ქანეთი	1371	340,1	1090	271,3	329	81,6
იმერეთი	2807	402,7	3074	443,0	1052	150,9
სამეგრელო	1394	296,0	1570	335,5	376	79,8
შიდა ქართლი	834	269,9	944	301,7	215	69,6
ქვემო ქართლი	981	197,9	861	170,6	281	56,7
გურია	395	283,6	445	320,6	113	81,1
სამცხე-ჯავახეთი	477	227,5	676	325,2	187	89,2
მცხეთა-მთიანეთი	335	309,3	345	292,1	53	48,9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	204	427,7	255	532,4	41	86,0
სსკა უფყვაბი	215	--	153	--	58	--
საქართველო	20609	467,2	18627	424,9	5915	134,1

ცხრილი 2.5 ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის სამედიცინო კადრები, საქართველო, 2006-2009				
	2006	2007	2008	2009
მედიკები (ფიზიკური პირი)	20597	19951	20253	20609
	<i>მათ შორის</i>			
თერაპევტები	1969	1875	1885	1403
ქირურგები (გავრცელება ქირურგების ჩათვლით)	935	906	972	1034
ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი	878	895	850	942
ტრავმატოლოგ-ორთოპედი	273	263	276	301
კარდიოლოგი	594	603	623	705
უროლოგი	231	223	231	235
ონკოლოგი	233	249	255	181
პედიატრი	1674	1978	1907	1653
ინფექციონისტი	255	255	258	237
ოტოლარინგოლოგი	292	307	326	327
ნეფროპათოლოგი	613	593	634	610
ოფთალმოლოგი	354	354	350	364
ნტომატოლოგი	1242	1198	1197	1115
მეანო – გინეკოლოგი	1407	1370	1417	1444
ფთიზიატრი	138	143	145	153
დერმატო-ვენეროლოგი	241	214	240	206
ფსიქიატრი	235	221	215	239
ენდოკრინოლოგი	286	299	307	319
ოჯახის მედიკი	169	233	459	1386*
სხვა სპეციალისტები	8578	7820	7705	7745

ცხრილი 2.6 სამედიცინო დაწესებულებებში საშუალო და უმაღლესი სამედიცინო კერსონალით უზრუნველყოფა, საქართველო, 2006 – 2009								
	2006		2007		2008		2009	
	სულ	მარეზინ-გამელი	სულ	მარეზინ-გამელი	სულ	მარეზინ-გამელი	სულ	მარეზინ-გამელი
საშუალო სამედიცინო პერსონალი	20207	459,5	19315	440,1	19593	446,9	18627	424,9
მედიკები	13572	308,6	13583	309,5	13207	301,3	12933	292,8
ფარმაცეუტი	1901	43,2	1194	27,2	1719	39,2	1325	29,9
მეანები	941	21,4	854	19,5	919	21,0	732	16,5
ფარმაცეუტ-მეანები	258	5,9	317	7,2	270	6,2	260	6,3
სხვა	3535	80,4	3367	76,7	3478	79,3	3377	76,6
უმაღლესი სამედიცინო პერსონალი	6074	138,1	5669	129,2	5834	133,1	5915	134,1

* მათ შორის სოფლის მედიკ-მეფარმე

ცხრილი 2.7 დაავადებათა გავრცელება 100000 სულ მოსახლეზე, საქართველო, 2009		
	პრეპალენტობა	იწმინდობა
სულ	50243,8	26514,9
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	1809,0	1439,8
სიმსივნეები	1337,6	294,8
ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნიტეტის დარღვევები	3664,7	908,1
ნისხლისა და სისხლგამაღორბანების ავადმყოფობები და იმუნური მძიმეობით მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები	568,2	400,2
ფსიქიური და ქვევითი ავადმყოფობები	2227,5	114,7
ნერვული სისტემის დაავადებები	2744,6	1031,3
თვალისა და მისი დანაწევების დაავადებები	2797,3	1083,6
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	952,9	641,3
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	9130,6	2177,3
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	11456,6	10145,7
საჭმლის მომკვლელობის სისტემის დაავადებები	6363,3	3765,4
შარდ-სასქმსო სისტემის დაავადებები	2553,8	1465,7
ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა*	1048,5	810,8
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	1193,8	910,3
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	1733,0	730,8
თანდაყოლილი მანკები, ღვთოვანობები და ქრომოსომული დარღვევები	184,7	42,8
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	4530,5	3245,8
სიმკვრივეები, ნიშნები და არაზუსტად აღნიშნული მდგომარეობები	174,2	148,7
დაზიანება, მოწამლა და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	1012,8	955,5

ცხრილი 2.8 დაავადებათა სტრუქტურული განაწილება კლასების, მიხედვით, საქართველო, 2009				
	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	ახალი შემთხვევები	%
სულ	2216203	100	1169546	100
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	79793	3,6	63510	5,4
სიმსივნეები	59000	2,6	13001	1,1
ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნიტეტის დარღვევები	161648	7,3	40054	3,4
ნისხლისა და სისხლგამაღორბანების ავადმყოფობები და იმუნური მძიმეობით მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები	25064	1,1	17653	1,5
ფსიქიური და ქვევითი ავადმყოფობები	121062	5,5	45489	3,9
ნერვული სისტემის დაავადებები	123384	5,6	47797	4,1
თვალისა და მისი დანაწევების დაავადებები	123384	5,6	47797	4,1
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	42031	1,9	28289	2,4
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	402741	18,1	96038	8,2
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	505340	22,7	447518	38,3
საჭმლის მომკვლელობის სისტემის დაავადებები	280680	12,6	166087	14,2
შარდ-სასქმსო სისტემის დაავადებები	112647	5,1	64652	5,5
ორსულობა, მშობიარობა და ლოგინობის ხანა	12283	0,6	9499	0,8
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	52657	2,4	40152	3,4
ძვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	76441	3,4	32236	2,7
თანდაყოლილი მანკები, ღვთოვანობები და ქრომოსომული დარღვევები	8148	0,4	1887	0,2
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	2673	0,1	1915	0,2
სიმკვრივეები, ნიშნები და არაზუსტად აღნიშნული მდგომარეობები	7684	0,3	6561	0,6
დაზიანება, მოწამლა და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	44673	2,0	42147	3,6

* მანქანები გამოთვლილია ფერტილური ასაკის ქალებზე

** მანქანები გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე

ცხრილი 2.9 დაავადებათა გავრცელება 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში (100000 ბავშვზე), საქართველო, 2009		
	პრეპალმტობა	ინციდენტობა
სულ	63198,8	52339,1
წონიერების ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	4944,5	4593,3
სიმსივნეები	54,7	20,7
ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნოლოგიის დარღვევები	2222,3	1060,2
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმით მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები	1648,8	1366,0
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	835,2	176,5
ნერვული სისტემის დაავადებები	3649,1	1746,4
თვალისა და მისი დანაწევების დაავადებები	2555,6	1383,3
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	1817,2	1543,5
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	808,9	180,5
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	34418,4	32753,9
საჭმლის მომკვლელობის სისტემის დაავადებები	3342,3	2527,6
შარდ-სასქმოსო სისტემის დაავადებები	1060,0	817,1
ორსულობა, მშობიარობა და ღოგიერობის ხანა*	1,7	1,7
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	2305,4	1955,8
ქვედა-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	739,4	312,8
თანდაყოლილი მანკები, ღეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	896,4	183,6
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა**	4530,5	3245,8
სიმკვრივეები, ნიშნები და არაზუსტად აღნიშნული მდგომარეობები	557,3	504,1
დაზიანება, მოწაფლა და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	986,6	957,8

ცხრილი 2.10 დაავადებათა სტრუქტურული განაწილება კლასების მიხედვით 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2009				
	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	ასალი შემთხვევა	%
სულ	475824	100	394061	100
წონიერების ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	37227	7,8	34583	8,8
სიმსივნეები	412	0,1	156	0,04
ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნოლოგიის დარღვევები	16732	3,5	7982	2,0
ა და სისხლძარღვოვანი სისტემის ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმით მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები	12414	2,6	10285	2,6
ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები	6288	1,3	1329	0,3
ნერვული სისტემის დაავადებები	27474	5,8	13149	3,3
თვალისა და მისი დანაწევების დაავადებები	19241	4,0	10415	2,6
ყურისა და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	13682	2,9	11621	2,9
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	6090	1,3	1359	0,3
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	259136	54,5	246604	62,6
საჭმლის მომკვლელობის სისტემის დაავადებები	25164	5,3	19030	4,8
შარდ-სასქმოსო სისტემის დაავადებები	7981	1,7	6152	1,6
ორსულობა, მშობიარობა და ღოგიერობის ხანა	13	10,0	13	10,0
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	17357	3,6	14725	3,7
ქვედა-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	5567	1,2	2355	0,6
თანდაყოლილი მანკები, ღეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	6749	1,4	1382	0,3
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	2673	0,6	1915	0,5
სიმკვრივეები, ნიშნები და არაზუსტად აღნიშნული მდგომარეობები	4196	0,9	3795	1,0
დაზიანება, მოწაფლა და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	7428	1,6	7211	1,8

* მანქანების გამოთვლილია ფერტილური ასაკის გოგონებზე

** მანქანების გამოთვლილია 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე

ცხრილი 2.11 სოფლის აგებულატორიებში და სოფლის მეიფების მიერ რეგისტრირებული დაავადებების შემთხვევები და აჩვენებლები 100000 სოფლის მოსახლეზე, საქართველო, 2009				
	რეგისტრირებული შემთხვევები	აჩვენებელი	ახალი შემთხვევები	აჩვენებელი
სულ	608034	13784,8	378563	8582,4
ზოგიერთი ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	27915	632,9	24585	557,4
სიმსივნეები	4208	95,4	1275	28,9
ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნიტეტის დარღვევები	30410	689,4	10517	238,4
სისხლისა და სისხლგამაღი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმით მიმდინარე ზოგიერთი დარღვევები	11672	264,6	8986	203,7
ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები	0	0	0	0
ნერვული სისტემის დაავადებები	21114	478,7	9219	209,0
თვალისა და მისი დანამატების დაავადებები	14572	330,4	7300	165,5
ჟურისა და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	9843	223,2	7030	159,4
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	133173	3019,2	41906	950,1
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	202340	4587,3	181958	4125,2
საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები	61263	1388,9	29228	662,6
შარდ-სასქმსო სისტემის დაავადებები	33128	751,0	16845	381,9
ორსულობა, შობიარობა და ლოგინობის ხანა	3408	290,9	2661	227,1
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	10791	244,6	7879	178,6
გულ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	22810	517,1	9357	212,1
თანდაყოლილი განკვეთი, ღვთრებადები და ქრომოსომული დარღვევები	736	16,7	328	7,4
პრინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მღვრეობა	365	592,0	307	497,9
სიმკბრეები, ნივთები და არაზუსტად აღნიშნული მღვრეობები	2310	52,4	1953	44,3
დაზიანება, მოზარდ და გარე მიზეზების შემთხვევების ზოგიერთი სხვა შემთხვევა	17976	407,5	17229	390,6

ცხრილი 2.12 სოფლის მოსახლეობის კირველადი სამედიცინო მომსახურება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009			
	დამოუხილავი სოფლის აგებულატორია	საფრულო-საბავიო კუნძულები (შემაკალი)	სოფლის მეიფი-მეფარე
აფსაქმთი	1	0	0
აჭარა	0	56	115
პანეთი	3	0	201
იმერეთი	8	0	201
სამეგრელო	4	0	153
შიდა ქართლი	1	5	123
ქვემო ქართლი	38	0	87
გურია	0	0	70
სამცხე-ჯავახეთი	0	0	61
მცხეთა-მთიანეთი	21	1	47
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	10	2	30
საქართველო	90	64	1088

ცხრილი 2.13 სოფლის აგებულატორიებში და სოფლის ექიმებთან მიმართებათა რიცხვი 1 სულ სოფლის მოსახლეზე, საქართველო, 2009		
	მიმართება 1 სულ	მარეგულირებელი 1 სულ სოფლის მოსახლეზე
აჭარა	177446	0,82
თბილისი	9635	0,32
პანკისი	329880	1,03
იმერეთი	359832	0,98
სამეგრელო	203859	0,72
შიდა ქართლი	182406	0,96
ქვემო ქართლი	168049	0,55
გურია	116265	1,13
სამცხე-ჯავახეთი	109300	0,75
მცხეთა-მთიანეთი	91084	1,11
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	26030	0,67
საქართველო	1773786	0,85

ცხრილი 2.14 სოფლის ექიმის მიერ ჩატარებული გამოკვლევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009					
	ოტოსკოპია	ოფტალმო-სკოპია	სფიგმომანო-მეტრია	ელექტრო-კარდიოგრაფია	პერიფერიული სისხლში გლუკოზის განსაზღვრა
აჭარა	3932	2251	36210	2036	2875
პანკისი	4132	2733	110320	3538	4987
იმერეთი	6225	5525	118333	7930	11666
სამეგრელო	3845	2437	46515	2532	7153
შიდა ქართლი	3801	2276	49635	3557	12196
ქვემო ქართლი	1633	2089	28491	2464	2470
გურია	1523	492	36565	920	2293
სამცხე-ჯავახეთი	1357	347	17248	1514	3206
მცხეთა-მთიანეთი	1824	1329	11738	362	2075
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	169	202	4405	423	377
საქართველო	28441	19681	459460	25276	49298

ცხრილი 2.15 დაავადებათა გავრცელება რეგიონების მიხედვით 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	პრეპალენტობა	ინციდენტობა	პრეპალენტობა	ინციდენტობა
აჭარა	30973,8	13938,9	49035,4	26312,3
თბილისი	57544,7	23758,9	65021,0	29676,2
პანკისი	35922,8	16390,3	46562,6	24979,9
იმერეთი	40602,1	19094,0	49293,8	26737,5
სამეგრელო	28639,9	10761,9	34666,9	17068,8
შიდა ქართლი	32895,8	16251,2	44481,9	27925,9
ქვემო ქართლი	19873,8	10807,6	22628,6	14128,9
გურია	31804,8	17407,1	37176,6	23654,7
სამცხე - ჯავახეთი	26086,6	13845,1	28901,3	18162,1
მცხეთა - მთიანეთი	36900,1	19918,7	48885,5	31475,5
რაჭა - ლეჩხუმი	52020,9	21077,2	53964,4	25478,0
საქართველო	41270,3	18420,0	50243,8	26514,9

ცხრილი 2.16 პირველადი სამედიცინო დახმარების დაწესებულებებში მიმართვათა რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე, საქართველო, 2003 - 2009							
მიმართვათა სახე	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
სულ მიმართვები	1,8	2,0	2,1	2,3	2,0	2,1	2,0
მძიმთან მისვლა (შველა ასაკობრივი ჯგუფი)	1,61	1,80	1,85	1,91	1,68	1,80	1,9
15 წლამდე ბავშვები	1,40	1,64	1,57	3,31	3,04	2,80	2,90
მძიმის ვიზიტი ბინაზე (შველა ასაკობრივი ჯგუფი)	0,10	0,12	0,11	0,16	0,11	0,10	0,09
15 წლამდე ბავშვები	0,24	0,26	0,25	0,28	0,25	0,23	0,21
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოკლება	0,04	0,05	0,10	0,16	0,17	0,18	0,20
15 წლამდე ბავშვები	0,004	0,003	0,04	0,08	0,08	0,07	0,10

ცხრილი 2.17 აგულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების დატვირთვა, საქართველო, 2003 – 2009							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
სულ მიმართვები	7783478	8549147	8718622	9256759	8016113	8519856	7889951
მათ შორის							
მძიმთან მიმართვა	6980832	7890279	8069045	8403132	7350753	7875066	7418789
გ.შ. სტომატოლოგიურ პოლიკლინიკებში	303240	306359	330360	321438	388946	344999	345057
ბინაზე ნახვა	418048	505862	475390	681940	500610	470241	424169
საბავშვო კუნძულებში	81358	153006	174187	171687	164750	174549	23122
გამოწერი სიმძლავრე (პაციენტთა მიღების შესაძლო რაოდენობა 1 ცვლაში 1 დღეში)	94390	94319	92061	87977	84819	87385	87405
ერთ ცვლაში ფაქტიური მიღება	29936	32881	33533	35603	30789	32769	33738
პოლიკლინიკური ქსელის დატვირთვის მაჩვენებელი	31,7	34,9	36,4	40,5	36,3	37,5	38,6

ცხრილი 2.18 ბავშვთა და მოზარდ-მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გასინჯვები, საქართველო, 2009						
	გასინჯულ ბავშვთა რაოდენობა სულ	გამოვლენილია გასინჯვის დროს				
		სამის დამჩვიება %	შედეგულობის დამჩვიება %	მეტყველების დამჩვიება %	სკოლიოზი %	ტანადობის დარღვევა %
15 წლამდე ბავშვები და 15-18 წლამდე მოზარდ-მოსწავლენი სულ	671213	0,18	0,69	0,45	0,91	0,60
მათ შორის						
15 წლამდე ბავშვები	530773	0,17	0,66	0,50	0,76	0,50
0-1 წლამდე	66203	0,05	0,06	0,01	0,04	0,03
1-5 წლამდე	163683	0,11	0,40	0,63	0,29	0,29
5-6 წლამდე	54007	0,35	1,64	1,48	1,88	1,51
15 წლის	53063	0,25	1,14	0,38	2,26	1,49
სკოლის დამთავრების წინ 16-18 წლამდე	87377	0,16	0,60	0,19	0,96	0,67
მათ შორის პაჭები	45984	0,11	0,29	0,11	0,67	0,51

ცხრილი 2.19 წვევამდელთა საშვიდნიო გავოკვლევის უდეგები, საქართველო, 2006 – 2009				
	2006	2007	2008	2009
წვევამდელთა რაოდენობა, რომელთაც საანგარიშო წელს ჩაუტარდა საშვიდნიო გავოკვლევა	7878	19420	29040	23731
იმყოფებიან მითვალწერების ქვეშ საანგარიშო წლის ბოლოს	2044	3091	4020	3673

ცხრილი 2.20 დღის სტაციონარები და მათი მუშაობა, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	საავადმყოფოები	ავგულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებები	საავადმყოფოები	ავგულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებები
დღის სტაციონარული განყოფილება	20	2	16	3
საწოლთა რაოდენობა	403	5	249	18
დღის სტაციონარებში მკურნალებდა	9005	290	7475	252

ცხრილი 2.21 ავგულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების ძირუბიული მუშაობა, საქართველო, 2004 – 2009						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ძირუბიული რაბრაციები სულ	22008	27525	25058	37456	27426	34398
<i>მათ შორის</i>						
გუდველობის რაბანოგე	963	1916	2831	3949	5214	6751
მათ შორის მიკროქირუბიული	343	951	1455	2431	2212	3162
მათ შორის ზღაუბრება	56	323	329	415	450	730
კატარაქტა	362	946	1725	2624	3297	4123
ფელ-წურ-ცხვირე	433	349	524	576	973	1240
მათ შორის წურე	0	85	12	5	27	20
სისხლკარღეგე	0	5	37	9	79	46
მუცლის ღრუს რაბანოგე	34	30	30	38	317	431
მათ შორის ჩაუჭედავი თიბრის კვეთა	4	8	22	20	139	120
საშინო-გინეკოლოგიური	6463	6009	6405	7439	7219	9098
სარქვე ჯირკვალე	137	361	164	296	317	1058
პანისა და კანქვეშა ძსრვილებე	10147	14358	10647	6250	8960	9070

ცხრილი 2.22 სტომატოლოგიურ პოლიკლინიკაში (კაბინებეში) მიმართვათა რაოდენობა, საქართველო, 2004 - 2009						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
მიმართვები სულ	306359	330360	321438	388946	344999	345057
<i>მათ შორის</i>						
15 წლაამდე ბავშვები	60102	69355	65408	58405	54393	38322
15-18 წლაამდე მოზარღები	26575	24936	24285	23761	24742	23358
პირველადი მიმართვების რაოდენობა სულ	152363	160033	141763	175978	170387	170017
<i>მათ შორის</i>						
15 წლაამდე ბავშვები	28094	35069	30079	28981	26112	20398
15-18 წლაამდე მოზარღები	15380	13866	12956	13313	12010	10563

ცხრილი 2.23 სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა და კაბინეტი, ქსელი, კადრები და მიმართვები წარმოდგენილი ანგარიშების მიხედვით, საქართველო, 2006 – 2009				
	2006	2007	2008	2009
დამუშავებული სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა	71	109	70	84
შემაჯავლი სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა (კაბინეტი)	467	354	439	353
მიმართვათა საერთო რაოდენობა	321438	388946	344999	345057
მათ შორის ბავშვთა მიმართვათა რაოდენობა	65408	58405	54393	38322
მიმართვების რაოდენობა 1 სულ მოსახლეზე	0,07	0,09	0,08	0,07
მიმართვათა რაოდენობა 1 ბავშვზე	0,08	0,08	0,07	0,05
მქიმთა რაოდენობა	1241	1198	1197	1115
საშუალო სამედიცინო პერსონალი (პბ. ტექნიკოსები)	197	191	217	195

ცხრილი 2.24 ფიზიკურ პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია სანაწარფო სამედიცინო ღაცმარება, საქართველო, 1988 – 2009									
	პირველადი სამედიცინო ღაცმარება გაეწია სულ	მათ შორის							
		უბედური შემთხვევის დროს		უცაბადი ავად გაცდოვის დროს		მშობიარობის და ათოლოგიური ორსულობის დროს		ამდგომარეობის, მშობიარეობის და ახალშობილის გაცდმანა	
		სულ	%	სულ	%	სულ	%	სულ	%
1988	1309352	62373	4,8	1111850	84,9	26897	2,1	96563	7,4
1990	1268859	53629	4,2	1107048	87,2	23583	1,9	84598	6,7
1995	156920	7774	5,0	144533	92,1	1317	0,8	3296	2,1
2000	150645	7982	5,3	138383	91,9	1366	0,9	2914	1,9
2001	135539	7618	5,6	124233	91,7	1126	0,8	2562	1,9
2002	162376	8421	5,2	147701	91,0	1243	0,8	5011	3,1
2003	192641	10166	5,3	172589	89,6	2104	1,1	7782	4,0
2004	218188	19560	8,9	191379	87,7	3137	1,4	4112	1,9
2005	453422	38594	8,5	393183	86,7	5246	1,2	16399	3,6
2006	683003	49068	6,4	599335	87,8	6584	1,0	33016	4,8
2007	726779	15930	2,2	644912	88,7	3319	0,5	62618	8,6
2008	768167	10912	1,4	751945	97,9	5310	0,7	28412	3,7
2009	883129	14579	1,6	863589	97,8	4961	0,6	85612	9,7

ცხრილი 2.25 ფიზიკურ პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია სანაწარფო სამედიცინო ღაცმარება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2005 - 2009					
	2005	2006	2007	2008	2009
აჭარა	48684	70542	69033	67924	80974
თბილისი	191418	259426	277818	320354	351836
პანეთი	23371	53010	58960	59469	65206
იმერეთი	60835	94157	93190	94154	108081
სამეგრელო	35929	38761	50470	49342	76625
შიდა ქართლი	18772	35205	38138	40851	45177
ქვემო ქართლი	32422	52041	56755	59314	65481
გურია	11693	23157	22636	24182	27515
სამცხე-ჯავახეთი	14441	23411	29191	25657	28717
მცხეთა-მთიანეთი	8077	20172	17395	17282	21735
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	7780	13121	13193	9638	11782
საქართველო	453422	683003	726779	768167	883129

ცხრილი 2.26 სასაზღვრო სამედიცინო დახმარების მიერ აღრიცხული გამოცემების რაოდენობა, საქართველო, 2003 - 2009							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
სულ გასვლები	192641	218188	453422	683003	750156	774192	907343
პირთა რაოდენობა, რომელთაც გაეწია დახმარება სანქცირებული პროგრამით	147112	164218	427264	669764	713373	754818	864502

ცხრილი 2.27 სისხლის სამსახურის მუშაობის ძირითადი მაჩვენებლები, საქართველო, 2004 - 2009							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
დონორების რაოდენობა სულ	27981	29135	32787	28983	30366	33991	
მათ შორის უსახშირლო (ნათესავი)	6030	7115	12360	7444	7575	11102	
მომუშავე პერსონალი სულ	452	456	443	371	317	358	
მათ შორის მძიმეები	94	121	126	103	92	108	
დაეჭადმუშა:							
უპონსერკანტო სისხლი სულ (ლიტრები)	14103	12290	13472	18133	23529	14424	
მათ შორის უსახშირლო (ლიტრები)	1789	2864	3952	8548	11201	6432	
მერიტორიტიული მასა (ლიტრები)	5490	5596	5982	6292	9693	5726	
ახლადგაყვანილი პლაზმა (ლიტრები)	5380	5750	6955	6130	10478	5041	
ლეიკოციტებით და თრომბოციტებით გაღარიბებული მერიტორიტიული მასა (ლ)	492	645	543	178	356	216	
თრომბოციტული მასა (დოზები)	1216	1953	1690	1324	105	885	
ალბუმინი (ლიტრები)	87	66	0	0	0	0	

ცხრილი 2.28 შეზღუდული ქმედითუნარიანობის მქონე პირთა რაოდენობა, საქართველო, 2009	
	2009
საანგარიშო წლის დასაწყისში იმყოფება აღრიცხვაზე სულ	72138
მათ შორის	
გავშვები 0-15 წლამდე	4304
ოქმის ინვალიდები	4682
საანგარიშო წლის მთავალწერებობაზე ახლად აყვანილია	9058
საანგარიშო წლის მთავალწერებობიდან მოიხსნა	8020
მათგან გარდაიცვალა	2490
საანგარიშო წლის ბოლოს დისანსერული მთავალწერებობის ქვეშ იმყოფება	73176

ცხრილი 2.29 დისანსერულ მთავალწერებობაზე მყოფ შეზღუდული ქმედითუნარიანობის პირთა განაწილება ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2009			
	სულ	მათ შორის	
		0-15 წლამდე ასაკის გავშვები	ოქმის ინვალიდი
საანგარიშო წლის ბოლოს მთავალწერებობის ქვეშ იმყოფება	73176	4622	3581
მათ შორის ქმედითუნარიანობის შეზღუდვა ჯგუფების მიხედვით:			
I კვებითად	6687	--	521
II მთავალწერებობა	37025	--	2692
III ზომიერად	6108	--	368

ცხრილი 2.30 ჩვილ ბავშვთა სასაფლაოები და მათი მუშაობა, საქართველო, 2006 – 2009				
	2006	2007	2008	2009
ჩვილ ბავშვთა სასაფლაოების რაოდენობა	2	2	2	2
ბავშვთა აღზრდის რაოდენობა	210	182	185	200
თანაფრთხილთა რაოდენობა	224	145	153	153
მათ შორის				
მძიმი	19	8	9	9
საშუალო სამედიცინო პერსონალი	24	9	9	13
პედიატრები	79	77	75	77
ბავშვთა სასაფლაოებში საანგარიშო წლის ბოლოს იმყოფებოდა ბავშვი				
სულ	154	164	160	188
მათ შორის				
0-1 წლის ასაკის	40	47	60	38
1-3 წლის ასაკის	66	77	59	73
3 წლის და მეტი	48	40	41	77
წლის განმავლობაში გასულ ბავშვთა რაოდენობიდან:				
ფაქვანდია მშობლების მიერ	95	60	30	26
გაუქმებულია	25	6	11	4
გადამკვეთი ასაკის გამო სახალსო განათლების და სოციალურუკუვამყოფის დაწყებულ შემთხვევები	2	8	11	32
გარდაიცვალა	24	23	24	33

ცხრილი 2.31 საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სტაციონარული დაწესებულებების ძველი წარდგენილი ანგარიშების მიხედვით, საქართველო, 2009								
	სულ		მათ შორის					
			საავადმყოფო		დისპანსერი		სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტი	
	რაოდენობა	საწოლები	რაოდენობა	საწოლები	რაოდენობა	საწოლები	რაოდენობა	საწოლები
ავსაყვითი	2	21	2	21	0	0	0	0
ატარა	20	1036	17	989	3	47	0	0
თბილისი	96	5716	78	4078	1	13	17	1625
კახეთი	21	660	21	660	0	0	0	0
იმერეთი	37	2385	35	2330	2	55	0	0
სამეგრელო	26	962	25	947	1	15	0	0
შიდა ქართლი	11	594	11	594	0	0	0	0
ქვემო ქართლი	23	845	23	845	0	0	0	0
გურია	6	264	5	239	1	25	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	13	633	13	633	0	0	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	6	159	6	159	0	0	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	4	215	4	215	0	0	0	0
სხვა უწყვეტი	1	176	1	176	0	0	0	0
საქართველო	266	13666	241	11886	8	155	17	1625

ცხრილი 2.32 საწოლთა ფონდის გამოყენების მაჩვენებლები, საქართველო, 2009

	საწოლებით უზრუნველყოფა 100000 სულ მოსახლეზე	დატვირთვა საწოლზე	დაყოვნება	ბრუნვა
აფხაზეთი	--	45,0	4,3	10,5
აჭარა	269,4	172,2	6,1	28,1
თბილისი	499,0	166,8	6,4	25,9
პანკისი	163,7	110,2	4,2	26,2
იმერეთი	342,1	146,8	7,2	20,5
სამეგრელო	204,2	127,6	5,8	21,8
შიდა ქართლი	192,2	145,2	6,2	23,4
მცხეთა-მთიანეთი	170,5	121,0	6,1	19,9
გურია	189,5	103,3	5,3	19,4
სამცხე - ჯავახეთი	301,9	106,1	8,2	13,0
მცხეთა - მთიანეთი	121,0	87,6	3,3	27,0
რაჭა - ლეჩხუმი	450,7	61,7	6,5	9,4
სსპა უწყება	--	205,6	8,5	24,1
საქართველო	309,1	148,2	6,3	23,4

ცხრილი 2.33 საწოლთა ფონდი პროვინიის მიხედვით და მისი გამოყენების მაჩვენებლები, საქართველო, 2009

საწოლთა პროვინია	საწოლთა რაოდენობა	დატვირთვა საწოლზე (დღეებში)	დაყოვნება	ბრუნვა
თერაპიული	1914	115,1	4,5	25,9
კლინიკური	1369	174,6	6,3	28,2
ქირურგიული	3475	108,8	4,9	22,2
ონკოლოგიური და რადიოლოგიური	446	272,8	14,5	18,8
ინფექციური	844	90,9	5,6	16,2
ტუბერკულოზის	528	294,5	51,2	5,7
სამანო-გინეკოლოგიური	2592	136,9	4,0	34,1
ნეპროლოგიური	296	135,5	6,5	21,1
ფსიქიატრიული და ნარკოლოგიური	1335	245,7	71,2	3,5
ოტორინოლოგიური	194	52,1	1,5	33,5
ოფთალმოლოგიური	114	86,8	3,0	29,1

ცხრილი 2.34 კოსპიტალიზაცია რეგიონების მიხედვით, 100000 მოსახლეზე, საქართველო, 2008 - 2009

	2008		2009	
	შემოსულ პაციენტთა რაოდენობა	კოსპიტალი- ზაციის დღე 100000 სულ მოსახლეზე	შემოსულ პაციენტთა რაოდენობა	კოსპიტალი- ზაციის დღე 100000 სულ მოსახლეზე
აფხაზეთი	514	--	168	--
აჭარა	30261	7936,3	29139	7576,4
თბილისი	150741	13620,8	148413	12957,3
პანკისი	18626	4636,8	17260	4281,8
იმერეთი	47627	6863,7	48758	6994,4
სამეგრელო	19975	4269,1	21028	4464,5
შიდა ქართლი	13734	4389,3	13992	4528,2
მცხეთა-მთიანეთი	15692	3108,6	16947	3418,8
გურია	5823	4195,2	5166	3708,5
სამცხე - ჯავახეთი	8034	3864,4	8207	3913,7
მცხეთა - მთიანეთი	3317	2808,6	3466	3200,4
რაჭა - ლეჩხუმი	2712	5661,8	2039	4274,6
სსპა უწყებები	3939	--	4289	--
საქართველო	320995	7322,3	318872	7229,2

ცხრილი 2.35 სტაციონარიდან გასული და გარდაცვლილი ავადმყოფების რაოდენობა, საქართველო, 2009		
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა
სულ	311458	6448
მათ შორის		
წოვიერები ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	16915	171
სიმსივნეები	14872	335
მედიკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნიტეტის დარღვევები	3836	70
სისხლისა და სისხლგვარი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმით მიმდინარე წოვიერები დარღვევები	1028	23
ფსიქიური და ქვევითი აუზილობები	4800	55
ნერვული სისტემის დაავადებები	5486	263
თვალებისა და მისი დანაგებების დაავადებები	4809	0
მუცლისა და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	753	0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	42823	2736
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	55117	492
საჭმლის მომუშაველი სისტემის დაავადებები	30694	541
შარდ-სახმესო სისტემის დაავადებები	12184	114
ორსულობა, გუმიარობა და ლობინობის ხანა	77764	21
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	3303	7
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	4746	12
თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	1725	62
კვინატალურ კერიოლში განვითარებული წოვიერები მდგომარეობები	6512	636
სიმკბრეები, ნიშნები და არაფუნქციონირებელი მდგომარეობები	2455	318
დაზიანება, მოწყველა და გარე მიზეზების შემთხვევების წოვიერები სხვა შემთხვევები	21636	592

ცხრილი 2.36 სტაციონარიდან გასული და გარდაცვლილი 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობა, საქართველო, 2009				
	გასულია ავადმყოფი		მათ შორის 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვები	
	სულ	მ.შ. გარდაიცვალა	გასულია სულ	მ.შ. გარდაიცვალა
სულ	65490	971	23469	839
მათ შორის				
წოვიერები ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	9452	50	3258	40
სიმსივნეები	928	15	289	4
მედიკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნიტეტის დარღვევები	406	0	153	0
სისხლისა და სისხლგვარი ორგანოების ავადმყოფობები და იმუნური მექანიზმით მიმდინარე წოვიერები დარღვევები	349	4	95	1
ფსიქიური და ქვევითი აუზილობები	47	0	0	0
ნერვული სისტემის დაავადებები	1539	23	586	11
თვალებისა და მისი დანაგებების დაავადებები	205	0	6	0
მუცლისა და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	160	0	7	0
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	208	5	1	0
სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები	34847	97	10824	69
საჭმლის მომუშაველი სისტემის დაავადებები	4207	4	331	2
შარდ-სახმესო სისტემის დაავადებები	921	4	105	1
ორსულობა, გუმიარობა და ლობინობის ხანა	47	0	0	0
კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებები	596	0	159	0
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	344	0	30	0
თანდაყოლილი მანკები, დეფორმაციები და ქრომოსომული დარღვევები	1383	61	660	40
კვინატალურ კერიოლში განვითარებული წოვიერები მდგომარეობები	6512	636	6511	635
სიმკბრეები, ნიშნები და არაფუნქციონირებელი მდგომარეობები	1052	49	295	33
დაზიანება, მოწყველა და გარე მიზეზების შემთხვევების წოვიერები სხვა შემთხვევები	2287	23	159	3

ცხრილი 2.37 ღებტალობა სტატეონარში, სტარტემლო, 2009			
	სულ	ბათ შორის	
		0-15 წლამდე ასაკის ბავშვები	0-1 წლამდე ასაკის ბავშვები
სულ	2,1	1,5	3,6
ბათ შორის			
წომბირთი ინფექციური ღა პარაზიტული ღაავადებები	1,0	0,5	1,2
სიმსივნეები	2,3	1,6	1,4
მელოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებატა ცვლის ღა იმუნიტეტის ღარღვევები	1,8	0	0
სისხლისა ღა სისხლბბადი ორბანოების ავადმყოფობები ღა იმუნური მქანოშიტი მიმღინარე წომბირთი ღარღვევები	2,2	1,1	1,0
წსიქიური ღა ქვევითი აწლილობები	1,1	0	0
ნერვული სისტემის ღაავადებები	4,8	1,5	1,9
თვალისა ღა მისი ღანამატების ღაავადებები	0	0	0
წურიბა ღა ღვრეღისბბრი მორჩის ღაავადებები	0	0	0
სისხლის მიმქცევის სისტემის ღაავადებები	6,4	2,4	0
სუნთქვის ორბანოტა ღაავადებები	0,9	0,3	0,6
საჭმლის მომეღვებელი სისტემის ღაავადებები	1,8	0,1	0,6
შარღ-სასქსო სისტემის ღაავადებები	0,9	0,4	0,9
ორსულობა, მყობიარობა ღა ღომინოების სანა	0,03	0	0
კანისა ღა კანქვეა ქსოვილის ღაავადებები	0,2	0	0
ქვალ-კუნთოვანი სისტემის ღა შმამრთებელი ქსოვილის ღაავადებები	0,3	0	0
თანღამოღილი ბანქები, ღეფორბაციები ღა ქრომოსომული ღარღვევები	3,6	4,4	6,1
კერინატალურ კერიოღში ბანვითარებული წომბირთი მღგომარეობები	9,8	9,8	9,7
სიმპტომები, ნიშნები ღა არაწუსტად აღნიშნული მღგომარეობები	13,0	4,6	11,2
ღაწინება, მოწაველა ღა ბარე მიწეწების წმომქმეღების წომბირთი სსპა შმღებები	2,7	1,0	1,9

ცხრილი 2.38 ქირურბიული ობერაციები, სტარტემლო, 1994 – 2009						
	ობერაციების რაოღნობა			ბათ შორის ბავშვები		
	სულ	ბანქვებელი 1000 სულ მოსახლზე	ღებტალობა (%)	სულ	ბანქვებელი 1000 ბავშვზე	ღებტალობა (%)
1994	108194	21,9	0,7	13018	11,5	0
1995	97583	20,4	0,7	10774	9,9	0
1996	79087	16,9	0,7	10057	9,6	0
1997	79114	17,4	0,7	8875	8,8	0
1998	79046	17,5	0,8	9810	9,9	0
1999	74234	16,6	0,8	9219	9,6	0
2000	69360	15,6	0,8	9262	9,8	0,7
2001	75905	17,2	0,7	10415	11,3	0,6
2002	77657	17,8	0,7	10463	11,7	0,3
2003	82626	19,1	0,7	10970	13,0	0,5
2004	90790	20,8	0,7	10945	11,9	0,4
2005	98695	22,6	0,7	11655	12,7	0,5
2006	100303	22,8	0,6	11194	14,1	0,4
2007	100438	22,9	0,5	11722	15,3	0,2
2008	121189	27,6	0,5	13943	18,5	0,6
2009	123900	28,1	0,5	11361	15,1	0,5

ცხრილი 2.39 ძირუბიული ოპერაციები ზოგადი ნარკოზით, სპარტველო, 1994 - 2009			
	ზოგადი ნარკოზით	პროცენტი სამართო რაოდენობიდან	ლმტალობა (%) ზოგადი ნარკოზის ზმდვბად
1994	28286	26,1	0,02
1995	32360	33,2	0,01
1996	24400	30,9	0,01
1997	30864	39,0	0,01
1998	32363	40,9	0,04
1999	31974	43,1	0,02
2000	32213	46,4	0,02
2001	34173	45,0	0,02
2002	35261	45,4	0,03
2003	39386	47,7	0,03
2004	43030	47,4	0,03
2005	54499	55,2	0,01
2006	54771	54,6	0,01
2007	57004	56,7	0,01
2008	71725	59,2	0,01
2009	73376	59,2	0,02

ცხრილი 2.40 ქირურგიული ოპერაციები, სამართველო, 2009				
	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი		ოპერაციის უმღვამლ ბარდნიცვალა	ღმტალუბა სულ (%)
	სულ	მათ შორის ბავშვებში		
სულ ოპერაციები	123900	11361	570	0,5
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	3450	198	93	2,7
მათ შორის თავის ტვინზე	1101	126	73	6,6
ზურბის ტვინზე	133	27	3	2,3
ტვინის გარსებზე	284	0	0	0
პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	144	0	1	0,7
გულთაშუა ღისებზე	1701	0	1	0,1
ოპერაციები მდორანული სისტემის ორგანოებზე	1070	3	1	0,1
მათ შორის კიკოვიზე	10	0	0	0
ფარისებრ ჯირკვალზე	1017	2	1	0,1
პარათირიდექტომია	22	1	0	0
აღრნაღქტომია	9	0	0	0
ოპერაციები მღვმელობის ორგანოზე	5124	297	0	0
მათ შორის გლაუკომის	594	17	0	0
მნუღმაციის	132	5	0	0
კატარაქტის მიზეზით	2803	44	0	0
ოპერაციები ყურზე, ცხვირზე	3895	1225	0	0
მათ შორის ყურზე	308	3	0	0
აღწერიღქტომია	2043	1103	0	0
ოპერაციები ნუშიზმარ ჯირკვალზე	6713	3346	0	0
ოპერაციები სუნთქვის ორგანოებზე	1035	58	18	1,7
მათ შორის კულმონექტომია	69	0	9	13,0
ვილტვის ფილის მოკვეთა (რეზექცია)	106	3	4	3,8
ვილტვის სეგმენტის მოკვეთა (რეზექცია)	91	1	0	0
სორსზე	287	6	4	1,4
სასულეს რეზექცია	60	0	0	0
ბრუნძის რეზექცია	9	0	0	0
კლმერის რეზექცია	23	2	0	0
ოპერაციები გულზე	1373	255	48	3,5
მათ შორის ღია გულზე	788	239	41	5,2
გულის თანღაყოლილი მანკების გაყო	162	5	4	2,5
მნდოგასკულური ბაღონური ღილატაცია	187	9	0	0
პარღირსტიმულატორის იმპლანტირება	112	2	1	0,9
პერიკარდექტომია	16	0	0	0
ოპერაციები სისხლკარღმებზე	3957	10	19	0,5
ოპერაციები საჭმლის მომნეღმეღ და ყუცლის ღრუს ორგანოებზე	26334	3625	322	1,2
ოპერაციები თირკმღმესა და ფარღსაყვეთზე	2421	136	11	0,4
მათ შორის თირკმლის გაღანერება	9	0	1	11,1
ოპერაციები წინამღმებარე ჯირკვალზე	1275	12	5	0,4
ოპერაციები ძალის სასმესო ორგანოებზე	9722	8	8	0,1
სამეანო - გინეკოლოგიური ოპერაციები	35535	3	4	0,01
მათ შორის სავვიღონონობარე ორსულღების გაყო	1219	0	1	0,1
ოპერაციები კვალკუნთოვან სისტემაზე	9323	683	28	0,3
მათ შორის : კიღურების ან მისი ნაწილის აგვუტაცია	862	8	19	2,2
მათ შორის : კიღურების ან მისი ნაწილის აგვუტაცია ღიაგვტის გაყო	467	0	7	1,5
ოპერაციები სარკმე ჯირკვალზე	1896	14	0	0
ოპერაციები კანზე და კანმეღა უჯრეღისზე	5262	788	0	0

ცხრილი 2.41 ქირურგიული ოპერაციები, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი სულ	ლეტალობა სულ (%)	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი სულ	ლეტალობა სულ (%)
სულ ოპერაციები	121189	0,5	123900	0,5
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	3239	3,6	3450	2,7
ოპერაციები ქნდოკრინული სისტემის ორგანოებზე	1180	0	1070	0,1
ოპერაციები თვალზე	5748	0	5124	0
ოპერაციები ყურზე, ცხვირზე	3513	0	3895	0
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	1564	0,7	1035	1,7
ოპერაციები გულზე	1253	4,6	1373	3,5
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	3207	0,3	3957	0,5
ოპერაციები საჭმლის მომნელობელ და გუცლის ღრუს ორგანოებზე	28614	0,9	26334	1,2
ოპერაციები თირკმლებზე და შარდსაწვეთზე	2620	0,3	2421	0,4
ოპერაციები წინამდებარე ჯირკვალზე	1097	0,1	1275	0,4
ოპერაციები ძალიან სასქესო ორგანოებზე	8543	0,1	9722	0,1
სამედიკო-გინეკოლოგიური ოპერაციები	32159	0,003	35535	0,01
ოპერაციები კვალკუნთოვან სისტემაზე	9365	0,4	9323	0,3
ოპერაციები სარკვევ ჯირკვლებზე	1935	0	1896	0
ოპერაციები კანზე და კანქვეშა უჯრედისზე	5560	0,3	5262	0

ცხრილი 2.42 ქირურგიული ოპერაციები ბავშვებში, საქართველო, 2009			
	სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	ოპერაციის შედეგად გარდაიცვალა სულ	ლეტალობა სულ %
სულ ოპერაციები	11361	55	0,5
მათ შორის			
ოპერაციები ნერვული სისტემის ორგანოებზე	198	0	0
ოპერაციები სასუნთქ ორგანოებზე	58	0	0
ოპერაციები გულზე	255	27	10,6
ოპერაციები საჭმლის მომნელობელ და გუცლის ღრუს ორგანოებზე	3625	27	0,7
ოპერაციები კვალკუნთოვან სისტემაზე	683	1	0,1

ცხრილი 2.43 ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	ოპერაციების რაოდენობა	ლეტალობა %	ოპერაციების რაოდენობა	ლეტალობა %
აფხაზეთი	219	0	0	0
აჭარა	13207	0,2	12614	0,5
თბილისი	60604	0,6	61610	0,6
კახეთი	5241	0,3	5292	0,3
იმერეთი	18228	0,5	19945	0,4
სამეგრელო	5778	0,5	6289	0,2
შიდა ქართლი	4781	0,1	4666	0,1
ქვემო ქართლი	5459	0,2	5588	0,2
გურია	1792	0	1625	0,1
სამცხე-ჯავახეთი	2471	0,1	2596	0,2
მცხეთა-მთიანეთი	1198	0,3	1305	0,5
რაჭა-ლეჩხუმი	400	0,3	242	1,2
სსკა უწყება	1733	0,4	2128	0,3
საქართველო	121111	0,5	123900	0,5

ცხრილი 2.44 გადაუღებელი ძირუბიული ოპერაციები, საქართველო, 1994 – 2009			
	ზოგიერთი გადაუღებელი ოპერაციები	პროცენტი სამართო რაოდენობიდან	ლბტალობა (%)
1994	11407	10,5	1,9
1995	12387	12,7	1,7
1996	11444	14,5	1,2
1997	13007	16,4	1,7
1998	13596	17,2	1,5
1999	14484	19,5	1,4
2000	13982	20,2	1,4
2001	13372	17,6	1,1
2002	13610	17,5	1,4
2003	16498	20,0	1,3
2004	17541	19,3	1,4
2005	18414	18,6	1,4
2006	20146	20,1	1,2
2007	20369	20,3	1,4
2008	23022	19,0	1,1
2009	21818	17,6	1,3

ცხრილი 2.45 გადაუღებელი ძირუბიული ოპერაციები, საქართველო, 2009			
	სულ	ოპერაციის შუღშაღ ბარღანიღვაღა	ლბტალობა (%)
გაღაუღებელი ძირუბიული ღახღარღა	21818	275	1,3
<i>ღათ შორის</i>			
ნაღლაღის ღღვაღე გაღვაღობის გაღო	1072	73	6,8
ღღვაღე ააღენღიღიღის გაღო	8281	3	0,03
კუღის ღა თორღმღტოღა ნაღლაღის აერღორაღიღის გაღო	487	21	4,3
კუღ-ნაღლაღური სიღსღღენის გაღო	173	34	19,7
ღაღღღიღი თიღღღის გაღო	3548	20	0,6
ღღვაღე კოღენიღიღიღის გაღო	1925	16	0,8
ღღვაღე აანღრღაღიღიღის გაღო	115	7	6,1
საღღიღონღონღარღ ორღსღღღის გაღო	1219	1	0,1
საღღენღღღიღი	161	5	3,1
სსღა ოპერაღიღიღი ღღღღის ღღღს ორღანღღღღ	2126	75	3,5
ღიღღღის რღღღღიღი	87	1	1,1
ნეღრღღღღიღი	278	5	1,8
ორღღღღღიღი	292	0	0
ორღარღღღღი	414	0	0
სსღა ოპერაღიღიღი ღარღსღსღღსი სიღღღღღ	927	1	0,1
კიღღღის ან ღიღი ნაღღიღის აგღღღიღი	713	13	1,8

ცხრილი 2.46 გადაუდგებელი ძირუბიული ოპერაციების სტრუქტურა, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	სულ	%	სულ	%
გადაუდგებელი ძირუბიული დახარჯება	23022	100	21818	100
<i>მათ შორის</i>				
მფვავე აპენდიციტის გაყო	9066	39,4	8281	38,0
კუჭის და თორმეტკოჯა ნაწლავის პერფორაციის გაყო	635	2,8	487	2,2
მფვავე ქოლესისტიტის გაყო	1646	7,1	1925	8,8
ნაწლავების მფვავე გაუპაღობის გაყო	1106	4,8	1072	4,9
კუჭ-ნაწლავური სისხლდენის გაყო	239	1,04	173	0,8
ჩატედილი თიამარი გაყო	4067	17,7	3548	16,3
მფვავე პანკრეატიტის გაყო	98	0,4	115	0,5
საშვილოსნოსგარე ორსულობის გაყო	1170	5,1	1219	5,6
საღმეშტომია	205	0,9	161	0,7
სსვა ოპერაციები გუცლის ღრუს ორგანოებზე	2497	10,8	2126	9,7
ვილტის რეშეშტია	100	0,4	87	0,4
ნეშრეშტომია	130	0,6	278	1,3
ორეშტომია	163	0,7	292	1,3
ოპარეშტომია	386	1,7	414	1,9
სსვა ოპერაციები შარღსასქესო სისტემაზე	653	2,8	927	4,2
კიღურის ან შისი ნაწილის აგუშტაცია	861	3,7	713	3,3

ცხრილი 2.47 ზოგიერთი გადაუდგებელი ძირუბიული ოპერაცია, დაავადების დაწეშებიან სტაციონარში შემოყვანის ვადები, საქართველო, 2009							
	სტაციონარში შემოყვანილი ავადმყოფები			მათ შორის			
	სულ	მ.შ. 24 საათზე გვიან		არ იღნა ოპერირებაული	ღეტაღობა (%)	ოპერირებაული	ღეტაღობა (%)
		სულ	%				
მფვავე ნაწლავური გაუპაღობა	1238	282	22,8	166	4,2	1072	6,8
მფვავე აპენდიციტი	8374	1329	15,9	93	0	8281	0,04
კუჭისა და თორმეტკოჯა ნაწლავის პერფორირებაული წყღული	489	44	9,0	2	0	487	4,3
კუჭნაწლავური სისხლდენა	1267	203	16,0	1094	2,2	173	19,6
ჩატედილი თიამარი	3574	266	7,4	26	3,8	3548	0,6
მფვავე ქოლესისტიტი	2054	419	20,4	129	0	1925	0,8
მფვავე პანკრეატიტი	261	73	28,0	146	1,4	115	6,1
საშვილოსნოსგარე ორსულობა	1219	27	2,2	0	0	1219	0,1
საღმეშტომია	263	1	0,4	2	0	161	3,1
სსვა ოპერაციები გუცლის ღრუს ორგანოებზე	2273	89	3,9	147	1,4	2126	3,5
ვილტის რეშეშტია	87	0	0	0	0	87	1,1
ნეშრეშტომია	279	13	4,7	2	0	278	1,8
ორეშტომია	302	36	1,9	10	0	292	0
ოპარეშტომია	416	20	4,8	2	0	414	0
სსვა ოპერაციები შარღსასქესო სისტემაზე	978	72	7,4	51	0	927	0,1
კიღურის ან შისი ნაწილების აგუშტაცია	724	182	25,1	11	0	713	1,8

ცხრილი 2.48 ოპერაციები საჭმლის მომნელებელ და გუდის ღრუს ორგანოებზე, საქართველო, 1994 – 2009						
	სულ	ლენტალობა %	მათ შორის			
			გადაუღებელი ოპერაციები		სხვა ოპერაციები	
			რაოდენობა	ლენტალობა %	რაოდენობა	ლენტალობა %
1994	17971	2,2	10633	2,1	7338	2,4
1995	17584	2,0	11612	1,8	5972	2,3
1996	14899	1,8	10618	1,3	4281	3,0
1997	16967	1,9	11982	1,8	4985	2,1
1998	18266	1,9	12755	1,6	5511	2,6
1999	18948	1,8	13478	1,4	5470	2,6
2000	18055	1,7	12991	1,5	5064	2,3
2001	18367	1,6	12385	1,1	5982	2,4
2002	19979	1,4	12711	1,4	7268	1,4
2003	19647	1,4	13346	1,1	6301	1,9
2004	24419	1,4	14029	1,2	10390	1,6
2005	23434	1,4	14680	1,1	8754	2,0
2006	24617	1,2	17873	1,2	6744	1,2
2007	24592	1,1	18038	1,2	6554	1,0
2008	28614	0,9	19559	1,2	9055	0,5
2009	26334	1,2	17888	1,4	8446	0,8

ცხრილი 2.49 მაღალი ლენტალობის მქონე ოპერაციები გუდის ღრუს ორგანოებზე, რომლებიც გადაუღებელი ოპერაციების ჩამონათვალები არ შედის, საქართველო, 1994 – 2009		
	ოპერაციების რაოდენობა	ლენტალობა (%)
1994	2872	4,6
1995	2588	4,5
1996	2153	5,0
1997	2733	3,5
1998	2565	1,3
1999	3180	3,9
2000	2304	3,9
2001	2694	4,6
2002	3776	2,5
2003	2812	3,8
2004	2706	3,2
2005	3343	3,2
2006	2795	2,5
2007	3033	2,1
2008	4027	2,0
2009	3286	2,4

ცხრილი 2.50 ძირუბიული საწოლები მუშაობი მარენებლები, საქარტველო, 1995 – 2009				
	ძირუბიული საწოლები			
	სულ	ლატვირთვა საწოლზე (დღეებში)	ლაწონება	ბრუნვა
1995	7006	115,7	14,8	7,9
1996	5210	85,5	10,1	8,6
1997	5509	84,2	9,7	8,8
1998	5387	95,3	10,0	9,6
1999	5395	89,8	9,2	9,9
2000	5022	74,7	8,2	9,1
2001	4787	75,8	7,6	10,0
2002	4518	82,0	7,6	10,9
2003	4516	79,4	7,1	11,3
2004	4441	83,2	6,8	12,4
2005	4256	83,5	6,2	13,7
2006	3990	90,1	5,7	15,9
2007	3584	113,9	5,9	19,3
2008	3453	125,1	5,5	23,1
2009	3475	108,8	4,9	22,2

ცხრილი 2.51 ბავშვთა ძირუბიული საწოლები მუშაობი მარენებლები, საქარტველო, 1995 – 2009				
	ბავშვთა ძირუბიული საწოლები			
	სულ	ლატვირთვა საწოლზე (დღეებში)	ლაწონება	ბრუნვა
1995	770	94,3	11,7	8,2
1996	666	79,1	9,3	8,7
1997	630	73,4	9,0	8,3
1998	655	78,7	8,7	9,2
1999	563	82,8	8,5	9,8
2000	588	70,7	7,5	9,6
2001	522	82,9	7,8	1,8
2002	513	78,5	7,6	10,5
2003	529	11,4	7,3	15,7
2004	549	116,7	6,0	19,6
2005	537	125,0	4,6	27,4
2006	460	134,2	7,3	18,3
2007	372	208,7	8,9	23,1
2008	389	153,8	6,2	24,6
2009	244	89,8	3,9	23,3

ცხრილი 2.52 პათოლოგანატომიური სამსახურის გუშაობა, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	პათოლოგანატომიური გამოკვლევების რაოდენობა	% სტაციონარში გარდაცვლილთა სამართო რაოდენობიდან	პათოლოგანატომ- იური გამოკვლევების რაოდენობა	% სტაციონარში გარდაცვლილთა სამართო რაოდენობიდან
სულ	137	2,2	90	1,4
ბათ შიგნით				
ბავშვები 0-14 წლის ასაკში	44	4,8	30	3,1
ახალშობილები 0-6 დღის ასაკში	8	1,5	11	2,0
მკვლადშობილები	97	13,5	254	38,2

ცხრილი 2.53 მონაცემები დროულად ჩატარებული აცრების შესახებ, საქართველო, 2009		
ვაქცინა	ვაქცინაციის ასაკი კალენდარის მიხედვით	აცრილთა რაოდენობა კალენდარის მიხედვით
ბცშ-1 (დროული)	0 - 5 დღე	58199
ბცშ-1	0 - 1 წლამდე	59676
დფტ-1	2 თ3. - 11 თ3. 29 დღ.	53991
დფტ-2	3 თ3. - 11 თ3. 29 დღ.	51748
დფტ-3	4 თ3. - 11 თ3. 29 დღ.	48385
დფტ-4	18 - 24 თ3ის	38585
პოლიო-1	2 თ3. - 11 თ3. 29 დღ.	55242
პოლიო-2	3 თ3. - 11 თ3. 29 დღ.	53410
პოლიო-3	4 თ3. - 11 თ3. 29 დღ.	51151
პოლიო-4	18 - 24 თ3ის	40407
პოლიო-5	5 წლის - 5 წლ. 11 თ3. 29 დღ.	36252
პირუსული კეპატიტი B-1 (დროული)	0 - 24 საათი	34248
პირუსული კეპატიტი B - 1 (სულ)	0 - 24 საათი + 25 სთ. - 11 თ3. 29 დღ.	45660
პირუსული კეპატიტი B - 2	2 თ3. - 11 თ3. 29 დღ.	32649
პირუსული კეპატიტი B - 3	3 თ3. - 11 თ3. 29 დღ.	29329
ფფყ - 1	12 - 24 თ3ის	43121
ფფყ - 2	5 წლის - 5 წლ. 11 თ3. 29 დღ.	32453
დტ	5 წლის - 5 წლ. 11 თ3. 29 დღ.	37367
ტდ	14 წლის	38573

ცხრილი 2.54 ჩატარებული აცრების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009			
	ბცმ - 1 (0 - 5 დღე)	ბცმ - 1 (0 - 1 წლამდე)	დცმ - 3
აჭარა	5810	5929	4970
თბილისი	25873	26008	16409
პანკისი	3019	3246	3882
იმერეთი	8390	8615	6716
სამეგრელო	3746	3800	3194
შიდა ქართლი	2994	3053	3060
ქვემო ქართლი	4568	4733	5113
გურია	1025	1079	1324
სამცხე-ჯავახეთი	2088	2222	2040
მცხეთა-მთიანეთი	475	510	918
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	90	95	185
სსკ	121	386	574
საქართველო	58199	59676	48385

ცხრილი 2.55 ჩატარებული აცრების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009			
	პოლიო - 3	მირუსული კეპატიტი B-1 (0 -24 საათი)	მირუსული კეპატიტი B-3 (0 - 1 წლამდე)
აჭარა	5222	4992	3107
თბილისი	18097	13909	11344
პანკისი	3963	1894	2111
იმერეთი	7111	4361	2672
სამეგრელო	3208	2936	2252
შიდა ქართლი	3322	1444	1467
ქვემო ქართლი	5091	2392	2762
გურია	1353	669	761
სამცხე-ჯავახეთი	2080	1186	1502
მცხეთა-მთიანეთი	939	271	737
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	181	79	148
სსკ	584	115	466
საქართველო	51151	34248	29329

ცხრილი 2.56 ჩატარებული აცრების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009			
	დტ	წწმ - 1	წწმ - 2
აჭარა	3283	4056	2537
თბილისი	12177	15460	11020
პანკისი	3197	2951	2483
იმერეთი	5295	6129	4851
სამეგრელო	2347	2879	2105
შიდა ქართლი	2302	2471	1780
ქვემო ქართლი	4527	4687	4072
გურია	999	1100	879
სამცხე-ჯავახეთი	1765	1767	1421
მცხეთა-მთიანეთი	764	879	786
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	205	212	215
სსკ	506	530	304
საქართველო	37367	43121	32453

ცხრილი 2.57 აფხაზეთის დე-ფაქტო ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემები ჩატარებული აცრების რაოდენობის შესახებ, 2009 (IV კვარტალი) *	
ვაქცინა	ჩატარებული აცრების რაოდენობა
ბცქ	858
დჟტ	1251
პოლიო	1696
ვირუსული კეპატიტი B	1720
დტ	327
ტდ	500

ცხრილი 2.58 ანტირაბიული კაბინეტების მუშაობა (ცოფის საწინააღმდეგო აცრები), საქართველო, 2008 - 2009		
	2008	2009
პაციენტთა რაოდენობა, რომელთაც მიმართეს ანტირაბიული ღანგარებისთვის	45412	41208
პაციენტთა რაოდენობა, რომელთაც მიიღეს დანიშნულება ვაქცინაციის გასაგებოლებლინით პროფილაქტიკაზე	44073	38670
აცრილთა რიცხვიდან მიიღეს:		
აცრების პირები კურსი	29259	22237
აცრების არაპირები კურსი	9736	11853
დამოუკიდებლად შეწყვიტეს აცრა	5078	4580

ცხრილი 2.59 რენტგენოლოგიური გამოკვლევები (პროფილაქტიკური ბასინჯების ჩათვლით), საქართველო, 2009				
	სულ	მათ შორის		
		გულმკერდის ორგანოები	საჭმლის მომნელობელი ორგანოები	კვალ-სახსართა სისტემა
რენტგენოლოგიური გამოკვლევები	553062	269386	81234	199952
მათ შორის				
გაუქმება	80133	63621	13306	2508
რენტგენოგრაფია	464766	196430	68500	197944
ელექტრორენტგენოგრაფია	3402	1911	0	1491
დიაგნოსტიკური ფლუოროგრაფია	16974	16504	143	327
სპეციალური გამოკვლევა	37081	286	1625	0
სპეციალურ გამოკვლევათა რიცხვიდან ჩატარებულია:				
ანგიოგრაფია			1784	
ძილვისტოგრაფია			1625	
ურთერაფია			3175	
კოპიუტერული ტომოგრაფია			21036	
ტომოგრაფია ჩვეულებრივი			4097	
გენიტალიების გამოკვლევა			60	
სალკინოგრაფია			680	
მაიოგრაფია			4560	

* 2009 წლის მე-IV კვარტლის მონაცემები

ცხრილი 2.60 დახმარება განყოფილებების მუშაობა, საქართველო, 2009	
	რაოდენობა
ფიზიოთერაპიული განყოფილებების (კაბინეტების) მუშაობა	
პაციენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	47983
<i>მათ შორის პოლიკლინიკაში და ბინაჟში</i>	29428
პაციენტთა საერთო რაოდენობიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	17781
<i>მათ შორის პოლიკლინიკაში და ბინაჟში</i>	8456
ჩატარებული პროცედურების რიცხვი	273302
<i>მათ შორის: პოლიკლინიკაში</i>	164409
<i>ბინაჟში</i>	1596
სამკურნალო ფიზკულტურის კაბინეტების მუშაობა	
პაციენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	17999
<i>მათ შორის პოლიკლინიკაში და ბინაჟში</i>	9098
პაციენტთა საერთო რაოდენობიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	7372
<i>მათ შორის პოლიკლინიკაში და ბინაჟში</i>	5241
ჩატარებული პროცედურების რიცხვი	138264
<i>მათ შორის: ამბულატორულ აპარტოვებში პოლიკლინიკაში</i>	82987
<i>ბინაჟში</i>	596
რეფლექსოთერაპიის კაბინეტების მუშაობა	
პაციენტთა რაოდენობა, რომლებმაც დაასრულეს მკურნალობა	767
ჩატარებული პროცედურების რიცხვი	4481
კვამოდიალიზის განყოფილებების მუშაობა	
ღიალიზის ალბილთა რაოდენობა	265
ჩატარებულ კვამოდიალიზთა რაოდენობა	107573
ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის განყოფილებების მუშაობა	
ჩატარებული სესიების რიცხვი	215
ლოგოპედური დახმარება	
პაციენტთა რაოდენობა, რომელთაც დაამთავრეს მცდელობა ლოგოპედთან	1027
<i>მათ შორის 15 წლამდე ასაკის ბავშვები</i>	955

ცხრილი 2.61 ულტრაბგერითი გამოკვლევები, საქართველო, 2008 - 2009		
	2008	2009
	რაოდენობა	რაოდენობა
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის	78061	77886
მუცლის ღრუს ორგანოების	195414	231289
ძალის სისხლძარღვთა ორგანოების	195581	221818
<i>მათ შორის: ორსულების ღრუს</i>	86149	101990
ახალშობილების და აღრეული ასაკის ბავშვების	9880	8572
ნარკვევ ჯირკვლების	10248	17280
ფარისებრი ჯირკვლის	34479	45222
ძვალ-სახსართა სისტემის	18099	22646
პერიფერიული სისხლძარღვების დოპლერული გამოკვლევა	9785	18302
თავის ტვინის ექსკოპია	11582	11091
ფუნქციური გიოფსია და ღრენილება ულტრაბგერითი სხივით	111	307
ინტრაოპერაციული ულტრაბგერითი გამოკვლევა	5445	4248

ცხრილი 2.62 ენდოსკოპიური განყოფილებების (კაბინეტების) მუშაობა, საქართველო, 2009				
	სულ	მათ შორის		
		ფოტოგრაფი-გასტრო-დუოდენო-სკოპიური	კოლონოსკოპიური	ბრონქოსკოპიური
ენდოსკოპიური გამოკვლევები	27084	17903	1947	4352
<i>მათ შორის</i>				
სამკურნალო პროცედურები	6060	3147	239	2636
გამოკვლევითი სამართი რიცხვიდან ციტომორფოლოგიური მასალის აღება	2236	921	273	1022

ცხრილი 2.63 ლაბორატორიების მუშაობა, საქართველო, 2009						
	ჩატარებული ანალიზების რიცხვი					
	სულ	მათ შორის				
		კვანძოვითი გიური	ციტოლოგიური	ბიოქიმიური	მიკრობიო-ლოგიური	იშვნილო-გიური
პაციენტთა სამართი რაოდენობა	5103927	1823324	148076	1397881	266707	649292
<i>მათ შორის</i>						
აგულატორიული პაციენტები	2804270	983978	90161	698118	134157	429995
ანალიზთა რიცხვიდან:						
ჰორმონებსა						86112
ფერმენტებსა						148028
შედეგებისა და შედეგების საფინანსოვლო სისტემის განვითარების						261150
მარილოვანი-ფულოვანი ცვლის						45881
მასალის გაქმნილობითი გამოკვლევები ტუბერკულოზის ბაქტერიოლოგიის						
ბაქტერიოსკოპია						98121
ლათენსა						36061
გამოკვლევები დიფტერიაზე						4771
ლათენსა						1106
გამოკვლევები მენინგოკოკუსზე: მიკროსკოპია						754
ლათენსა						746
გამოკვლევები მაღარიაზე მიკროსკოპია						450
სეროლოგიური რეაქციის კომპლექსი						183406
სპეციალური რეაქცია სიფილისის სერო- და ლიმფოტოპოგენური ტიპისათვის						71932

ცხრილი 2.64 ფუნქციური დიაგნოსტიკის კაბინეტის მუშაობა, საქართველო, 2008 - 2009		
	2008	2009
გამოკვლევითი პაციენტთა რაოდენობა	315686	347342
<i>მათ შორის კოლიკლინიკაში და ბინაზე</i>	164912	211413
<i>გამოკვლევითი სამართი რიცხვიდან 15 წლამდე ასაკის ბავშვები</i>	22130	16194
სულ გამოკვლევითი რაოდენობა	359921	391874




ცხრილი 2.65 სამედიცინო დაწესებულებებში განყოფილებების (კაბინეტების) რაოდენობა, საქართველო, 2008 - 2009		
	2008	2009
განყოფილებები (კაბინეტები)		
ფიზიოთერაპიული	187	178
სამკურნალო ფიზკულტურის (მეზრდილთა და ბავშვთა)	119	115
რეფლექსოთერაპიის	8	8
კმეოდიალიზის	9	11
ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის	3	2
სურდოლოგიური	7	5
რენტგენოლოგიური	297	301
მნოსკოპიური	72	77
ანტირაბიული	79	80
კომპიუტერული ტომოგრაფიის	16	20
აგრების ჩასატარებელი	271	178
პათოლოგანატომიური	21	18
ელექტროკარდიოგრაფიისა და ფუნქციური დიაგნოსტიკის	312	303
სინსლის გადამცემის	128	98
ლაბორატორიები		
რადიოიზოტოპური დიაგნოსტიკის	1	1
კლინიკურ-დიაგნოსტიკური	620	540
ბაქტერიოლოგიური	106	102
სეროლოგიური	126	125
ბიოქიმიური	381	363
ციტოლოგიური	74	83

თავი 3



დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა*

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტების 2002 წლის შეფასებით, საქართველოში ავადმყოფობის ტვირთის წილის 89% მოდის არაინფექციურ დაავადებებზე, 5% - ინფექციურ დაავადებებზე და 6% - ტრამეებზე. ავადმყოფობის ტვირთის 10 ძირითად მიზეზში მესამე ადგილზე პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილი მდგომარეობებია (ცხრილი 3.1). 2002 წელს ექსპერტების მიერ შეფასებული იქნა 0-14 წლის ასაკის ბავშვებში ავადმყოფობის ტვირთის 7 ძირითადი მიზეზი (DALYS 1000 მოსახლეზე). პირველ ადგილზე ახალშობილთა ავადმყოფობებია 32,4% (მცირე მასა დაბადებისას, ასფიქსია დაბადებისას და სამშობიარო ტრამეები). მეორე ადგილზე ზედა და ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები 7,1%, მესამეზე - თანდაყოლილი ანომალიები 1,7% (გულის ანომალიები, დაუნის სინდრომი და სპინა ბიფიდა) (ცხრილი 3.2).

საქართველოში დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქვეყნის ჯანმრთელობის დაცვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად აღიარებულ იქნა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვა. შემუშავებულ იქნა და შესრულდა მთელი რიგი სახელმწიფო პროგრამები. ამან ასახვა პოვა 1997-2008 წლებში დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლების კლებაში. დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირდა 70-დან 14,3-მდე, ხოლო ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 23,7-დან 14,3-მდე (ცხრილი 3.3, 3.4, სურათი 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5). აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის მიერ 2002 წელს მიღებულ „ათასწლეულის განვითარების მიზნებში“ განსაზღვრულია 2015 წლის სამიზნე მაჩვენებლები: ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება - 7,0-მდე და დედათა სიკვდილიანობის შემცირება - 12,3-მდე.



* დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემები



ახალშობილთა ჯანმრთელობა მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული დედათა ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, ხარისხიან დახმარებასთან ორსულობის პერიოდში, უსაფრთხო მშობიარობასა და დედებისა და ახალშობილებისთვის ძირითადი სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობასთან.

ქალთა კონსულტაციების მონაცემებით, 2009 წელს საქართველოში აღრიცხვაზე 83957 ორსული იმყოფებოდა. საანგარიშო წელს შემოსულ ორსულთა 53,3% აღრიცხვაზე აყვანილ იქნა 12 კვირის ორსულობის ვადამდე (52,1% - 2008 წელს). წლის განმავლობაში მეთვალყურეობიდან მოხსნილია 57536 ორსული, მათ შორის: 52174 ქალმა (90,7%) ორსულობა მიიტანა ბოლომდე, 1,6%-ში აღირიცხა თვითნებური აბორტი (ორსულობის 22 კვირამდე). დროულად იმშობიარა 50714 (97,2%) ქალმა (ცხრილი 3.5).

2009 წელს 4 სრულ ვიზიტზე კონსულტაციებს მიმართა ქალთა 78,5%-მა (71,8% - 2008 წელს). ვიზიტების დროს თერაპევტის მიერ გასინჯულია 49278 ორსული, მათ შორის 54,6% - 12 კვირის ორსულობის ვადამდე. რეზუს-ფაქტორზე, სიფილისზე და აივ-ინფექციაზე გამოკვლეულ იქნა, შესაბამისად, 54122, 49908 და 48123

ორსული. 7164 ქალი გაგზავნილ იქნა C-პეპატიტზე გამოსაკვლევადაც (ცხრილი 3.6).

2007 წლის ივნისიდან საქართველოში როსტროპოვინ-ვიშნევსკაიას ფონდის მხარდაჭერით შესაძლებელი გახდა ორსულ ქალთა სისხლის შრატის ლაბორატორიული კვლევა HBS ანტიგენის გამოსავლენად. 2007 წლის ივნისიდან 31 დეკემბრამდე HBS ანტიგენზე გამოკვლეულია 26015, 2008 წელს - 40129 ორსული, 2009 წელს - 47123 ორსული. ამის გარდა, დაიწყო ანტიგენდადებითი დედებისგან დაბადებული, B-ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირების მაღალი რისკის მქონე ბავშვების B-ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინით პასიური იმუნიზაცია. 2007 წლის ივნისიდან 31 დეკემბრამდე აიცრა 557, ხოლო 2008 წელს - 1316 ბავშვი.


2009 წელს გამოკვლეულ 47123 ორსულიდან HBS იმუნოფერმენტული ტესტ-სისტემებით გამოკვლევის შედეგად ანტიგენდადებითი აღმოჩნდა 1532 ქალი, რომელთაგან 2009 წელს დაბადებულ 1497 ბავშვს ჩაუტარდა B-ჰეპატიტის საწინააღმდეგო იმუნოგლობულინით პასიური იმუნიზაცია.

დაავადებების სტრუქტურაში, რომლებიც უსწრებენ ან ვითარდებიან ორსულობის პერიოდში, ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლოგინობის ხანას, მაღალია ანემიების (35,7%), შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების (15,6%) და ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების (13,7%) წილი. საანგარიშო პერიოდში ორსულობის პათოლოგიის გამო ჰოსპიტალიზებულია 2668 ქალი.

2009 წელს სამედიცინო დაწესებულებებმა აღრიცხეს 61656 მშობიარობა, აქედან სამშობიარო სახლებში/განყოფილებებში იმშობიარა 61441 (99,7%) ქალმა. ბინაზე მშობიარეთა წილი კვლავ შემცირდა და 0,3% (215 შემთხვევა) შეადგინა (ცხრილი 3.3). სამშობიარო სახლებში/განყოფილებებში მიღებული მშობიარობებიდან 64,4% ფიზიოლოგიური, ხოლო 35,6% - პათოლოგიურია.

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების დიდ ნაწილში აღირიცხა საკეისო კვეთების რაოდენობის მატება - მათ სულ მშობიარობათა რაოდენობის 30-35% შეადგინეს. განსაკუთრებით მოიმატა საკეისო კვეთების პროცენტმა კერძო სამშობიარო სახლებში (ზოგიერთ შემთხვევაში 40-80%-მდე). ამასთან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად, საკეისო კვეთების "იდეალურ მაჩვენებლად" 15% ითვლება.

2009 წელს საქართველოში ჩატარებულია 17722 საკეისრო კვეთა, რაც მშობიარობათა რაოდენობის 28,7%-ს შეადგენს (შედარებისთვის: 2007 წელს – 22,2%, 2008 წელს – 24,7%). პირველადი საკეისრო კვეთა შეადგენდა საერთო რაოდენობის 67,9%-ს, მათ შორის 57,9% იყო სასწრაფო (ცხრილი 3.7, 3.8). **სამეანო მამები** გამოყენებულ იქნა 81, ხოლო **ვაკუუმექსტრაქცია** 149 შემთხვევაში. ტრავმებით გართულებული მშობიარობების წილი მშობიარობების საერთო რაოდენობაში 4,7%-ს შეადგენს (სურათი 3.6).



მშობიარობისა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის გართულებების სტრუქტურაში მაღალია ანემიის (23,1% - 3176 შემთხვევა), მშობიარობის დროს შორისის დაზიანების (21,2% - 2914 შემთხვევა), ნაყოფის არასწორი ან წინამდებარეობით გართულებული მშობიარობა (12,7% - 1748 შემთხვევა), სამშობიარო მოქმედების დარღვევების (12,6% - 1742 შემთხვევა) და პრეკლამსიის და ეკლამსიის (12,4% - 1714 შემთხვევა) წილი. მშობიარობის და მშობიარობის შემდგომი პერიოდის ინფექციების წილი შეადგენდა 0,3% (45 შემთხვევა).

2009 წლამდე საქართველოში აღინიშნებოდა **დედათა სიკვდილიანობის** მაჩვენებლის შემცირების ტენდენცია და დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელმა 100000 ცოცხალშობილზე 1990-2008 წლების მინიმალურ მნიშვნელობას 2008 წელს მიაღწია – 14,3. 2009 წელს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში საქართველოს სტაციონარებმა წარმოადგინეს ანგარიში დედის გარდაცვალების 27 შემთხვევაზე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის შესაბამისი სამსახურების და საქსტატის დემოგრაფიის სამმართველოს მონაცემების შედარების შედეგად, გამოვლინდა, რომ გარდაცვლილ ქალთა ნაწილს, გარდაცვალების სამედიცინო ცნობაში არ ჰქონდათ მითითებული

ორსულობა/მშობიარობა. ორივე უწყების შეჯერებული მონაცემებით გამოვლინდა 33 გარდაცვლილი დედა, მ.შ. ერთი, რომელიც საავადმყოფოს უწყებრივ ანგარიშში არის აღრიცხული (მაგრამ საქსტატში წარმოდგენილი არ არის გარდაცვალების სამედიცინო ცნობა). შედეგად დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გაიზარდა და იგი 100000 ცოცხალშობილზე (საქსტატის მონაცემებით, 63377 ცოცხალშობილი) 52,1 გახდა (სურათი 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 2005 წლის შეფასებითი მონაცემებით, საქართველოში დედის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 66,0 ტოლია (განუსაზღვრელობის ინტერვალი 18-230 წარმოადგენს).

საქსტატთან ერთად გადახედილ იქნა დედის სიკვდილის მიზეზები და მათი კოდირების სიზუსტე. 2009 წელს დედათა გარდაცვალების 33 შემთხვევიდან 5 - გამოწვეული იქნა გრიპით, 2 - მელოგინეთა სეფსისით, 3 - სამეანო ემბოლიით, 9 - სიკვდილის დაუზუსტებელი მიზეზით (ცხრილი 3.9).

საქსტატთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად 2009 წელს გამოვლენილია დედათა გვიანი (1 წლის განმავლობაში) გარდაცვალების 2 შემთხვევა.

2008 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული ჯონ სნოუს კვლევისა და სწავლების ინსტიტუტის (JSI) ქალთა ჯანმრთელობის პროგრამამ საქართველოში, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა და ამერიკის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრებმა შეასრულეს ორწლიანი ერთობლივი პროექტი საქართველოში რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის შესასწავლად*. თავდაპირველად კვლევა მიმართული იყო 2006 წელს საქართველოში გარდაცვლილ დედათა სიკვდილიანობის მასშტაბისა და მიზეზების შესწავლაზე. თუმცა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მოთხოვნით კვლევა გაფართოვდა და მის ფარგლებში განხორციელდა 2006 წელს გარდაცვლილ საქართველოში მუდმივად მცხოვრები 15-49 ასაკის ქალთა სიკვდილის ყველა შემთხვევის მიზეზის შესწავლა.

* რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის კვლევა (RAMOS)

რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის კვლევისა და საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის 2006 წლის რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის სტრუქტურის შედარებამ აჩვენა, რომ ოფიციალურ სტატისტიკაში ახალწარმონაქმნებით (32,7%) და გარეგანი მიზეზებით გამოწვეული (74,7%) სიკვდილიანობის აღრიცხვა არასრულია, ხოლო გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებათა (65,8%) და არასწორად განსაზღვრული სიმპტომებით (37,9%) გამოწვეული სიკვდილიანობის აღრიცხვიანობა გაზვიადებულია (100% მიღებულია საქსტატის მონაცემები).

2009 წელს საქართველოში ჩატარდა 9722 ოპერაცია ქალის სასქესო ორგანოებზე (ლეტალობა 0,08%), მ.შ. 1235 საშვილოსნოს ამპუტაცია. სამედიცინო-გინეკოლოგიური 35535 ოპერაციიდან, საშვილოსნოსგარე ორსულობის გამო გაკეთდა 1219 ოპერაცია (ლეტალობა 0,1%) (ცხრილი 3.20).

საანგარიშო წელს აღირიცხა 24311 აბორტი, მათ შორის 1,8% (436 შემთხვევა) პირველი ორსულობის დროს. აბორტების საერთო ორსულობიდან 21 გაკეთდა 15 წლამდე, ხოლო 1689 - 15-19 წლის ასაკის ქალებში (ცხრილი 3.10, 3.11).


მოზარდთა ორსულობა და ადრეული დედობა და მამობა განაპირობებს მოზარდთა ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის არადაშვებულ მდგომარეობას, განათლების დაბალ დონეს და დედის და ბავშვის სოციალურ იზოლაციას და სიღარიბეს. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებელი 1000 გოგონაზე 15-დან 25 შემთხვევამდეა. აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ზოგიერთ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 2-4-ჯერ მეტია. საქართველოში მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებელი 1000 15-19 წლის ქალზე 62-ის ტოლია (სურათი 3.7).

2009 წელს, სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებით, კორმონალურ კონტრაცეპტივებს იყენებდა 10324, ხოლო საშვილოსნოსშიდა საშუალებებს - 6408 ქალი, მათ შორის 2215 ქალს საშვილოსნოსშიდა საშუალება ჩაეღება საანგარიშო წელს (ცხრილი 3.10).

ქალთა კონსულტაციებს და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კაბინეტებს (ანტენატალური დახმარების გარდა) 35222 ქალმა და 1681 მამაკაცმა მიმართა (ცხრილი 3.12). **მიმართულების სტრუქტურა** შემდეგნაირია: 31,7% (11683 შემთხვევა) - კონტრაცეპციის მეთოდის


შერჩევა; 13,8% (5103 შემთხვევა) - კონტრაცეპციის უკვე გამოყენებული მეთოდის შემოწმება; 8,5% (3146 შემთხვევა) - უშვილობა, 7,5% (2765 შემთხვევა) - კლიმაქსი. **სქესობრივი გზით გადადებ დაავადებებზე** გამოკვლეულია 26634 ადამიანი (26321 ქალი და 313 მამაკაცი). აღრიცხულია სიფილისის 17, გონორეის 48, ქლამიდიოზის 437, ტრიქომონიოზის 3268, ბაქტერიული ვაგინოზის 2864 და პაპილოვირუსული ინფექციის 756 შემთხვევა.

სურათი 3.7 მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებლები (15-19 წლის 1000 ქალზე), საქართველო, 2000 - 2009



2009 წელს ცოცხალი დაიბადა 61677 ბავშვი (ცხრილი 3.3, 3.4). სტაციონარში დაბადებული 61468 ცოცხალშობილიდან 93,9% დაიბადა 2499 გრამზე მეტი წონით (ცხრილი 3.14, სურათი 3.8).

სურათი 3.8 დაბადებისას დაბალი წონის ცოცხალშობილთა პროცენტული წილი ცოცხალშობილთა საერთო რაოდენობაში, რეპროდუქციის პიკში, საქართველო, 2009




სტაციონარებში დაბადებული ცოცხალშობილებიდან 8,7% (5328 ბავშვი) დაიბადა ავადმყოფი ან გახდა ავად. დაავადებათა 91,4% (4867 შემთხვევა) პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილ მდგომარეობებზე და 7,3% (391 შემთხვევა) თანდაყოლილ ანომალიებზე მოდის (ცხრილი 3.15). დაავადებულთა შორის 104 ახალშობილის წონა 500-999 გრამი იყო, 1443 ახალშობილის - 1000-2499 გრამი, 3781-ის წონა კი - 2500 გრამი და მეტი. სამშობიარო სახლებში დაბადებულ ცოცხალშობილთა 4,1% გადაყვანილი იქნა ბავშვთა კლინიკების

დღენაკლულთა და ახალშობილთა განყოფილებებში.

ბუნებრივ კვებაზე დაბადებიდან ერთი საათის განმავლობაში მიეცანილ იქნა ცოცხალშობილთა 67,4%, ხოლო 3 თვის ასაკამდე ბუნებრივ კვებაზე იმყოფებოდა ახალშობილთა 36,7% (ცხრილი 3.16).


2009 წელს საქართველოში გარდაიცვალა 0-6 დღემდე ასაკის 558 ახალშობილი (ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი – 9,0) (ცხრილი 3.4), აქედან სამშობიარო სახლებში გარდაიცვალა 170 (30,5%) ახალშობილი, ბავშვთა კლინიკებში – 388 (69,5%).

საანგარიშო წელს აღირიცხა 665 მკვდრადშობილი, რაც 7,2%-ით ნაკლებია 2008 წელთან შედარებით. მათ შორის 517 ნაყოფი (77,7%) დაბალი წონის (2500 გრამზე ნაკლები) იყო (ცხრილი 3.14, სურათი 3.9).



90-იან წლებში საქართველოში მკვდრადშობილთა შეფარდება ადრეულ ნეონატალურ პერიოდში გარდაცვლილ ბავშვებთან 2:1 შეადგენდა. 1994 წელს საქართველომ ოფიციალურად მიიღო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ცოცხლადშობილის განსაზღვრება, რამაც გამოიწვია ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებლის ზრდა და შეფარდების 1:1 მიახლოება. თუმცა შემდგომ წლებში ეს შეფარდება ისევ გაიზარდა, რაც შესაძლოა დაკავშირებულია ჯანმრთელობის განსაზღვრების არასწორ გამოყენებასთან ან მის არცოდნასთან (სურათი 3.10).

2009 წელს, სამედიცინო დაწესებულებების მიერ, საქართველოში აღირიცხა 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვთა გარდაცვალების 1044 შემთხვევა. აქედან: 0-1 წლამდე ასაკის – 872 (ჩვიდ ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი – 14,1); 0-5 წლამდე ასაკის – 949 ბავშვი (სიკვდილიანობის მაჩვენებელი – 15,4). 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა 94,7% გარდაიცვალა სტაციონარებში (ცხრილი 3.17, სურათი 3.5).



ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების მონაცემებით, 2009 წელს საქართველოში 0-15 წლის ბავშვებში რეგისტრირებული იყო 475824 დაავადების შემთხვევა (პრევალენტობა – 63198.8), მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით – 394061 (ინციდენტობა – 52339.1). ინციდენტობა მაღალია დაავადებათა შემდეგ კლასებში: სუნთქვის ორგანოთა დაავადებები (246604 შემთხვევა, ინციდენტობა – 32753.9), ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები (34583 შემთხვევა, ინციდენტობა – 4593.3), საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები (19030 შემთხვევა, ინციდენტობა – 2527.6).

ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვებში აღირიცხულია დაავადებების 205850 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა – 81686.5). 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში აღირიცხულ იქნა დაავადებების 62296 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა – 105586.4). ორივე ასაკობრივ ჯგუფში მაღალი ინციდენტობით ხასიათდება სასუნთქი სისტემის დაავადებები (ცხრილი 3.18, 3.19).

საანგარიშო წელს სტაციონარიდან გაეიდა 65490 ბავშვი (პოსპიტალიზაციის დონე 1000 ბავშვზე – 870), მათ შორის ერთ წლამდე ასაკის – 23469 (პოსპიტალიზაციის დონე 1000 ბავშვზე – 3978). ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში პოსპიტალიზაციის დონე მაღალია სასუნთქი სისტემის დაავადებების (183,5 – 10824 შემთხვევა), პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილი ცალკეული მდგომარეობების (110,4 – 6511 შემთხვევა) და ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების (55,2 – 3258 შემთხვევა) კლასებში (ცხრილი 2.36).

ცხრილი 3.1 ავადმყოფობის ტვირთი საქართველოში, დსთ-8 და ეკ-ში, 2002				
	ავადმყოფობის ტვირთის წილი (%)			
	საქართველო	დსთ-8	ეკ-27	ეკ-15
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	28	22	14	12
ფსიქონევროლოგიური ავადმყოფობები	22	16	30	32
არაფინანსური განზრახული ტრავმები	5	8	8	7
ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	5	7	2	2
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ზოგიერთი მდგომარეობა	8	5	--	--
საჭმლის მომნელობელი სისტემის დაავადებები	3	6	5	4
რესპირაციული ინფექციები	3	6	--	--
კვალ-კუნთოვანი სისტემის და უმცირესობის ქსოვილის დაავადებები	5	--	4	--
ავთვისებიანი ახალწარმოქმნილი	3	6	13	13
გრძნობათა ორგანოების დაავადებები	4	4	4	4
არაგადამდები დაავადებები სულ	89	82	87	84
ინფექციური დაავადებები სულ	5	7	2	2
ტრავმები სულ	6	11	11	10

ცხრილი 3.2 ავადმყოფობის ტვირთი 0-14 წლამდე ასაკის ბავშვებში საქართველოში და ევროპის რეგიონში (DALYS 1000 მოსახლეზე), 2002		
	საქართველო	ევროპის რეგიონი
ახალშობილთა დაავადებები = მცირე მასა დაავადებისას, ასფიქსია დაავადებისას, სეპსისიარო ტრავმა	32,4	11,8
წმელა და ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები	7,1	7,4
მძიმე თანდაყოლილი ანომალიები = გულის თანდაყოლილი მანკები, დაუნის სინდრომი, ჰერეტის არხის არასრული დახურვა (SPINA BIFIDA)	1,7	6,3
ნეიროფსიქიური ავადმყოფობები = უნიკლარული დეპრესიული ავადმყოფობები, შიზოფრენია, შიზოფრენია, შიზოფრენია	6,0	6,0
იოდის დეფიციტი	4,3	3,8
არაფინანსური განზრახული ტრავმები = გარდნა, სატრანსპორტო უბედური შემთხვევები, ჩაძირვა წყალში და დახრწობა	1,4	3,3
ასთმა	2,3	1,9

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2009

ცხრილი 3.3 შობადობა, გაფშვთა და ღმდათა სიკვდილიანობა (სამედიცინო დაფესხეულეხეხის მონაცემეხი), საქართველო, 2004 – 2009						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
მშობიარეობა სულ	46734	47246	48181	49626	56096	61656
მათ შორის სამშობიარო სახლში	45554	46537	47593	49317	55850	61441
ბინაზე	1180	709	588	309	246	215
ცოცხალშობილეხის რაოდენობა სულ	46373	47022	47856	49476	56025	61677
მათ შორის ბინაზე ღაბადმეულეხი შემდგომი კონსიტალეზაციის გარეშე	1028	688	536	308	235	209
მკვდრადშობილეხის რაოდენობა	722	766	817	738	717	665
გარდაიცვალა 0 - 1 წლაამდე*	834	851	882	699	802	872
გარდაიცვალა 0 - 6 ღლემდე	561	585	604	467	516	558
გარდაიცვალა 7 - 28 ღლემდე	147	123	146	118	147	214
გარდაიცვალა 29 - 365 ღლემდე	126	143	132	114	139	100
გარდაიცვალა 0-5 წლაამდე*	929	911	945	945	898	949
გარდაიცვალა ორსული, მშობიარე და მშობიარე სულ	21	11	11	10	8	33**
მკვდრადშობადობა 1000 ღაბადმეულეზე	15,3	16,0	16,8	14,7	12,6	10,7
ადრეული ნონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილეზე	12,1	12,4	12,6	9,4	9,2	9,0
გვიანი ნონატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილეზე	3,2	2,6	3,1	2,4	2,6	3,5
პერინატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ღაბადმეულეზე	27,2	28,3	29,2	24,0	21,7	19,7
0 - 1 წლაამდე ასაკის გაფშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილეზე*	18,0	18,1	18,4	14,1	14,3	14,1
0 - 5 წლაამდე ასაკის გაფშვთა სიკვდილიანობა 1000 ცოცხალშობილეზე*	20,0	19,4	19,7	15,7	16,0	15,4
ღმდათა სიკვდილიანობა 100000 ცოცხალშობილეზე	45,3	23,4	23,0	20,2	14,3	52,1***

ცხრილი 3.4 შობადობა და გაფშვთა სიკვდილიანობა რეგიონეხის მიხედვით (სამედიცინო დაფესხეულეხეხის მონაცემეხი), საქართველო, 2009								
	ცოცხალ-შობილთა რაოდენობა	მკვდრად-შობილთა რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 ღაბადმეულეზე	0 - 1 წლაამდე გარდაცვლილთა რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალ-შობილეზე	0 - 6 ღლემდე გარდაცვლილთა რაოდენობა	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალ-შობილეზე	პერინატალური სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1000 ღაბადმეულეზე
ატარა	6162	57	9,2	73	11,8	40	6,5	15,6
თბილისი	26266	357	13,4	513	19,5	311	11,8	25,1
კახეთი	3465	17	4,9	30	8,7	19	5,5	10,3
იმერეთი	9148	112	12,1	174	19,0	134	14,6	26,6
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	4468	29	6,4	16	3,6	9	2,0	8,5
შიდა ქართლი	3204	32	9,9	28	8,7	23	7,2	17,0
მედი ქართლი	4893	35	7,1	16	3,3	11	2,2	9,3
გურია	1141	7	6,1	2	1,8	2	1,8	7,8
სამცხე - ჯავახეთი	2318	18	7,7	17	7,3	7	3,0	10,7
მცხეთა - მთიანეთი	522	1	1,9	3	5,7	2	3,8	5,7
რატა - ღმესში და მემო სვანეთი	90	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0,0
საქართველო	61677	665	10,7	872	14,1	558	9,0	19,6

* 0-1 და 0-5 წლაამდე ასაკში გარდაცვლილ გაფშვთა რაოდენობა წარმოადგენს სტაციონარეხში და ბინაზე გარდაცვლილ გაფშვთა რაოდენობის ჯამს

** საქსტატის და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის შეჯერებული მონაცემეხი

*** ღმდათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი დათვლილია საქსტატის მიერ აღრიცხულ ცოცხალშობილთა რაოდენობაზე - 63377

ცხრილი 3.5 ქალთა კონსულტაციების ზოგიერთი მონაცემები ორსულთა კონტინენტის მეთვალყურეობის შესახებ, საქართველო, 2009					
	მეთვალყურეობიდან პრესნა სულ	ორსულთა მიიტანეს გოლოფე		ორსულთა რაოდენობა, რომლებმაც გაიარეს 4 ანტენატალური ვიზიტი	
		რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
ატარა	6434	5879	91,4	5080	79,0
თბილისი	21136	18809	89,0	14986	70,9
კახეთი	4007	3674	91,7	2780	69,4
იმერეთი	8839	8150	92,2	6557	74,2
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	4075	3688	90,5	3234	79,4
შიდა ქართლი	3556	3021	85,0	2878	80,9
ქვემო ქართლი	5229	5092	97,4	2441	46,7
გურია	1175	1136	96,7	792	67,4
სამცხე - ჯავახეთი	2356	2088	88,6	1747	74,2
მცხეთა - მთიანეთი	575	523	91,0	415	72,2
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	154	114	74,0	63	40,9
საქართველო	57536	52174	90,7	40973	71,2

ცხრილი 3.6 ქალთა კონსულტაციების ზოგიერთი მონაცემები ორსულთა კონტინენტის მეთვალყურეობის შესახებ, საქართველო, 2009						
	ორსულთა რაოდენობა, რომლებიც გამოიკვეთიეს სიზილისზე		ორსულთა რაოდენობა, რომლებიც გამოიკვეთიეს აივ ინფექციისზე		ორსულთა რაოდენობა, რომლებიც გამოიკვეთიეს კეპატიტ B-ზე	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
ატარა	5454	84,8	5844	90,8	5761	89,5
თბილისი	19008	89,9	17840	84,4	17353	82,1
კახეთი	3138	78,3	2900	72,4	2829	70,6
იმერეთი	8935	101,1	8748	99,0	8747	99,0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	3656	89,7	3742	91,8	3729	91,5
შიდა ქართლი	2550	71,7	1162	32,7	1159	32,6
ქვემო ქართლი	4094	78,3	4502	86,1	4394	84,0
გურია	896	76,3	981	83,5	875	74,5
სამცხე - ჯავახეთი	1606	68,2	1831	77,7	1710	72,6
მცხეთა - მთიანეთი	479	83,3	464	80,7	464	80,7
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	92	59,7	109	70,8	102	66,2
საქართველო	49908	86,7	48123	83,6	47123	81,9

ცხრილი 3.7 საკმისრო კვეთების რაოდენობა და სტრუქტურა, საქართველო, 2008 - 2009						
	2008			2009		
	სულ	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	% საერთო რაოდენობიდან	სულ	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	% საერთო რაოდენობიდან
სულ	13870	246,2	100	17722	287,3	100
გათ შორის						
გვამიერი	6934	--	50,0	8498	--	48,0
სასწრაფო	6936	--	50,0	9224	--	52,0

ცხრილი 3.8 საკმისრო კვითების რაოდენობა და მაჩვენებელი, საქართველო, 2009				
	მშობიარობათა რაოდენობა	საკმისრო კვითათა რაოდენობა	საკმისრო კვითათა % მშობიარობებიდან	მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე
ატარა	6140	2031	33,1	329,6
თბილისი	26295	7400	28,1	281,7
პანეთი	3455	921	26,7	265,8
იმერეთი	9155	3229	35,3	353,0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	4453	1760	39,5	393,9
შიდა ქართლი	3200	671	21,0	209,4
ქვემო ქართლი	4895	1140	23,3	233,0
გურია	1138	247	21,7	216,5
სამცხე - ჯავახეთი	2321	201	8,7	86,7
მცხეთა - მთიანეთი	515	108	21,0	206,9
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	89	14	15,7	155,6
საქართველო	61656	17722	28,7	287,3

ცხრილი 3.9 დედათა სიკვდილის მიზეზები, საქართველო, 2009		
სიკვდილის მიზეზები	კოდები დსკ-X გადასინჯვის მიხედვით	რაოდენობა
გარდაიცვალა ორსულობის, მშობიარობის და ლობინობის ხანის ბართულებებით სულ		33
მათ შორის		
ორსულობა, რომლის გამოსავალია აბორტი	O00.X -O07.X	2
მკლავისა დაუზუსტებელ პერიოდში	O15.9	4
პლავენტას ნაადრევი აცლა სისხლის შედეგების უნარის დარღვევით	O45.0	2
მელორბინეთა სეფსისი	O85	2
სამეანო მებოლია	O88	3
სამეანო სიკვდილი დაუზუსტებელი მიზეზით	095	9
თავის ტვინის ნეიროცისტინგრაფი	098.8	1
გულსისხლკარავთა სისტემის ავადმყოფობები, რომლებიც ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლობინობის ხანას	099.4	3
მ.შ. ფილტვის არტერიის მებოლია	099.4 (I26.9)	1
გულის უკვარისობა, დაუზუსტებელი	099.4 (I50.9)	2
სასუნთქი სისტემის ავადმყოფობები, რომლებიც ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლობინობის ხანას	099.5	5
მ.შ. გრძივი, გამოწმული გრძივის ილმტინფინგრაფული ვირუსით	099.5 (J10.0)	5
სხვა დაუზუსტებული ავადმყოფობები, რომლებიც ართულებენ ორსულობას, მშობიარობას და ლობინობის ხანას	099.8	2

ცხრილი 3.10 აბორტები და კონტრაცეპტივების გამოყენება, საქართველო, 1991 – 2009						
	ცოცხალშობილთა რაოდენობა	აბორტები		აბორტების მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	საშვილოსნოსშიდა საშუალებების გამოყენება	პროგრესული კონტრაცეპტივების გამოყენება
		სულ	მათ შორის მიწის აბორტი			
1991	89091	59384	9772	717,7	15790	7732
1992	72631	50748	10256	730,8	9588	5419
1993	61594	45131	8391	789,4	8379	3468
1994	57311	45858	10295	857,9	9127	3983
1995	56341	39538	7522	715,2	9538	5181
1996	53300	30003	5867	554,1	10817	3699
1997	52851	23403	5541	447,6	8171	4869
1998	49588	21018	6806	423,8	9148	6276
1999	46827	18306	6549	390,9	11539	9142
2000	46765	14951	5414	319,7	9120	7865
2001	46006	15008	5330	326,2	9032	8755
2002	45033	13908	5143	308,8	8252	8143
2003	44093	13834	5183	313,7	9084	9340
2004	46373	17210	6552	371,1	9047	10996
2005	47022	19734	6710	419,7	9643	10783
2006	47856	21204	7478	443,1	7581	10742
2007	49476	20644	7583	417,3	7548	9541
2008	56025	22062	7662	393,8	6554	12171
2009	61677	24311	8361	394,2	6408	10324

ცხრილი 3.11 აბორტები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2009							
	სულ	მათ შორის ასაკობრივი ჯგუფები					
		15 წლამდე ასაკის	15-19 წელი	20-29 წელი	30-39 წელი	40-44 წელი	45 წელი და ზემოთ
აბორტების რაოდენობა	24310	21	1689	11638	9242	1538	182
მაჩვენებელი*	2075,1	16.2	987.7	3350.0	2920.1	982.7	101.1
მათ შორის							
თვითნებური	3557	4	354	1789	1187	187	36
ხელისუფლებით	20753	17	1335	9849	8055	1351	146
12 კვირამდე	20661	17	1330	9825	7997	1346	146
მიწის-აბორტი (5 კვირამდე)	8361	6	485	3687	3486	619	78
12-22 კვირამდე	86	0	5	23	54	4	0
სამართლიანად აბორტები პირველი ორსულობის დროს	436	0	106	257	66	6	1

* მაჩვენებელი გამოთვლილია შესაბამისი ასაკის 100000 ქალზე

ცხრილი 3.12 ზოგიერთი მონაცემები რეპროდუცირებული ჯანმრთელობის შესახებ*, საქართველო, 2009

	ბასინჯულია			მიმართვათა სამართო რაოდენობიდან				
	სულ	ქალი	მამაკაცი	უშვილოების გამო			კლიმაქსის გამო, ქალი	აბორტის გამო
				სულ	ქალი	მამაკაცი		
აჭარა	3146	3018	128	213	203	10	333	183
თბილისი	11078	10692	386	1524	1300	224	603	170
კახეთი	2863	2524	339	60	60	0	95	68
იმერეთი	9041	8497	544	648	619	29	865	878
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	5134	4982	152	150	150	0	247	7
შიდა ქართლი	1287	1279	8	104	104	0	123	17
ქვემო ქართლი	1822	1757	65	96	96	0	199	108
გურია	848	828	20	104	104	0	139	100
სამცხე - ჯავახეთი	508	469	39	192	192	0	25	59
მცხეთა - მთიანეთი	207	207	0	45	45	0	61	7
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	969	969	0	10	10	0	75	13
საქართველო	36903	35222	1681	3146	2883	263	2765	1610

ცხრილი 3.13 ზოგიერთი მონაცემები რეპროდუცირებული ჯანმრთელობის შესახებ*, საქართველო, 2009

	მიმართვათა სამართო რაოდენობიდან კონტრაცეპციის მეთოდის შესარჩევად		
	სულ	მამაკაცი	ქალი
აჭარა	1034	94	940
თბილისი	1703	64	1639
კახეთი	1066	137	929
იმერეთი	3938	350	3588
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	2478	152	2326
შიდა ქართლი	237	8	229
ქვემო ქართლი	662	65	597
გურია	261	20	241
სამცხე - ჯავახეთი	154	39	115
მცხეთა - მთიანეთი	25	0	25
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	125	0	125
საქართველო	11683	929	10754

ცხრილი 3.14 ცოცხალშობილთა და გეგმადშობილთა წონა გრამებში დაბადებისას (სამშობიარო სხელების მონაცემები), საქართველო, 2009

	სულ	500 - 999	1000 -1499	1500-2499	2500-3999	4000 +
დაიბადა ცოცხალი	61468	121	331	3300	52257	5459
% ცოცხალშობილთა სამართო რაოდენობიდან	100,0	0,2	0,5	5,4	85,0	8,9
დაიბადა გეგმად	665	265	120	132	128	20
% გეგმადშობილთა სამართო რაოდენობიდან	100,0	39,8	18,0	19,8	19,2	3,0

* პოლიკლინიკებში, ამბულატორიებში, ქალთა კონსულტაციებში, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კაბინეტებში მიმართულები, რომლებმაც დაკავშირებულია რეპროდუქციული ჯანმრთელობასთან, ანტენატალური დანხარების გარდა

ცხრილი 3.15 დაავადებების ინციდენტობა ახალშობილებში (სამშობიარო სახლების მონაცემები), საქართველო, 2009		
	ავადმყოფი ცოცხალშობილთა რაოდენობა	ინციდენტობა 1000 ცოცხალშობილზე
სულ	5328	86,7
მათ შორის		
პერინატალურ პერიოდში წარმოქმნილი ცალკეული მდგომარეობა	4867	79,2
მათ შორის: ზრდის შეფერხება და არასაკმარისი კვება	868	14,1
სამშობიარო ტრავმა	413	6,7
მათ შორის: ძალასშიდა სამშობიარო ტრავმა	123	2,0
პერინატალური პერიოდისთვის დამახასიათებელი რესპირატორული დარღვევები	2234	36,3
მათ შორის: საშვილოსნოსშიდა ჰიპოქსია, ასფიქსია მშობიარობისას	1233	20,1
ახალშობილთა რესპირატორული დისტრეს-სინდრომი	828	13,5
ახალშობილთა თანდაყოლილი პნევმონიები	15	0,2
პერინატალური პერიოდისთვის დამახასიათებელი ინფექციები	353	5,7
მათ შორის: ახალშობილთა სეპსისი	89	1,4
ნაყოფის და ახალშობილის კუმრავილი დარღვევები	112	1,8
მათ შორის: ნაყოფის მიერ სისხლის დაკარგვა	1	0,0
ნაყოფის და ახალშობილის ძალასშიდა არატრავმული სისხლჩაქცევა	92	1,5
ნაყოფის და ახალშობილის ქმეატოლოგიური დარღვევები	407	6,6
მათ შორის: იჰოიფუნიათი გაყოფილი კემოლიზური დაავადება	361	5,9
ნაყოფის და ახალშობილის დისემინირებული სისხლმარღვშიდა კოაგულაცია	8	0,1
ახალშობილთა ცერებრული მდგომარეობის სხვა დარღვევები	359	5,8
პერინატალური პერიოდის ახალშობილთა სხვა დაავადებები	121	2,0
თანდაყოლილი ანომალიები	391	6,4
ახალშობილთა სხვა დაავადებები	70	1,1

ცხრილი 3.16 ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ახალშობილთა რაოდენობა, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	სულ	% ცოცხალშობილთა რაოდენობიდან	სულ	% ცოცხალშობილთა რაოდენობიდან
სამშობიარო სახლების მონაცემები				
პირველი საათის განმავლობაში	36143	64,8	41411	67,4
1-8 საათის განმავლობაში	12050	21,6	12334	20,1
8-24 საათის განმავლობაში	4355	7,8	4081	6,6
ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ახალშობილთა საერთო რაოდენობა	54434	97,6	59960	97,5
გაფშვთა კოლიკლინიკების მონაცემები				
3 თვის ასაკამდე ბუნებრივ კვებაზე მყოფ ახალშობილთა რაოდენობა	28693	51,4	22535	36,7

ცხრილი 3.17 სამედიცინო დაწესებულებებში აღრიცხულ გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა, საქართველო, 2009												
	15 წლამდე ბავშვები				მათ შორის							
	სულ	საკვდელიანობის მაჩვენებელი 100000 ბავშვზე	რამდენი პროცენტია სტაციონარში (%)	რამდენი პროცენტია კონსტრუქციულად (%)	1 წლამდე ბავშვები				0-5 წლამდე ბავშვები			
					სულ	საკვდელიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	რამდენი პროცენტია სტაციონარში (%)	რამდენი პროცენტია კონსტრუქციულად (%)	სულ	საკვდელიანობის მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე	რამდენი პროცენტია სტაციონარში (%)	რამდენი პროცენტია კონსტრუქციულად (%)
აჭარა	86	130,9	86,0	14,0	73	11,8	94,5	5,5	79	12,8	92,4	2,7
თბილისი	621	317,6	99,8	0,2	513	19,5	100	0	565	21,5	100,0	0
ქახეთი	35	50,9	74,3	25,7	30	8,7	80	20	33	9,5	78,8	3,7
იმერეთი	188	158,0	95,7	4,3	174	19,0	98,3	1,7	175	19,1	97,7	0,6
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	24	29,9	54,2	45,8	16	3,6	62,5	37,5	18	4,0	61,1	8,3
შიდა ქართლი	32	60,7	84,4	15,6	28	8,7	92,9	7,1	29	9,1	89,7	3,7
ქვემო ქართლი	30	35,5	53,3	46,7	16	3,3	87,5	12,5	27	5,5	55,6	40,0
გურია	3	12,6	100	0	2	1,8	100	0	2	1,8	100,0	0
სამცხე - ჯავახეთი	22	61,5	45,5	54,5	17	7,3	47,1	52,9	18	7,8	44,4	11,1
მცხეთა - მთიანეთი	3	16,2	66,7	33,3	3	5,7	66,7	33,3	3	5,7	66,7	0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
საქართველო	1044	138,7	93,0	7,0	872	14,1	96,2	3,8	949	15,4	94,7	1,9

ცხრილი 3.18 დაავადებების ინციდენტობა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2009		
	ახალი შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა ერთ წლამდე ასაკის 100000 ბავშვზე
სულ	62296	105586,4
მათ შორის		
ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	3272	5545,8
სიმსივნეები	26	44,1
სისხლისა და სისხლძარღვოვანი სისტემის დაავადებები	2631	4459,3
მეტაბოლური სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებები	2615	4432,2
ფსიქიკური და ქვეყნითი აშლილობები	24	40,7
ნერვული სისტემის დაავადებები	4830	8186,4
თვალებისა და მისი დანაწევების დაავადებები	1805	3059,3
ყურისა და ღვიძლისებრი მორჩის დაავადებები	2195	3720,3
სისხლის მიმოქცევის დაავადებები	167	283,1
სუნთქვის ორგანოების დაავადებები	37224	63091,5
საჭმლის მომკვლელობის ორგანოების დაავადებები	2035	3449,2
კანისა და კანქვეშა უჯრედების დაავადებები	1697	2876,3
კვალ-კუნთოვანი სისტემისა და შემაერთებელი ქსოვილის დაავადებები	238	403,4
შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები	884	1498,3
პერიტონალური პერიოდში განვითარებული ცალკეული მდგომარეობები	1174	1989,8
თანდაყოლილი მანკები, ღვიძლარაბიები და ქრომოსომული დარღვევები	592	1003,4
სიმკვრივე, ნივთები და ნორმალური გადარჩევი, გამოვლენილი კლინიკური და ლაბორატორიული გამოკვლევებისას	708	1200,0
ტრავმები, მოწვავებები და გარე მიზეზების შემთხვევები	179	303,4

ჯანმრთელობის დაცვა, საქართველო, 2009

ცხრილი 3.19 ღაავადმეგების ინციდენტობა სუთ ფლამდე ასაპის ბავშვებში, საქართველო, 2009		
	ასალი შმითხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა სუთ ფლამდე ასაპის 100000 ბავშვზე
სულ	205850	81686.5
<i>ბათ შირის</i>		
ინფექციური ღა პარაზიტული ღაავადმეგები	19273	7648,0
სიმსივნეები	49	194,4
სისხლისა ღა სისხლშბადი ორბანოების ღაავადმეგები	7365	2922,6
ჰედოქრინული სისტემის, კვებისა ღა ნივთიერებათა ცვლის ღარღვევით გამოწვეული ღაავადმეგები	4565	1811,5
ფსიქიკური ღა ქვევითი აშლილობები	205	81,3
მერვული სისტემის ღაავადმეგები	9515	3775,8
თვალისა ღა მისი ღანაგატების ღაავადმეგები	5100	2023,8
ყურისა ღა ღვრისებრი მორჩის ღაავადმეგები	5987	2375,8
სისხლის მიმოქცევის ღაავადმეგები	406	161,1
სუნთქვის ორბანოების ღაავადმეგები	132777	52689,3
საჭმლის მომეღმეული ორბანოების ღაავადმეგები	6168	2447,6
კანისა ღა კანქვეშა უჯრედისის ღაავადმეგები	5122	2032,5
კვალ-კუნთოვანი სისტემისა ღა შმეგრთეული ქსოვილის ღაავადმეგები	686	272,2
შარდ-სასმისო სისტემის ღაავადმეგები	2948	1169,8
პერინატალურ პერიოდში განვითარებული ცალკეული ღღგოგარეგები	1174	465,9
თანღაყოლილი მანგები, ღეფორგაციები ღა ქრომოსომული ღარღვევები	969	384,5
სიმპტომები, ნიშნები ღა ნორმიღან ბაღასრები, გამოწვენილი კლინიკური ღა ღაბორატორიული გამოკვლევებისას	2025	803,6
ტრავმები, მოწაველები ღა ბარე მიწეშების ჴემოქმედების ჴოგბერით სხვა შმღგები	1516	601,6


ცხრილი 3.20 ოპერაციები ქალის სასმესო ორბანოებზე ღა სამეანო-გინეკოლოგიური ოპერაციები სტაციონარში, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	სულ	ღებლობა (%)	სულ	ღებლობა (%)
ოპერაციები ქალის სასმესო ორბანოებზე	8543	0,06	9722	0,08
<i>ბათ შირის</i>				
საშვილოსნოს გამოწმება (აბორტის ბარეში)	1859	0	2395	0
ქალის სტერილიზაცია	197	0	192	0
საშვილოსნოს ამკუტაცია	1635	0,12	1235	0,08
საშვილოსნოს ქსტირააცია	2685	0,11	3570	0,20
საკვერცხის რეშექცია	789	0	851	0
ოვარექტომია	655	0	657	0
ქალის ბარეშა სასმესო ორბანოებზე ქსოვილის ამოკვეთით	230	0	177	0
სამეანო-გინეკოლოგიური ოპერაციები	32159	0,003	35535	0,01
<i>ბათ შირის</i>				
საშვილოსნობარე ორსულობა	1170	0	1219	0,1
მავის ღაღება	86	0	81	0
ვაკუუმექსტრაქცია	131	0	149	0
საკეისრო კვეთა	13870	0,01	17722	0,02
მცირე საკეისრო კვეთა	48	0	31	0
ნაყოფის ღაშლა	23	0	40	0
აბორტი	12763	0	16192	0

თავი 4

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა


უკანასკნელ წლებში საქართველოში აღინიშნება **ზოგადი ინციდენტობის და პრევალენტობის** ზრდის ტენდენცია, რაც განსაკუთრებით გამოიხატა 2009 წელს. 2008 წელთან შედარებით ზოგადი პრევალენტობა 41270,3-დან - 50243,8-მდე, ხოლო ინციდენტობა 18420,0-დან 26514,9-მდე გაიზარდა. გაზრდილია პრევალენტობის და ინციდენტობის მაჩვენებლები 15 წლამდე ასაკის ბავშვებშიც (შესაბამისად: პრევალენტობა 2008 წელს - 48946,4; 2009 წელს - 63198,8; ინციდენტობა 2008 წელს - 36808,3; 2009 წელს - 52339,1).

2009 წელს **ინფექციური და პარაზიტული ავადმყოფობების** ახალი შემთხვევების რაოდენობამ მოიმატა: მთლიან პოპულაციაში - 25,8%-ით, ბავშვებში - 27,4%-ით. ინციდენტობა ქვეყნის მაჩვენებელზე მაღალია მცხეთა-მთიანეთში - 1725,8, გურიაში - 1716,4 და აჭარაში - 1701,8. ბავშვებში ინციდენტობა ქვეყნის მაჩვენებელზე მაღალია გურიაში - 7937,0, იმერეთში - 6644,5, მცხეთა-მთიანეთში - 6194,6, აჭარაში - 6152,2 (ცხრილი 4.1, 4.4, სურათი 4.1).




ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხულ შემთხვევათა მესამედზე მეტი სოფლის ექიმების და ამბულატორიების მიერ დაფიქსირდა.

საანგარიშო წელს აღირიცხა **ვირუსული ჰეპატიტების** 4644 ახალი შემთხვევა, რაც 21,5%-ით ნაკლებია 2008 წელთან შედარებით. 2009 წელს **A ჰეპატიტის** და **ლაზერუსტეპელი** მწვავე ვირუსული ჰეპატიტების შემთხვევათა რაოდენობის კლების ტენდენცია გაგრძელდა. 2008 წელთან შედარებით შემთხვევების რაოდენობამ დაიკლო 2-ჯერ (ცხრილი 4.2, 4.3, სურათი 4.2).



2009 წელს რეგისტრირებულია **ვირუსული B ჰეპატიტის** 1634 შემთხვევა (ინციდენტობა - 37,0), მათ შორის 126 (7,7%) მწვავე და 1508 (92,3%) ქრონიკული შემთხვევა. **C ჰეპატიტის** 1968 აღრიცხული შემთხვევიდან (ინციდენტობა - 44,6) 68 (3,4%) მწვავეა, ხოლო 1900 (96,6%) - ახლად გამოვლენილი ქრონიკული. B და C ჰეპატიტების შემთხვევათა კლება ძირითადად მწვავე B და C ჰეპატიტების კლებამ გამოიწვია (ცხრილი 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, სურათი 4.3).




2009 წელს საქართველოში გაგრძელდა **დიფთერიის** შემთხვევათა კლება, 3 შემთხვევიდან ერთი აღრიცხულია 15-19 წლის, ხოლო 2 - 60 წელზე მეტ ასაკობრივ ჯგუფებში (ცხრილი 4.3).

ამეზიასის 4 შემთხვევიდან ბავშვებში აღრიცხულია 1.

2009 წელს მოიმატა **ბაქტერიული საკვებისმიერი ინფექციების** შემთხვევათა რაოდენობამ, თუმცა **ბოტულიზმის** შემთხვევათა რაოდენობამ 3,5-ჯერ დაიკლო. ბავშვებში აღრიცხულია ბოტულიზმის 1 შემთხვევა.

საანგარიშო წელს დაიკლო **წითელას, წითურას და ყბაყურას** შემთხვევების რაოდენობამ, როგორც მთლიან პოპულაციაში, ასევე ბავშვებში (ცხრილი 4.3, სურათი 4.4).



2009 წელს გაგრძელდა **მაღარიის** შემთხვევათა რაოდენობის კლების ტენდენცია და საქართველოში აღირიცხა მხოლოდ 1 შემთხვევა. ინციდენტობა, შესაბამისად 7,3-დან (2003 წ.) 0,02-მდე (2009 წ.) შემცირდა.

2003-2007 წლებში საქართველოში აღინიშნებოდა **ლეიშმანიოზის** შემთხვევათა რაოდენობის მატება. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ლეიშმანიოზის ინციდენტობამ მცირედ დაიკლო (2007 - 4,1, 2008 - 3,9, 2009 - 3,8). ბავშვებში ეს მაჩვენებელი 2008 წელთან შედარებით მომატებულია; აღირიცხული 138 შემთხვევიდან 125 - 0-5 წლამდე ასაკშია რეგისტრირებული (ცხრილი 4.2, 4.3).


2009 წელს აღირიცხულია **პიდროფობიის** 6 შემთხვევა. სამედიცინო დაწესებულებებს ანტირეპროდუქციული დახმარებისთვის მიმართა 41208 პაციენტი, რაც 9,3%-ით ნაკლებია წინა წელთან შედარებით. პაციენტთა 93,8% მიიღო დანიშნულება ვაქცინაციაზე, აქედან 57,5%-ს დაენიშნა ანტირეპროდუქციული ვაქცინაციის პირობითი კურსი, 30,6%-ს აცრების სრული კურსი. პაციენტთა 11,9%-მა დამოუკიდებლად შეწყვიტა მკურნალობა.

საანგარიშო წელს აღირიცხა **მენინგიტების** 190 შემთხვევა (ინციდენტობა - 4,3), მათ შორის ბავშვებში შემთხვევათა რაოდენობამ მოიმატა 33 შემთხვევით (ინციდენტობა - 14,6). **მენინგოკოკების** 34 შემთხვევიდან 32 შემთხვევა (ინციდენტობა - 4,2) ბავშვებშია აღირიცხული (ცხრილი 4.2, 4.3). გარდაიცვალა 10 ავადმყოფი, მათ შორის 8 ბავშვი.

გამოვლენილია **მწვავე ღუნე დაბლის** 12 შემთხვევა 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში (ინციდენტობა - 1,6), მათ შორის ერთი შემთხვევა ერთ წლამდე ასაკის, 3 შემთხვევა 1-4 წლის ასაკის, 8 შემთხვევა 5-14 წლის

ასაკის ბავშვებში. ეპიდზედაცვითი მაჩვენებელი ჯანმრთელობის მიერ შექმნილი პოლიომიელიტის ლიკვიდაციის სერტიფიცირების გლობალური კომისიის სტანდარტით (1 შემთხვევა 0-15 წლამდე ასაკის 100000 ბავშვზე) მაღალია.

უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში აღინიშნებოდა **ნაწლავური ინფექციების** ინციდენტობის მცირე კლება (სურათი 4.5). მიუხედავად ამისა, ისევ მაღალია **საგარეო ინფექციური წარმოშობის დიარეების** მაჩვენებელი: ინციდენტობა ქვეყნის მთლიან მოსახლეობაში - 225,0, ბავშვებში - 872,9 (ცხრილი 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, სურათი 4.5).






2009 წელს აღირიცხულია **მწვავე რესპირაციული ინფექციების** 273468 და **გრიპის** 36136 შემთხვევა. მომატებულია მწვავე რესპირაციული ინფექციების და გრიპის შემთხვევათა რაოდენობა ბავშვებშიც (მაჩვენებლები, შესაბამისად, 24594,0 და 2067,2). გრიპის მსგავსი დაავადების დიაგნოზით აღირიცხულია პოსპიტალიზაციის 13656 შემთხვევა, რაც თითქმის 2-ჯერ მეტია, ვიდრე 2008 წელს. პოსპიტალიზაციის რაოდენობა 2-ჯერ გაზრდილია ბავშვებშიც (10383 პოსპიტალიზაცია). გრიპის რეგისტრირებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა 3,5-ჯერ აღემატება წინა წლის მონაცემებს და საქართველოში პანდემიური გრიპის ვირუსის გავრცელებასთან არის დაკავშირებული.

2009 წელს საქართველოში დაფიქსირდა ლაბორატორიულად დადასტურებული გრიპით გარდაცვალების 19 შემთხვევა, მათ შორის ერთ შემთხვევაში ლაბორატორიულად დადასტურებული იყო B ტიპის ვირუსი, 15 - პანდემიური გრიპის ვირუსი, 1 - სეზონური გრიპის ვირუსი.

პანდემიური გრიპის ვირუსით გარდაცვლილთაგან 47%-ში აღინიშნა სხვა თანმხლები პათოლოგიები (შაქრიანი დიაბეტი, ჰემოლიზური ანემია, ვირუსული C ჰეპატიტი, ბრონქული ასთმა, ჭარბი წონა);

გარდაცვლილთა 20% იყო ორსული; დანარჩენი შემთხვევები აღწერილ იქნა, როგორც თანმხლები პათოლოგიების გარეშე მიმდინარე.

2009 წელს საქართველოში რეგისტრირებული იყო **ფილტვის და ფილტვარეშე ტუბერკულოზის** 4471 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა – 101,4), მათ შორის 3175 ფილტვის (ინციდენტობა - 72,0), ხოლო 1296 - ფილტვარეშე ტუბერკულოზის (ინციდენტობა – 29,4) ახალი შემთხვევა. ფილტვის ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების 64,7%-ს მგბ+ შემთხვევები შეადგენს (ცხრილი 4.13, 4.14, სურათი 4.6, 4.7, 4.8).



ყველა სახის ფილტვარეშე ტუბერკულოზის და ფილტვის ტუბერკულოზის ინციდენტობის და პრევალენტობის მაღალი მაჩვენებელია აჭარაში, თბილისში და სამეგრელოში (ცხრილი 4.15, 4.16, 4.17). ფილტვარეშე ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი მოდის ტუბერკულოზურ პლევრიტზე (52,6%), ლიმფური კვანძების (22,9%) და ძვალ-სახსართა ტუბერკულოზზე (9,9%). ტუბერკულოზური მენინგიტის 32 შემთხვევიდან, 2 შემთხვევა აღრიცხულია ბავშვებში (ცხრილი 4.18, 4.19).

2009 წელს, 12 თვის წინ რეგისტრირებული ფილტვის მგბ+ ტუბერკულოზის ახალი 1868 შემთხვევის მკურნალობის შედეგად ავადმყოფთა 60,3% განიკურნა; მკურნალობა დაასრულა 13,2%-ში, უშედეგო იყო 4,4%-ში, ავადმყოფთა 8,8%-მა შეწყვიტა მკურნალობა (ცხრილი 4.20).


საქართველოში აივ ინფექცია/შიდსის შემთხვევების ეპიდზედამხედველობის ეროვნული გეგმა შემუშავდა გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „აივ ინფექცია/შიდსის ეროვნული პროგრამების განხორციელებისათვის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ბაზის შექმნა ქვეყანაში აივ ინფექცია/შიდსზე ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაძლიერების გზით“ ფარგლებში.

ეროვნულ გეგმაზე მუშაობას წინ უსწრებდა 2007 წლამდე არსებული აივ ინფექცია/შიდსის ეპიდზედამხედველობის სისტემის საფუძვლიანი შეფასება და 2010 წლიდან ქვეყნის მასშტაბით ეპიდზედამხედველობის ახალი დიზაინის სისტემის დანერგვა. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აივ ინფექცია/შიდსის განყოფილებაში შეიქმნა ელექტრონული ბაზა.


2009 წელს საქართველოში რეგისტრირებულია **აივ/შიდსის** 332 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა – 7,7), მათ შორის 4 შემთხვევა რეგისტრირებულია 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში (ცხრილი 4.21, 4.23, სურათი 4.9).

აივ/შიდსის გადაცემის გზების მიხედვით, ახალი შემთხვევების 56,8% ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებზე, ხოლო 39,3% სქესობრივ კონტაქტებზე მოდის. საანგარიშო წელს რეგისტრირებულია ვერტიკალური (დედიდან შვილზე) გადაცემის 4 ახალი შემთხვევა (ცხრილი 4.22).

2009 წელს აივ-ინფექციაზე გამოკვლეულ იქნა 48123 ორსული.




2009 წელს აღრიცხულია **სიფილისის** 503 (ინციდენტობა - 11.4) და **გონორეული ინფექციის** 670 (ინციდენტობა - 15.2) ახალი შემთხვევა (ცხრილი 4.24, სურათი 4.10).



სიფილისზე გამოკვლეული 49908 ორსული ქალიდან სიფილისი აღმოაჩნდა 15 ქალს.

2009 წელს მომატებულია **ქლამიდიური ინფექციის**, სიფილისის და **ტრიქომონიაზის** ინციდენტობის მაჩვენებლები (ცხრილი 4.25, სურათი 4.11).




ქლამიდიური ინფექციის რაოდენობა, წინა წელთან შედარებით, 709 შემთხვევიდან (ინციდენტობა - 16,2) 1276 შემთხვევამდე (ინციდენტობა - 28,9) გაიზარდა. **ტრიქომონიაზის** ინციდენტობის მაჩვენებელი ქალებში თითქმის ორჯერ მეტია, ვიდრე მამაკაცებში (ცხრილი 4.26).

2009 წელს საქართველოში მოიმატა **მიკოზების** ინციდენტობამ, ძირითადად **კანდიდოზების** რაოდენობის მატების ხარჯზე (ცხრილი 4.27). **აკარიაზის** ინციდენტობის მაჩვენებელი (41,5), 2008 წელთან შედარებით უმნიშვნელოდ დაკლებულია (ცხრილი 4.28).

2009 წელს საქართველოს **სტაციონარებში ინფექციური დაავადებების** დიაგნოზით აღირიცხა 16691 შემთხვევა (ცხრილი 4.10), მათ შორის 9399 ბავშვებში (ცხრილი 4.11). ბავშვთა პოსტიტალიზაციის შემთხვევათა 68,2% ნაწლავურ ინფექციებზე მოდის (ლეტალობა - 0,2%). 0-1 წლამდე ასაკის ბავშვებში მაღალია ლეტალობა (38,9%) სეპტიცემიის გამო. ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების დიაგნოზით საავადმყოფოდან გასული ავადმყოფების 51,1% თბილისში მკურნალობდა (ცხრილი 4.12).

2008 წელთან შედარებით, 2009 წელს მოიმატა **სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების** პრევალენტობამ წლის ბოლოსთვის (6993,3-დან 7400,3-მდე) და ინციდენტობამ (1696,7-დან 2177,3-მდე) (ცხრილი 4.29, 4.30, სურათი 4.12).



წლის ბოლოს რეგისტრირებული 326421 ავადმყოფიდან 40% აღრიცხულია თბილისში, 16% იმერეთში, 9% კახეთში (ცხრილი 4.32).


რეგონების მიხედვით სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების პრევალენტობის მაღალი მაჩვენებლებია რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში (14616,4), თბილისში (11657,0), იმერეთში (7687,7), კახეთში (7630,6); ინციდენტობის მაღალი მაჩვენებლებია რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში (5096,4),

მცხეთა-მთიანეთში (4048,0), იმერეთში (3125,4) და კახეთში (3050,6) (ცხრილი 4.32).

წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევებიდან 55,2% **ჰიპერტენზიული დაავადებების** შემთხვევებია, 26,8% - **გულის იშემიური დაავადებები**, 4,2% - **გულის რევმატიული დაზიანებები** (ცხრილი 4.30, 4.33). მთელ პოპულაციაში სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხულ დაავადებებში 51% **ჰიპერტენზიული დაავადებაა**, 24,0% - **გულის იშემიური დაავადებები**.

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების ახალი შემთხვევების 40% და **ჰიპერტენზიული დაავადებების** ახალი შემთხვევების 48% სოფლის ექიმების მიერ იქნა აღრიცხული.

2009 წლის მონაცემებით, მოიმატა **ჰიპერტენზიული დაავადების** და **ცერებროვასკულური დაავადებების** პრევალენტობამ და ინციდენტობამ (სურათი 4.13, 4.14).





43%-ს (პრევალენტობა 273,1), ხოლო ახალი შემთხვევების 18,5%-ს (ინციდენტობა 33,3) შეადგენს (ცხრილი 4.31, 4.33).

გულის იშემიური დაავადებების ახალი შემთხვევების სტრუქტურაში 39,8% **სტენოკარდიის**, ხოლო 9% - **მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის** შემთხვევებზე მოდის (ცხრილი 4.35, სურათი 4.15).

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გავიდა 42823 ავადმყოფი, მათ შორის გარდაიცვალა 2736, (ლეტალობა - 6,4%). ლეტალობის მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა გურიაში (11,1%), სამცხე-ჯავახეთში (11%) და მცხეთა-მთიანეთში (9,6%), დაბალი - სამეგრელოსა და ზემო სვანეთში (2,2%) (ცხრილი 4.38).

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების კლასში მაღალი ლეტალობა აღინიშნა ფილტვისმიერი გულის და სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის დარღვევების (37,1%) და **ცერებროვასკულური დაავადებების** (17,9%) ჯგუფებში (ცხრილი 4.37).



საავადმყოფოდან გულის იშემიური დაავადებების დიაგნოზით გაწერილთა 35,8% **სტენოკარდიაზე**, ხოლო 28,8% - **მწვავე და განმეორებით ინფარქტზე** მოდის (ცხრილი 4.37).

მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის დიაგნოზით დაავადების დაწყების პირველ 24 საათში პოსპიტალიზებულ იქნა 2065 ავადმყოფი (36,8% მწვავე ინფარქტის დიაგნოზით პოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან). მიოკარდიუმის ინფარქტის დიაგნოზით სტაციონარში გარდაცვლილთა 47,6% (264 ავადმყოფი) სტაციონარში მიყვანიდან პირველ 24 საათში, ხოლო 16 ავადმყოფი - 30 დღის განმავლობაში გარდაიცვალა.


2009 წელს საქართველოში გაიზარდა **გულზე ჩატარებულ ოპერაციათა** რაოდენობა, როგორც მთლიან პოპულაციაში, ასევე ბავშვებში. სულ ჩატარდა 1373 ოპერაცია

გულის რევმატიული დაავადებების 19770 რეგისტრირებული შემთხვევიდან 12035 (60,9%) გულის ქრონიკული რევმატიული დაზიანებებია (ცხრილი 4.36). გულის მწვავე და ქრონიკული რევმატიული დაზიანებები ბავშვებში რეგისტრირებულ შემთხვევათა

გულზე (ლეტალობის მაჩვენებელი - 3,5%), მათ შორის 0-14 წლის ბავშვებში - 255 ოპერაცია (ლეტალობის მაჩვენებელი - 10,6%). ღია გულზე ჩატარდა 788 ოპერაცია (ლეტალობა - 5,2%), თანდაყოლილი მანკების გამო 162 ოპერაცია (ლეტალობა - 2,5%). გაკეთდა 112 კარდიოსტიმულატორის იმპლანტირება (ლეტალობა - 0,9%) და 187 ენდოვასკულური ბალონური დილატაცია (ლეტალობა - 0%). სისხლძარღვებზე ჩატარებულია 3957 ოპერაცია (ლეტალობა - 0,5%) (ცხრილი 4.39).

2009 წელს საქართველოში **სიმსივნეების** (კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი) დიაგნოზით რეგისტრირებული იყო 59000 ავადმყოფი (პრევალენტობის მაჩვენებელი - 1337,6), მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით 13001 (ინციდენტობის მაჩვენებელი - 294,7) (ცხრილი 4.40).

ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოზით წლის ბოლოს რეგისტრირებული იყო 30954 ავადმყოფი (პრევალენტობის მაჩვენებელი - 701,8), მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხულია 5656 ადამიანი (ინციდენტობა - 128,2) (სურათი 4.16).



ავთვისებიანი სიმსივნეებით პრევალენტობა წლის ბოლოს მაღალია შიდა ქართლში - 1252,1; კახეთში - 1070,0 და აჭარაში - 969,1. ინციდენტობის მაღალი მაჩვენებელი აღირიცხა რაჭა-ლეჩხუმში - 215,9, კახეთში - 156,8 და აჭარაში - 148,2 (ცხრილი 4.41).



საანგარიშო წლის ბოლოს აღრიცხვაზე მყოფი ავადმყოფიდან 36,6% სოფლის მაცხოვრებელია.

სიცოცხლეში პირველად დადგენილი ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოზით აღრიცხულ ავადმყოფთა რაოდენობის 52,4% ქალია, 47,6% - მამაკაცი (ცხრილი 4.42). ახალი შემთხვევების საერთო რიცხვიდან

დიაგნოზი მორფოლოგიურად დადასტურდა 3352 (59,2%) შემთხვევაში.

ქალთა პოპულაციაში სიცოცხლეში პირველად გამოვლენილი ავთვისებიანი სიმსივნეების სტრუქტურაში სარძევე ჯირკვლის სიმსივნეები 34,5%-ს (მათ შორის ფერტილური ასაკის ქალებში - 45,3%-ს), სასქესო ორგანოთა ავთვისებიანი სიმსივნეები 22,5%-ს (მათ შორის ფერტილური ასაკის ქალებში - 28,1%-ს) შეადგენდა (ცხრილი 4.41).


ქალებში ასაკთან ერთად მატულობს სარძევე ჯირკვლის და საშვილოსნოს ყელის სიმსივნეებით ავადობა და სარძევე ჯირკვლისთვის 60-74 წლის, ხოლო საშვილოსნოს ყელისთვის 60-64 წლის ასაკის ქალებში აღწევს მაქსიმუმს (სურათი 4.17, 4.18).



მამაკაცებში სიცოცხლეში პირველად დადგენილი სიმსივნეების ლოკალიზაციის მიხედვით მაღალი პროცენტით ხასიათდება სასუნთქ ორგანოთა - 31,7%, საჭმლის მომნელებელი სისტემის - 26,6% და სასქესო ორგანოთა - 10,8% სიმსივნეები (ცხრილი 4.43).


სასუნთქ ორგანოთა სიმსივნეებით ავადობა

მამაკაცებში მაქსიმუმს 70 – 74 წლის ასაკობრივ ჯგუფში აღწევს (სურათი 4.19).



2009 წელს ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების 22,4%-ში დადგინდა დაავადების I და II, 23,9%-ში - III, ხოლო 48,0%-ში - IV სტადია (ცხრილი 4.44).

სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნის შემთხვევათა 7,1%-ში დადგინდა დაავადების I, 32,0%-ში - II, 29,3%-ში - III, ხოლო 28,5%-ში - IV სტადია (ცხრილი 4.45, სურათი 4.20).



საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნის შემთხვევათა 10,7%-ში დადგინდა დაავადების I, 25,3%-ში - II, 29,5%-ში - III, ხოლო 30,6%-ში - IV სტადია (ცხრილი 4.46, სურათი 4.20).

სარძევე ჯირკვლის და საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნეების დიაგნოზის დადგენიდან პირველივე წელს გარდაცვლილ ქალთა რაოდენობის წილი საკმაოდ მაღალია (ცხრილი 4.47, 4.48).

1999-2009 წლებში საშვილოსნოს ყელის, საშვილოსნოს ტანის და სარძევე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების განაწილება რეგიონების მიხედვით წარმოდგენილია ცხრილებში 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 და 4.53.

2008 წელს საქართველოში ჩატარებულმა რეპროდუქციული ასაკის ქაღალთა

სიკვდილიანობის კვლევაში შეისწავლა ავთვისებიანი სიმსივნით გარდაცვალების 402 შემთხვევა დიაგნოზის დასმის მომენტში სტადიის გამოვლენის კუთხით. ამ პაციენტთა შორის 294 (73,1%) დიაგნოსტირებულ იქნა გვიან სტადიაზე (III-IV სტადია ან უფრო გვიანი). მხოლოდ 65 (16,2%) ქალი იქნა დიაგნოსტირებული ადრეულ სტადიაზე (I-II სტადია ან უფრო ადრე). დიაგნოზის დასმის მომენტში ავთვისებიანი სიმსივნის სტადია 43 (10,7%) პაციენტისთვის არ იყო ცნობილი.

2009 წელს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ონკოლოგიური სამსახურის მიერ რეგისტრირებული იყო ავთვისებიანი სიმსივნეებით გარდაცვალების 4497 შემთხვევა. საანგარიშო წლის განმავლობაში გარდაცვლილთა 45,0%-ს დიაგნოზის დადგენიდან პირველივე წელს გარდაცვლილები შეადგენდნენ.

სამედიცინო დაწესებულებების მიერ აღრიცხულ გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობიდან 24,7% გარდაიცვალა საჭმლის მომნელებელი სისტემის, 18,9% - სასუნთქ ორგანოთა, 14,0% - სარძევე ჯირკვლის, 12,1% - ქალის სასქესო ორგანოთა ავთვისებიანი სიმსივნით.

5656 ავადმყოფიდან, რომელთაც 2009 წელს სიცოცხლეში პირველად დაუდგინდათ დიაგნოზი, 35,8% გარდაიცვალა (ცხრილი 4.54).

2009 წელს აღრიცხვაზე ხუთი და მეტი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა 13126 ავადმყოფი (42,4%). ეს მაჩვენებელი განსხვავდება სიმსივნეების ლოკალიზაციის მიხედვით. მინიმალურ პროცენტს (13,4%) არაზუსტად აღნიშნული, მეორადი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის ავთვისებიანი სიმსივნეები შეადგენს (ცხრილი 4.55).


იმ ავადმყოფებიდან, რომლებიც სპეციალურ მკურნალობას ექვემდებარებიან (II კლინიკური ჯგუფი), მკურნალობა დაამთავრა 2130 პაციენტმა. მკურნალობისთვის გამოყენებული იქნა შემდეგი მეთოდები: მხოლოდ ქირურგიული - 791, მხოლოდ სხივური - 212, მხოლოდ მედიკამენტები - 334 შემთხვევაში. კომბინირებული ან კომპლექსური მკურნალობა (ქიმიურ-სხივურის გარდა) ჩატარდა 710 შემთხვევაში (ცხრილი 4.56).

სიმსივნეების დიაგნოზით საქართველოს სტაციონარებში მკურნალობდა 14872 ავადმყოფი. სიმსივნეებით ლეტალობის მაჩვენებელია 2,3% (ცხრილი 4.57).

* რეპროდუქციული ასაკის ქაღალთა სიკვდილიანობის კვლევა (RAMOS)

928 ბავშვიდან, რომლებიც სიმსივნეების დიაგნოზით მკურნალობდნენ სტაციონარში, გარდაიცვალა 15, ბავშვებში სიმსივნეების ლეტალობის მაჩვენებელია 1,6% (ცხრილი 4.58).

2009 წელს საქართველოში **სასუნთქი სისტემის ორგანოთა დაავადებების** პრევალენტობამ და ინციდენტობამ მკვეთრად მოიმატა. სასუნთქი სისტემის ორგანოთა დაავადებების დიაგნოზით რეგისტრირებულია 505340 შემთხვევა (პრევალენტობა – 11456,6), მათ შორის 88,6% - სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით - 447518 (ინციდენტობა – 10145,7). სასუნთქი სისტემის ორგანოთა დაავადებების 259136 შემთხვევა რეგისტრირებულია 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში (პრევალენტობა – 34418,4), მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით - 246604 შემთხვევა (ინციდენტობა – 32753,9) (ცხრილი 4.59, სურათი 4.21).




სასუნთქი სისტემის ორგანოთა დაავადებების პრევალენტობის მაღალი მაჩვენებელი აღირიცხა მცხეთა-მთიანეთში – 14806,1, თბილისში – 12332,1 და კახეთში – 12168,7. პრევალენტობის დაბალი მაჩვენებელი აღინიშნება ქვემო ქართლში – 5928,6, სამეგრელოში – 7074,1 და სამცხე-ჯავახეთში – 8960,4. ინციდენტობის მაჩვენებელი მაღალია მცხეთა-მთიანეთში – 13831,9 და შიდა ქართლში – 12975,4. ინციდენტობის დაბალი მაჩვენებელი აღირიცხა ქვემო ქართლში – 5510,8 და სამეგრელოში – 5706,2.

ბავშვებში პრევალენტობა მაღალია შიდა ქართლში – 43795,1 და თბილისში – 43483,9. ინციდენტობის მაღალი მაჩვენებელია შიდა ქართლში – 42958,3, თბილისში – 40062,9 და იმერეთში 36054,6 (ცხრილი 4.60).

სასუნთქი სისტემის ორგანოების დაავადებების რეგისტრირებულ შემთხვევათა 59,2%-ს და ახალ შემთხვევათა 65,8%-ს ზედა

სასუნთქი გზების მწვავე რესპირაციული ინფექციები შეადგენს. ბავშვებში ზედა სასუნთქი გზების მწვავე რესპირაციული დაავადებების წილი კიდევ უფრო მაღალია: რეგისტრირებულ შემთხვევებში – 71,0%, ახალ შემთხვევებში – 74,1% (ცხრილი 4.61, 4.62).

ბრონქული ასთმის და ასთმური სტატუსის დიაგნოზით რეგისტრირებულია 16000 ავადმყოფი (პრევალენტობა – 362,7), მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით 3323 ავადმყოფი (ინციდენტობა – 75,3) (ცხრილი 4.61, 4.62, სურათი 4.22). ბრონქული ასთმით პრევალენტობის მაღალი მაჩვენებელია რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში – 547,2, იმერეთში – 487,2 და გურიაში – 333,8. ინციდენტობის მაჩვენებელი მაღალია იმერეთში – 98,8 და რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში - 96,4 (ცხრილი 4.63, 4.64). ბავშვებში ბრონქული ასთმის დიაგნოზით რეგისტრირებულია 1840 შემთხვევა, (პრევალენტობის მაჩვენებელი 244,2) მათ შორის 497 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობის მაჩვენებელი 66,0).




0-15 წლამდე ბავშვებში ბრონქული ასთმით პრევალენტობის მაჩვენებლები მაღალია გურიაში – 544,2, იმერეთში – 453,8 და აჭარაში 236,1. ინციდენტობის მაჩვენებლები მაღალია იმერეთში – 100,8, გურიაში – 96,6 და თბილისში – 91,6 (ცხრილი 4.63, 4.64).

პნევმონიის დიაგნოზით რეგისტრირებულია 34097 შემთხვევა, პრევალენტობა – 773,0, მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით - 32965 შემთხვევა, ინციდენტობა – 747,4). ბავშვებში პნევმონიის დიაგნოზით რეგისტრირებულია 13520 შემთხვევა (პრევალენტობა – 1795,7); პირველად დადგენილი დიაგნოზით – 13222, ინციდენტობა – 1756,1 (ცხრილი 4.61, 4.62).

ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტის დიაგნოზით სულ რეგისტრირებულია 20065 შემთხვევა (პრევალენტობა – 454,9), აქედან


სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით 8506, ინციდენტობა – 192,8. ბავშვებში რეგისტრირებულია ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტის 3323 შემთხვევა (პრევალენტობა – 441,4), აქედან პირველად დადგენილი დიაგნოზით - 2372 შემთხვევა (ინციდენტობა - 315,0) (ცხრილი 4.61, 4.62, სურათი 4.23).



2009 წელს საქართველოში სასუნთქი სისტემის ორგანოთა დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარებში მკურნალობდა და გავიდა 55117 ავადმყოფი, მათ შორის 34847 ბავშვი. სტაციონარიდან გასულთა საერთო რაოდენობიდან გარდაიცვალა 492 ავადმყოფი (ლეტალობა – 0,9), მათ შორის 97 ბავშვი (ლეტალობა – 0,3) (ცხრილი 4.65).

სასუნთქი სისტემის ორგანოთა დაავადებების დიაგნოზით გარდაცვლილი 97 ბავშიდან 69 ერთ წლამდე ასაკისაა (ლეტალობა – 0,6), მათ შორის გარდაიცვალა: მწვავე რესპირაციული ინფექციებით – 5, პნევმონიით – 14, სასუნთქი სისტემის ორგანოთა სხვა დაავადებებით – 50.



პნევმონიის დიაგნოზით სტაციონარებში მკურნალობდა და გავიდა 15062 ავადმყოფი, მათ შორის გარდაიცვალა 151 (ლეტალობა – 1,0) (ცხრილი 4.65, სურათი 4.24).



გასულ ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან 7856 ბავშვია, მათ შორის გარდაიცვალა 18 (ლეტალობა – 0,2). 1 წლამდე ასაკის სტაციონარიდან გასულ ბავშვთა საერთო რაოდენობიდან (2777) გარდაიცვალა 14 (ლეტალობა – 0,5).

2009 წელს გრიპისმაგვარი დაავადებების პოსპიტალიზებული შემთხვევების რაოდენობამ 2008 წელთან შედარებით თითქმის 2-ჯერ მოიმატა. აღნიშნულ შემთხვევათა 76,0% 15 წლამდე ასაკის ბავშვებზე მოდის. პოსპიტალიზებული ავადმყოფების უმრავლესობა მკურნალობდა თბილისში და სამეგრელოში (ცხრილი 4.66, 4.67). სუნთქვის ორგანოებზე 2009 წელს ჩატარდა 1035 ოპერაცია (ცხრილი 4.68).

2009 წელს საქართველოს ამბულატორულ - პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში წლის ბოლოს რეგისტრირებულია ფსიქიური და ქცევითი აშლილობის 76457 შემთხვევა, პრევალენტობა – 1733,4, მათ შორის ბავშვებში – 1651 შემთხვევა, პრევალენტობა – 219,3. სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხულია 2505 შემთხვევა, ინციდენტობა – 56,8, მათ შორის 343 ბავშვებში ინციდენტობა – 45,6 (ცხრილი 4.69, სურათი 4.25, 4.26).



ფსიქიურ აშლილობათა პრევალენტობის მაღალი მაჩვენებელი აღინიშნა: იმერეთში – 2633,6, სამეგრელოში – 2574,9, გურიაში – 2294,3. წინა წელთან შედარებით აღნიშნულ რეგიონებში ფსიქიურ აშლილობათა პრევალენტობის მაჩვენებლები გაიზარდა. პრევალენტობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აღრიცხულია სამცხე-ჯავახეთში – 902,7 და თბილისში – 871,1 (ცხრილი 4.70).

2008 წელთან შედარებით ფსიქიურ აშლილობათა ინციდენტობის მაჩვენებელმა დაიკლო 85,3-დან 56,8-მდე. ეს მაჩვენებელი მაღალია: შიდა ქართლში - 133,7, იმერეთში – 85,5 გურიაში – 73,9. დაბალი ინციდენტობის მაჩვენებელი აღრიცხულია ქვემო ქართლში - 29,3, მცხეთა-მთიანეთში – 29,5 (ცხრილი 4.71).

დისპანსერების და კონსულტაციური დაწესებულებების მონაცემებით, ფსიქიურ დაავადებების შემთხვევათა 29,9%-ში აღირიცხა შიზოფრენია, შიზოტიპური და ბოდიითი აშლილობები, 28,1%-ში - გონებრივი ჩამორჩენილობა.

2009 წლის ბოლოს ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერებში დაკვირვებაზე მყოფ ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან 1651 (2,2%) ბავშვია. დისპანსერული მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი ბავშვების 63,8%-ს აღენიშნა გონებრივი ჩამორჩენილობა, 20,5%-ს - ორგანული ბუნების აშლილობები, 6,7%-ს ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქცევითი და ემოციური აშლილობები, ხოლო 1,5%-ს - შიზოფრენია (ცხრილი 4.72).

2009 წელს საქართველოში ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერებში დაკვირვებაზე მყოფ 76457 ავადმყოფიდან 39,5%-ს ქალები შეადგენენ. ფსიქიური დარღვევების საერთო რაოდენობიდან შემთხვევათა 42,0% რეგისტრირებულია სოფლის მაცხოვრებლებში.

საანგარიშო წლის განმავლობაში დისპანსერული და კონსულტაციური მეთვალყურეობიდან მოიხსნა 1713 ავადმყოფი, მათ შორის 49 გაჯანსაღებით ან ჯანმრთელობის მკვეთრი გაუმჯობესებით.

2009 წელს საქართველოში ფსიქიური აშლილობის დიაგნოზით სტაციონარიდან გასულია 3488 ავადმყოფი, მათ შორის გარდაიცვალა 52 (დეტალობის მაჩვენებელი – 1,5) (ცხრილი 4.74, 4.75).

2007 წლიდან დაიკლო პაციენტთა როცხემა, რომლებიც მკურნალობდნენ დღის სტაციონარში (2007 წ. – 992, 2008 წ. - 670). 2009 წელს სამეგრელოში ფუნქციონირებდა


სენაკის ფსიქონევროლოგიური პროფილის დღის სტაციონარი 15 საწოლზე, სადაც ფსიქიური აშლილობების დიაგნოზით მკურნალობა ჩუტარდა 155 ავადმყოფს.

2009 წლის ბოლოს **ენდოკრინული სისტემის დაავადებების, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნიტეტის დარღვევების** დიაგნოზით რეგისტრირებულია 124793 შემთხვევა (პრევალენტობა – 2829,2). სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხულია 40054 შემთხვევა (ინციდენტობა – 908,1), მათ შორის 7982 ბავშვებში (19,9% საერთო რაოდენობიდან, ინციდენტობა – 1060,2) (ცხრილი 4.76).

დაავადებათა სტრუქტურის მიხედვით: 39,6%-ში (49453 შემთხვევა, პრევალენტობა – 1121,2) - ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი; 20,8%-ში (25913 შემთხვევა, პრევალენტობა - 587,5) - სუბკლინიკური იოდ-დეფიციტური ჰიპოთირეოზი და ჰიპოთირეოზის სხვა ფორმები; 15,6%-ში (19461 შემთხვევა; პრევალენტობა – 441,2) - ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი; 12,0%-ში (15793 შემთხვევა, პრევალენტობა - 358,0) - არატოქსიური ჩიყვის სხვა ფორმები; 4,5%-ში (5637 შემთხვევა, პრევალენტობა – 127,8) აღირიცხა თირეოტოქსიკოზი ჩიყვით და ჩიყვის გარეშე (ცხრილი 4.77).

შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზით წლის ბოლოს რეგისტრირებულია 68914 ავადმყოფი (პრევალენტობა – 1562,4), მათ შორის 257 ბავშვი (პრევალენტობა – 34,1). პირველად დადგენილი შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზით აღრიცხულია 11127 ავადმყოფი (ინციდენტობა – 252,3), მათ შორის 64 ბავშვი (ინციდენტობა – 8,5) (ცხრილი 4.79, 4.80).

შაქრიანი დიაბეტით რეგისტრირებულ ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან 28,2% (19461 შემთხვევა, პრევალენტობა – 441,2) ინსულინდამოკიდებულია (ტიპი I), ხოლო ბავშვებში - 88,3% (228 შემთხვევა, პრევალენტობა – 30,3) (სურათი 4.27).



შაქრიანი დიაბეტის მაღალი პრევალენტობა აღრიცხულია თბილისში – 2097,7, რაჭა-ლეჩხუმში – 1945,5, იმერეთში – 1915,8 და აჭარაში – 1771,2. ინციდენტობის მაღალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა შიდა ქართლში – 478,0, იმერეთში – 387,0, კახეთში – 352,8 და აჭარაში – 290,7 (ცხრილი 4.81).



ენდოკრინული სისტემის, კვების, ნივთიერებათა ცვლის და იმუნიტეტის დარღვევების დიაგნოზით სტაციონარებში მკურნალობდა და გავიდა 3836 ავადმყოფი, მათ შორის გარდაიცვალა 70 (ლეტალობა – 1,8). ავადმყოფთა 50,8% (1950 შემთხვევა, მაჩვენებელი – 44,2) შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზით იყო ჰოსპიტალიზებული, მათ შორის გარდაიცვალა 52 ავადმყოფი (ლეტალობა – 2,7) (ცხრილი 4.82).

საქართველოში მოქმედებს სპეციალური სტატისტიკური ფორმა, რომელშიც აღირიცხება ფარისებრი ჯირკვლის პროფილაქტიკური გამოკვლევები. 2009 წელს საქართველოში ფარისებრი ჯირკვლის გამოსაკვლევად მიმართა 46486 ადამიანი, მათ შორის 9912 ბავშვმა. აღნიშნული კონტინგენტიდან **ფარისებრი ჯირკვლის პიკერპლანია** აღმოაჩნდა 25780 ადამიანს – 55,4%, მათ შორის 5617 ბავშვია – 56,7% (ცხრილი 4.84, 4.85).

გამოკვლეულ პირთა საერთო რაოდენობიდან მკურნალობა დაენიშნა 22764 ადამიანს, მათ შორის 4616 ბავშვს. იოდით პროფილაქტიკა ჩატარდა 21521 ადამიანს, მათ შორის 7113 ბავშვს (ცხრილი 4.86, 4.87).

2009 წელს საქართველოს ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში რეგისტრირებულია **შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების** 112647 შემთხვევა (პრევალენტობა – 2553,8), მათ შორის 7981 ბავშვებში (პრევალენტობა – 1060,0). სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხულია 64652 შემთხვევა (ინციდენტობა – 1465,7), მათ შორის 6152 ბავშვებში (ინციდენტობა – 817,1) (ცხრილი 4.88, სურათი 4.28, 4.29).

2009 წელს შარდ-სასქესო სისტემის პრევალენტობის მაღალი მაჩვენებელი აღინიშნა: აჭარაში – 3191,9; რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში – 2777,8; მცხეთა-მთიანეთში – 2682,4. ზემოაღნიშნულ რეგიონებში, 2008 წელთან შედარებით, აღინიშნება პრევალენტობის მაჩვენებლების შესამჩნევი ზრდა. პრევალენტობის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი აღირიცხა ქვემო ქართლში – 1309,9.




რეგისტრირებულ ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან 57,4% ახალი შემთხვევები იყო, რაც აღემატება 2008 წლის მონაცემს (52,6%). ინციდენტობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა მცხეთა-მთიანეთში – 1800,6; შედარებით მაღალია მაჩვენებლები აჭარაში – 1731,9 და იმერეთში – 1500,6. ინციდენტობის დაბალი მაჩვენებელი აღირიცხა ქვემო ქართლში – 887,0 (ცხრილი 4.90, 4.91).

შარდ-სასქესო სისტემის რეგისტრირებულ დაავადებათა სტრუქტურა შემდეგნაირია: თირკმლის და შარდსაწვეთის კენჭები – 10,7%; სალპინგიტი და ოოფორიტი – 9,3%; მენსტრუალური ციკლის დარღვევა – 8,1%; საშვილოსნოს ყელის ეროზია და ექტროპიონი – 7,6%; გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზი – 7,2% (ცხრილი 4.89, სურათი 4.30).

2009 წელს საქართველოში შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებათა 7,1% რეგისტრირებულია ბავშვებში (ცხრილი 4.88).

რეგიონების მიხედვით ბავშვებში პრევალენტობის მაჩვენებელი მაღალია: აჭარაში – 1633,2; გურიაში – 1571,4; შიდა ქართლში – 1535,1; თბილისში – 1254,2. ბავშვებში რეგისტრირებულია საერთო რიცხვიდან სიცოცხლეში პირველად

დაუდგინდა დიაგნოზი 77,1%-ს. ინციდენტობის მაჩვენებელი რეგიონების მიხედვით მაღალია: გურიაში - 1458,0; შიდა ქართლში - 1309,3; აჭარაში - 1287,7 (ცხრილი 4.91).



ბავშვებში შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებათა სტრუქტურაში მაღალია შემდეგი დაავადებების პროცენტი: ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი (თირკმლის ინფექციები) - 12,6%; გლომერულონეფრიტი, ნეფროზული სინდრომი და ნეფროზი - 11,6% (ცხრილი 4.89, 4.93).

2009 წელს საქართველოს სტაციონარებში შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების დიაგნოზით მკურნალობდა და გავიდა 12184 ავადმყოფი, მათ შორის გარდაიცვალა 114 (ლეტალობა - 0,9). გასულ ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან 921 ბავშვია, მათ შორის 0-1 წლამდე ასაკის - 105 ბავშვი. 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში აღირიცხა გარდაცვალების 4 შემთხვევა (ლეტალობა - 0,4) (ცხრილი 4.94).


სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების დაავადებათა სტრუქტურაში 13,9% - წინამდებარე ჯირკვლის დაავადებები, 7,2% - თირკმლისა და შარდსაწვეთების კენჭები, 5,7% - ნეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზი, 3,6% - თირკმლის ინფექციები. სტაციონარიდან გასულ ბავშვთა 13,1%-ს შეადგენდნენ ავადმყოფები ნეფრიტით, ნეფრიტული სინდრომითა და ნეფროზით, 10,5% - თირკმლის ინფექციებით (ცხრილი 4.95).

2009 წელს საქართველოს სტაციონარებში შარდ-სასქესო სისტემის ორგანოებზე ჩატარებულია 53743 ოპერაცია, მათ შორის 686 - ბავშვებში (ლეტალობა - 0,1).

2421 ოპერაცია ჩატარებულია თირკმლებსა და შარდსაწვეთებზე (მათ შორის ბავშვებში - 136). ოპერაციის შედეგად გარდაიცვალა 11

ავადმყოფი (ლეტალობა - 0,5). წინამდებარე ჯირკვალზე ჩატარებულია 1275 ოპერაცია (მათ შორის ბავშვებში - 12). ოპერაციის შედეგად გარდაიცვალა 5 ავადმყოფი (ლეტალობა - 0,4). ჩატარებულია თირკმლის გადანერგვის 9 ოპერაცია (ლეტალობა - 11,1%). ქალის სასქესო ორგანოებზე ჩატარებულია 9722 ოპერაცია (მათ შორის ბავშვებში - 8). ოპერაციის შედეგად გარდაიცვალა 8 ქალი (ლეტალობა - 0,1). ქალის სასქესო ორგანოებზე ჩატარებული ოპერაციების საერთო რიცხვიდან 2395 (24,6%) - საშიფლოსნოს გამოფხეკა და 192 (0,9%) - სტერილიზაცია იყო (ცხრილი 4.96).

2009 წელს საქართველოში რეგისტრირებულია ტრავმების, მოწამელების და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგების 44673 შემთხვევა (პრევალენტობა - 1012,8), მათ შორის აღირიცხა 42147 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა - 955,5) (ცხრილი 4.97, 4.99, სურათი 4.31).





ტრავმების, მოწამელების და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგების ახალი შემთხვევების რაოდენობაში დაავადებების თითქმის ნახევარს, როგორც მთლიან მოსახლეობაში, ასევე ბავშვებში ჭრილობები, სისხლძარღვთა დაზიანებები, ზედაპირული ტრავმები, დაუქვილობები და დაჩეხილობები შეადგენს (ინციდენტობა - 475,5).

საანგარიშო წელს აღირიცხა 1065 თერმული და ქიმიური დამწვრობა (ინციდენტობა - 24,1), მათ შორის 331 ბავშვებში (ინციდენტობა - 44,0) (ცხრილი 4.98, სურათი 4.32, 4.33).

ინციდენტობის მაღალი მაჩვენებელი აღირიცხა სამეგრელოში - 2286,4, რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში - 1645,7, გურიაში - 1194,5 და აჭარაში - 1159,9.

ტრავმების, მოწამელების და გარეგანი მიზეზების დიაგნოზით სტაციონარიდან

გასულია 21636 ავადმყოფი (ლეტალობა - 2,7%), მ.შ. 2287 ბავშვი (ლეტალობა - 1%) (ცხრილი 4.101, 4.102).





2009 წელს, საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, ტრავმებით, მოწამვლებით და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგებით გარდაიცვალა 1621 ადამიანი, მათ შორის 1289 მამაკაცი და 332 ქალი. **აერთსაზო შეთხვევების** შედეგად გარდაიცვალა 337 ადამიანი.

2009 წელს საქართველოს ამბულატორულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში რეგისტრირებულია **სისხლის და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებების** 25064 შემთხვევა (პრევალენტობა - 568,2), მათ შორის 12414 - ბავშვებში (პრევალენტობა - 1648,8).

სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხულია 17653 შემთხვევა (ინციდენტობა - 400,2), მათ შორის 10285 - ბავშვებში (ინციდენტობა - 1366,1) (ცხრილი 4.103, სურათი 4.34, 4.35).

2009 წელს სისხლისა და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებების პრევალენტობის მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა გურიაში - 1285,7. პრევალენტობის დაბალი მაჩვენებელი აღირიცხა თბილისში - 287,1 (ცხრილი 4.106).



რეგისტრირებულ ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან 70,4%-ს სიცოცხლეში პირველად დაუდგინდათ დიაგნოზი (2008 წელს - 59,7%). ინციდენტობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აღინიშნა გურიაში - 1105,5. ინციდენტობის დაბალი მაჩვენებელი აღირიცხა თბილისში - 163,3.

ბავშვებში სისხლისა და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებების დიაგნოზით რეგისტრირებულ შემთხვევათა 82,8%-ში დიაგნოზი სიცოცხლეში პირველად იყო დადგენილი. პრევალენტობის და ინციდენტობის მაჩვენებელი მაღალია გურიაში იმერეთში და აჭარაში (ცხრილი 4.105).




2009 წელს საქართველოს სტაციონარებში სისხლისა და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებების დიაგნოზით მკურნალობდა და გავიდა 1028 ავადმყოფი, მათ შორის გარდაიცვალა 23 (ლეტალობა - 2,2). გასულ ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან 349 ბავშვია. 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში ლეტალობამ 1,1 შეადგინა (ცხრილი 4.106).

2009 წელს საქართველოში **ანემიების** დიაგნოზით რეგისტრირებულია 21914 ავადმყოფი - სისხლისა და სისხლმზადი ორგანოების დაავადებების რეგისტრირებულ შემთხვევათა 87,4% (პრევალენტობა - 496,8),

მათ შორის 11449 ბავშვი (პრევალენტობა – 1520,7) (სურათი 4.36, 4.37). ბავშვებზე ანემიების რეგისტრირებულ შემთხვევათა 52,2% მოდის (ცხრილი 4.107, 4.108).


პირველად დადგენილი ანემიების დიაგნოზით აღრიცხულია 16012 ავადმყოფი (ინციდენტობა – 363,0), მათ შორის 9666 ბავშვი (ინციდენტობა – 1283,8) (ცხრილი 4.108).

ანემიების მაღალი პრევალენტობა და ინციდენტობა აღირიცხა გურიაში (შესაბამისად, 1285,7 და 1097,6) (ცხრილი 4.109, სურათი 4.38).




2009 წელს საქართველოში **საჭმლის მომწოდებელი სისტემის** დიაგნოზით რეგისტრირებულია 280680 ავადმყოფი (პრევალენტობა – 6363,3), სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხულია 166087 ავადმყოფი (ინციდენტობა - 3765,4) (ცხრილი 4.110). საჭმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებების დიაგნოზით რეგისტრირებული შემთხვევიდან 25164 ბავშვებშია აღრიცხული (პრევალენტობა – 3342,3); მათ შორის 19030 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა – 2527,6).

რეგისტრირებულ საჭმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებათა სტრუქტურაში პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლის და ყბების ავადმყოფობების წილი 45,1%-ს, საელაავის, კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის დაავადებები 22,3%-ს, ნაღვლის ბუშტის, ნაღვლის გზებისა და პანკრეასის დაზიანებები 20,8%-ს შეადგენს (ცხრილი 4.111, სურათი 4.39).



ახალი შემთხვევების სტრუქტურაში 64,1% პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლების და ყბების ავადმყოფობებზე მოდის (ცხრილი 4.112, სურათი 4.40).



2008 წელთან შედარებით ინციდენტობის მაჩვენებლები გაზრდილია: იმერეთში (1063,0-


დან 3321,6-მდე), აჭარაში (647,5-დან 1927,5-მდე), გურიაში (632,6-დან 1786,8-მდე). 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში ამ მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი ზრდა აღინიშნება გურიაში (1427,4-დან – 3340,3-მდე) და კახეთში (957,5-დან – 2173,0-მდე) (ცხრილი 4.113).

2009 წელს საქართველოს სტაციონარებში საჭმლის მომწელებელი სისტემის დაავადებების დიაგნოზით მკურნალობდა და გავიდა 30694 ავადმყოფი (ლეტალობა - 1,8%), მათ შორის 4207 ბავშვი (ლეტალობა - 0,1%) (ცხრილი 4.114).

პოსპიტალური ლეტალობის სტრუქტურაში ფატალურ შემთხვევათა 24% ღვიძლის ავადმყოფობებზე მოდის. ბავშვებში ამ ჯგუფის ავადმყოფობები ლეტალობის ერთადერთი მიზეზია (ცხრილი 4.114).

ავადმყოფთა საერთო რაოდენობიდან უმრავლესობა (40,9%) მკურნალობდა თბილისის სტაციონარებში, იმერეთში – 15%, ქვემო ქართლში – 9,8%; მაღალია ლეტალობის მაჩვენებლები თბილისში – 2,2%, გურიაში – 2,1%, მცხეთა-მთიანეთში – 2,1% (ცხრილი 4.115).

2006 წელს დაავადებათა საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაციის მე-X გადახედვაზე გადასვლასთან დაკავშირებით **ნერვული სისტემის და გრძნობათა ორგანოების** დაავადებების კლასს გამოეყო გრძნობათა ორგანოების დაავადებები და ამ კლასში აღრიცხულ ნოზოლოგიათა ჩამონათვალიც შეიცვალა, რამაც შეუძლებელი გახდა 2006 წლამდე არსებული მონაცემების შედარება შემდგომი წლების მონაცემებთან (სურათი 4.41).




2009 წელს საქართველოში რეგისტრირებულია **ნერვული სისტემის დაავადებების** 121061 შემთხვევა (პრევალენტობა – 2744,6), მათ შორის 45489 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა – 1031,3). ახალ შემთხვევათა რაოდენობამ ბოლო

წლებში მკვეთრად მოიმატა როგორც მთლიან მოსახლეობაში, ისე ბავშვებში (ცხრილი 4.116).

ინციდენტობის და პრევალენტობის მაჩვენებელთა ზრდა აღინიშნება საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში. შიდა ქართლში ინციდენტობის მაჩვენებელი თითქმის სამჯერ არის გაზრდილი, ორჯერ გაიზარდა ინციდენტობის მაჩვენებელი მცხეთა-მთიანეთში (ცხრილი 4.117, 4.118).

ცერებრული დამბლის და სხვა პარალიზური სინდრომების დიაგნოზით 2009 წელს საქართველოში რეგისტრირებულია 5738 შემთხვევა (პრევალენტობის მაჩვენებელი - 130,1), მათ შორის სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით 1720 შემთხვევა (ინციდენტობის მაჩვენებელი – 39,0). რეგისტრირებულ შემთხვევათა 32,6% (1873 შემთხვევა, პრევალენტობა 248,8) ბავშვებზე მოდის (ცხრილი 4.119, 4.120).

ეპილეფსიის და ეპილეფსიის სტატუსის დიაგნოზით რეგისტრირებულია 8928 ავადმყოფი (პრევალენტობა – 202,4), მათ შორის 1450 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა – 32,9). შემთხვევათა 25,0% ბავშვებშია რეგისტრირებული (ცხრილი 4.119, 4.120, სურათი 4.42).



2009 წელს ნერვული სისტემის დაავადებების დიაგნოზით საქართველოს სტაციონარებიდან გავიდა 5486 ავადმყოფი, მათ შორის გარდაიცვალა 263 (ლეტალობა – 4,8%). სტაციონარებიდან გასული 1539 ბავშვიდან გარდაიცვალა 23, ლეტალობა – 1,5%.

ბავშვთა ცერებრული დამბლის დიაგნოზით საქართველოს სტაციონარებში მკურნალობდა და გავიდა 137 პაციენტი, მათ შორის ერთ წლამდე ასაკის – 41. 3 ბავშვი გარდაიცვალა (ლეტალობა - 2,2%), მათ შორის 1 ბავშვი ერთ წლამდე ასაკის (ცხრილი 4.121, 4.122, 4.123, 4.124).

2009 წელს ნერგული სისტემის ორგანოებზე ჩატარდა 3450 ოპერაცია. ლეტალობა - 2,7%, მათ შორის თავის ტვინზე გაკეთდა 1101 ოპერაცია (31,9%), ლეტალობა - 6,6%. თავის ტვინზე ოპერაციების 82,2% გაკეთდა თბილისში, 8,7% - იმერეთში, 3,3% - აჭარაში, 2,9% - შიდა ქართლში (ცხრილი 4.125, 4.126).

2009 წელს საქართველოში **თვალის და მისი დანამატების დაავადებების** პრევალენტობის და ინციდენტობის მაჩვენებლები, 2008 წელთან შედარებით, მომატებულია. ახალი შემთხვევების 21,8% (10415) ბავშვებშია აღრიცხული (ცხრილი 4.127, 4.128, 4.129).

2008 წელთან შედარებით, გურიაში თვალის და მისი დანამატების დაავადებათა ინციდენტობის მაჩვენებელი თითქმის სამჯერ არის მომატებული, როგორც მთლიან მოსახლეობაში, ისე ბავშვებში (ცხრილი 4.130, 4.131).

თვალის და მისი დანამატების დაავადებების ავადობის მაჩვენებლების ზრდასთან ერთად, აღინიშნა პოსპიტალიზაციის შემთხვევათა 14,4%-ით კლება (ცხრილი 4.132).

საანგარიშო წელს ოფთალმოლოგიური პროფილის საწოლების რაოდენობა 114 იყო, რაც წინა წელთან შედარებით, 38,0%-ით ნაკლებია. საწოლის დატვირთვამ შეადგინა 86,8 დღე, დაყოვნება - 3,0, ბრუნვა - 29,1 (ცხრილი 4.133).

თვალზე და მის დანამატებზე სტაციონარებში ჩატარებულია 5124 ოპერაცია, რაც 2008 წელთან შედარებით 10,8%-ით ნაკლებია. ჩატარებული ოპერაციების საერთო რაოდენობაში ყველაზე მაღალია **კატარაქტის** გამო ჩატარებული ოპერაციების წილი - 54,7%. კატარაქტის გამო ჩატარებული ოპერაციებიდან 23,6% გაკეთდა თბილისში, 34,1% - იმერეთში; 17,0% - აჭარაში. **გლაუკომის** გამო ჩატარებული 594 ოპერაციიდან 28,4% ჩატარდა თბილისში (ცხრილი 4.134, 4.135).

2009 წელს თვალზე და მის დანამატებზე ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ჩატარებულია 6751 ოპერაცია, აქედან მიკროქირურგიული - 3162 (46,8%), კატარაქტის გამო - 4123 (61,1%), გლაუკომის გამო - 730 (10,8%) (ცხრილი 4.134, 4.135).

2009 წელს აღინიშნა **ყურის და დერილისებრი მორჩის დაავადებათა** პრევალენტობის და ინციდენტობის მაჩვენებლების ზრდა როგორც მთლიან მოსახლეობაში, ისე ბავშვებში (ცხრილი 4.137, 4.138, 4.139).

2009 წელს საქართველოში ყურის და დერილისებრი მორჩის დაავადებებით რეგისტრირებულია 42031 შემთხვევა (პრევალენტობა 952,9), მათ შორის 28289 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა 641,3). ბავშვებში რეგისტრირებულია ყურის და დერილისებრი მორჩის დაავადებების 13682 შემთხვევა (პრევალენტობა 1817,2), მათ შორის 11621 ახალი შემთხვევა (ინციდენტობა 1543,5).

რეგიონების მიხედვით ყურის და დერილისებრი მორჩის დაავადებების პრევალენტობის მაჩვენებლის მეექვსე მატემა აღინიშნა აჭარაში. ინციდენტობის მაჩვენებლები მომატებულია საქართველოს უმეტეს რეგიონებში. ბავშვებში ინციდენტობა გაზრდილია სამცხე-ჯავახეთში 7,2-ჯერ, აჭარაში - 4,7-ჯერ, შიდა ქართლში - 3,9-ჯერ, იმერეთში - 2-ჯერ (ცხრილი 4.140, 4.141).

2009 წელს საქართველოში სტაციონარიდან გავიდა 753 ავადმყოფი, აქედან 160 (21,2%) ბავშვი. სტაციონარში ყურზე ჩატარებულია 308 ოპერაცია, აქედან 3 - ბავშვებში. ოპერაციები ძირითადად - 68,2% - გაკეთებულია თბილისში (ცხრილი 4.142, 4.143, 4.144).

ცხრილი 4.1 ინფემციური და პარაზიტული დაავადებების ინციდენტობა, საქართველო, 1988 – 2009				
	სულ		ბავშვები 0-15 წლამდე	
	რაოდენობა	ინციდენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა
1988	58290	1080,0	22656	1771,7
1990	69497	1281,2	28196	2203,5
1995	18770	391,5	8386	842,7
1996	34275	733,2	18799	1982,4
2000	29353	664,4	15320	1640,1
2001	41887	955,1	22595	2456,0
2002	44173	1013,8	23156	2571,2
2003	43410	1002,8	19267	2855,5
2004	55577	1271,3	32580	3557,0
2005	53999	1235,2	31311	3418,4
2006	44882	1020,5	22194	2793,5
2007	50829	1158,3	25121	3274,4
2008	47124	1075,0	25120	3339,5
2009	63510	1439,8	34583	4593,3

ცხრილი 4.2 ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენცია	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენცია 100000 ბავშვზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენცია	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენცია 100000 ბავშვზე
ლიფთიმერია	7	0,2	2	0,3	3	0,1	0	0,0
ჰიპანანსველა	129	2,9	109	14,5	138	3,1	117	15,5
ფითელა	56	1,3	47	6,2	23	0,5	17	2,3
ფითურა	188	4,3	172	22,9	67	1,5	63	8,4
ყბაყურა	76	1,7	60	8,0	42	0,9	37	4,9
ვირუსული კეპატიტი სულ	5915	134,9	1051	139,7	4644	105,3	399	53,0
ვირუსული კეპატიტი A	888	20,3	511	67,9	389	8,8	176	23,4
ვირუსული კეპატიტი B	1732	39,5	18	2,4	1634	37,0	15	2,0
ვირუსული კეპატიტი C	2117	48,3	6	0,8	1968	44,6	4	0,5
სხვა ვირუსული კეპატიტები	1178	26,9	516	68,6	653	14,8	204	27,1
სხვა ხაღმოწვევები	160	3,6	97	12,9	166	3,8	66	8,8
ჰიგელური	103	2,3	74	9,8	96	2,2	76	10,1
ნაწლავითა სხვა გატეხილი ინფექციები	957	21,8	663	88,1	855	19,4	578	76,8
მათ შორის: ქვინიოზი	747	17,0	508	67,5	626	14,2	439	58,3
ბაქტ. საკვებისმიერი მოწამვლა	1843	42,0	406	54,0	2050	46,5	582	77,3
მათ შორის ბოტულიზმი	43	1,0	8	1,1	12	0,3	1	0,1
ამეზიკა	4	0,1	0	0,0	4	0,1	1	0,1
საპარ. ინფექც. წარმ. ღიაგვები	10987	250,6	7282	968,1	9926	225,0	6572	872,9
ბრუცელური	168	3,8	7	0,9	173	3,9	16	2,1
მენინგოკოკეზია	33	0,7	24	3,2	34	0,8	32	4,2
მენინგიტები სულ	171	3,9	77	10,2	190	4,3	110	14,6
გალარია	8	0,2	1	0,1	1	0,02	0	0,0
ლეიშმანიოზი	171	3,9	133	17,7	169	3,8	138	18,3
ჯ.ს.პ. გვავა ინფექციები	213622	4873,0	147251	19576,0	273468	6199,8	185169	24594,0
ბრუცე	10658	243,1	3781	502,7	36136	819,2	15564	2067,2
ბრუცეზისგარეშე დაავადების კონსტიტუცი. შემთხვევები	7005	159,8	5675	754,4	13656	309,6	10383	1379,1
მდლ/გვავა კონსტიტუცი	6	0,1	6	0,8	12	0,3	12	1,6
ტეტანუსი	4	0,1	1	0,1	3	0,1	0	0,0
ტუბერკულოზი	5	0,1	1	0,1	1	0,02	0	0,0
ჯილეზი	62	1,4	2	0,3	38	0,9	0	0,0
ლეპტოსპირი	20	0,5	2	0,3	16	0,4	0	0,0
ქუნთრუბა	1048	23,9	1032	137,2	489	11,1	469	62,3
ლაიშის დაავადება (კონსტიტუცი)	1	0,02	0	0,0	1	0,02	0	0,0
Q ცხელება	1	0,02	0	0,0	0	0,0	0	0,0
კიდრუმი	7	0,2	0	0,0	6	0,1	0	0,0
გ.ნ.ს.-ის დაუზუსტებელი ვირუსული ინფექციები	4	0,1	2	0,3	17	0,4	10	1,3
ფუნგოზები/სისტემური ვირუსული და ვირუსული კეპ. ინფექციები	1	0,02	0	0,0	2	0,1	0	0,0
ნუტრეციონალი	7550	172,2	6590	876,1	4664	105,7	3978	528,4
ციტოპეგალივირუსული დაავადება	1054	24,0	0	0,0	830	18,8	0	0,0
ინფექციური მონონუკლეოზი	153	3,5	111	14,8	118	2,7	45	6,0
მეინოკოკი	58	1,3	17	2,3	58	1,3	19	2,5
ტრიპანოზი	18	0,4	1	0,1	2	0,1	0	0,0
ასკარიდოზი	6239	142,3	5145	684,0	6680	151,4	5485	728,5
ტრიპანოზი	987	22,5	783	104,1	812	18,4	671	89,1
ნეკროზი	12349	281,7	10823	1438,8	30345	687,9	27676	3675,9

ცხრილი 4.3 ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2009								
	სულ	მათ შორის						
		<1	1-4	5-14	15-19	20-29	30-59	60 +
დიფთერია	3	0	0	0	1	0	0	2
ჰიპანანკველა	138	33	22	62	17	0	4	0
წითელა	23	3	8	6	3	2	1	0
წითურა	67	22	33	8	2	1	1	0
შავაშურა	42	1	14	22	1	2	2	0
პირუსული კეპატიტი სულ	4644	3	33	363	359	1409	2177	300
პირუსული კეპატიტი A	389	0	15	161	85	83	43	2
პირუსული კეპატიტი B	1634	0	0	15	154	848	562	55
პირუსული კეპატიტი C	1968	0	1	3	14	343	1 406	201
სხვა პირუსული კეპატიტები	653	3	17	184	106	135	166	42
სხვა სალმონელოზები	166	19	28	19	10	32	43	15
შიგელოზი	96	16	47	13	2	7	6	5
ნაწლავთა სხვა ბაქტერიული ინფექციები	855	241	284	53	21	42	149	65
მათ შორის: ქვინოლონი	626	170	225	44	17	27	102	41
ბაქტერიული საკვებისმიერი მოგზაურობა	2050	37	237	308	169	307	671	321
მათ შორის ბოტულიზმი	12	0	1	0	1	2	5	3
ამეზიკა	4	1	0	0	0	1	1	1
საპარ. ინფექც. წარმ. დიარეები	9926	1883	3 355	1334	375	794	1461	724
ბრუცელოზი	173	0	9	7	26	34	79	18
მენინგოკოკეზია	34	9	19	4	0	1	1	0
მენინგიტიტი სულ	190	20	34	56	11	19	34	16
მალარია	1	0	0	0	0	1	0	0
ლეიშმანიოზი	169	23	102	13	2	5	23	1
უ.ს.პ. მწვავე ინფექციები	273468	40639	69506	75024	19282	20872	28985	19160
ბრუცელოზი	36136	1521	4510	9533	4924	5992	6569	3 087
ბრუცელოზის დაავადების კონსტიტუცი. შემთხვევები	13656	3349	4765	2269	459	598	1018	1198
მღვ.მწვავე კოლირიტი	12	1	3	8	0	0	0	0
ტეტანუსი	3	0	0	0	0	0	0	3
ტულარემია	1	0	0	0	0	0	1	0
ჯიფტი	38	0	0	0	0	4	27	7
ლეპტოსპიროზი	16	0	0	0	0	6	10	0
ქუნთრუვა	489	10	217	242	8	8	4	0
ლაიშის დაავადება (ბორელიოზი)	1	0	0	0	1	0	0	0
Q ცხელება	0	0	0	0	0	0	0	0
კიდრეოზი	6	0	0	0	0	0	6	0
ც.ნ.ს.-ის დაუზუსტებელი პირუსული ინფექციები	17	2	5	3	2	2	1	2
ფხს სხსრიანებისმიერი პირუსული ცხელებები და პირუს. კმ. ცხელებები	2	0	0	0	0	0	1	1
რუტყვაპილა	4664	203	996	2779	374	239	72	1
ციტომეგალოვირუსული დაავადება	830	0	0	0	94	561	173	2
ინფექციური მონონუკლეოზი	118	0	17	28	9	56	8	0
მეინოკოკოზი	58	0	9	10	7	9	11	12
ტრიქინელეოზი	2	0	0	0	0	1	1	0
ასკარიდოზი	6680	52	1750	3683	524	321	259	91
ტრიქინელეოზი	812	7	258	406	80	21	29	11
ენტერობიოზი	30345	195	8540	18941	1224	652	643	150

ცხრილი 4.4 ინფრასტრუქტურის და კარგად მოწყობილი დასახლებების ინფრასტრუქტურა 100000 მოსახლეზე რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	სულ		მ.შ. ბაზრები		სულ		მ.შ. ბაზრები	
	შემოსავლის რაოდენობა	ინფრასტრუქტურა	შემოსავლის რაოდენობა	ინფრასტრუქტურა	შემოსავლის რაოდენობა	ინფრასტრუქტურა	შემოსავლის რაოდენობა	ინფრასტრუქტურა
აფხაზეთი	1455	--	764	--	1150	--	595	--
აჭარა	3586	940,5	2206	3371,5	6545	1701,8	4042	6152,2
თბილისი	16576	1497,8	7524	3961,9	17765	1551,0	5781	2957,0
კახეთი	2109	525,0	1148	1665,5	4067	1008,9	2787	4050,9
იმერეთი	6835	985,0	4490	3770,9	10722	1538,1	7907	6644,5
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	3074	657,0	1646	2050,1	4326	918,5	2550	3171,6
შიდა ქართლი	2693	860,7	1910	3557,5	4571	1479,3	3027	5743,8
ქვემო ქართლი	5015	993,5	2270	2620,6	6246	1260,0	3407	4027,2
გურია	1636	1178,7	1303	5470,2	2391	1716,4	1889	7937,0
სამცხე – ჯავახეთი	970	466,6	549	1538,7	1933	921,8	1158	3234,6
მცხეთა – მთიანეთი	2161	1829,8	1102	5436,6	1869	1725,8	1146	6194,6
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	391	816,3	185	2250,6	466	976,9	234	2888,9
სსკპ უფროები	623	--	23	--	1459	--	60	--
საქართველო	47124	1075,0	25120	3339,5	63510	1439,8	34583	4593,3

ცხრილი 4.5 კვალი A, ინფრასტრუქტურა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	სულ		მ.შ. ბაზრები		სულ		მ.შ. ბაზრები	
	შემოსავლის რაოდენობა	ინფრასტრუქტურა	შემოსავლის რაოდენობა	ინფრასტრუქტურა 100000 მოსახლეზე	შემოსავლის რაოდენობა	ინფრასტრუქტურა	შემოსავლის რაოდენობა	ინფრასტრუქტურა 100000 მოსახლეზე
აჭარა	319	83,7	178	272,0	69	17,9	40	60,9
თბილისი	222	20,1	108	56,9	81	7,1	22	11,3
კახეთი	114	28,4	87	126,2	36	8,9	22	32,0
იმერეთი	29	4,2	9	7,6	8	1,1	4	3,4
სამეგრელო	63	13,5	34	42,3	68	14,4	24	29,9
შიდა ქართლი	27	8,6	20	37,3	3	1,0	3	5,7
ქვემო ქართლი	83	16,4	62	71,6	53	10,7	41	48,5
გურია	4	2,9	3	12,6	7	5,0	6	25,2
სამცხე-ჯავახეთი	2	1,0	1	2,8	1	0,5	1	2,8
მცხეთა-მთიანეთი	10	8,5	8	39,5	6	5,5	3	16,2
რაჭა-ლეჩხუმი	1	2,1	0	0,0	1	2,1	0	0,0
სსკპ უფროები	14	--	1	--	56	--	10	--
საქართველო	888	20,3	511	67,9	389	8,8	176	23,4

ცხრილი 4.6 კვატრები B, ინციდენტობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009					
	მწვავე ვირუსული კვატრები B	ინციდენტობა	ქრონიკული ვირუსული კვატრები B	ინციდენტობა	ქრონიკული და მწვავე B კვატრების შემთხვევების შეფარდება
აჭარა	25	6,5	273	71,0	10,9
თბილისი	29	2,5	305	26,6	10,5
კახეთი	33	8,2	52	12,9	1,6
იმერეთი	15	2,2	598	85,8	39,9
სამეგრელო	1	0,2	102	21,7	102,0
შიდა ქართლი	8	2,6	49	15,9	6,1
ქვემო ქართლი	10	2,0	33	6,7	3,3
გურია	1	0,7	54	38,8	54,0
სამცხე-ჯავახეთი	1	0,5	23	11,0	23,0
მცხეთა-მთიანეთი	0	0,0	2	1,8	0
რაჭა-ლეჩხუმი	0	0,0	1	2,1	0
საქართველო	126	2,9	1508	34,2	12,0

ცხრილი 4.7 კვატრები C, ინციდენტობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
აჭარა	281	73,7	1	1,5	96	25,0	0	0,0
თბილისი	624	56,4	1	0,5	742	64,8	1	0,5
კახეთი	33	8,2	1	1,5	45	11,2	2	2,9
იმერეთი	733	105,6	1	0,8	732	105,0	0	0,0
სამეგრელო	192	41,0	0	0,0	201	42,7	0	0,0
შიდა ქართლი	79	25,2	1	1,9	19	6,1	0	0,0
ქვემო ქართლი	75	14,9	1	1,2	55	11,1	1	1,2
გურია	41	29,5	0	0,0	38	27,3	0	0,0
სამცხე-ჯავახეთი	4	1,9	0	0,0	2	1,0	0	0,0
მცხეთა-მთიანეთი	16	13,5	0	0,0	14	12,9	0	0,0
რაჭა-ლეჩხუმი	14	29,2	0	0,0	1	2,1	0	0,0
სსპ	25	-	0	-	23	-	0	-
საქართველო	2117	48,3	6	0,8	1968	44,6	4	0,5

ცხრილი 4.8 ნაწლავური ინფექციების სტრუქტურა, საქართველო, 2008 – 2009				
	2008		2009	
	შემთხვევათა რაოდენობა	%	შემთხვევათა რაოდენობა	%
სულ	14054	100	13097	100
	<i>მათ შორის</i>			
სხვა სალმონელოზები	160	1,1	166	1,3
შიგელოზი	103	0,7	96	0,7
ნაწლავითა სხვა ბაქტერიული ინფექციები	957	6,8	855	6,5
ბაქტერიული საკვებისმიერი მოწამავები	1843	13,1	2050	15,7
ამეზიკა	4	0,0	4	0,0
საპარაულო ინფექციური წარმოშობის ღიარები	10987	78,2	9926	75,8

ცხრილი 4.9 საპარაულო ინფექციური წარმოშობის ღიარები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	სულ		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა 100000 ბავშვზე
ატარა	3007	788,6	1944	2971,1	3559	925,4	2390	3637,7
თბილისი	2203	199,1	1465	771,4	1388	121,2	872	446,0
კახეთი	225	56,0	61	88,5	346	85,8	148	215,1
იმერეთი	1923	277,1	1348	1132,1	1332	191,1	926	778,2
სამეგრელო	708	151,3	359	447,1	573	121,7	312	388,1
შიდა ქართლი	930	297,2	622	1158,5	679	219,7	444	842,5
ქვემო ქართლი	1122	222,3	1021	1178,7	1140	230,0	1021	1206,9
გურია	57	41,1	33	138,5	89	63,9	53	222,7
სამცხე-ჯავახეთი	174	83,7	112	313,9	204	97,3	156	435,8
მცხეთა-მთიანეთი	82	69,4	39	192,4	81	74,8	40	216,2
რატა-ლენს უში	152	317,3	44	535,3	111	232,7	26	321,0
სხვა	404	-	234	-	424	-	184	-
საქართველო	10987	250,6	7282	968,1	9926	225,0	6572	872,9

ცხრილი 4.10 ინფექციური და პარაზიტული დაავადებების ღიარებით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009						
	2008			2009		
	სტაციონარიდან გახიდა	მათ შორის ბარდნიცა ლა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გახიდა	მათ შორის ბარდნიცა ლა	ლეტალობა %
ინფექციური და პარაზიტული დაავადებები	18103	194	1,1	16691	171	1,0
	<i>მათ შორის</i>					
ნაწლავური ინფექციები	9018	16	0,2	9065	16	0,2
რესპირატორული ტუბერკულოზი	2098	27	1,3	1723	16	0,9
სეპტიცემია	373	64	17,2	218	55	20,1
ვირუსული კეპატიტი	2039	51	2,5	1493	31	2,0

ცხრილი 4.11 ინფემციური და პარაზიტული დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული 0 - 15 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგიერთი ნოვოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	სტაციონარიდან გავიდა		ლეტალობა %		სტაციონარიდან გავიდა		ლეტალობა %	
	სულ	მათ შორის 0-1 წლამდე	სულ	მათ შორის 0-1 წლამდე	სულ	მათ შორის 0-1 წლამდე	სულ	მათ შორის 0-1 წლამდე
ინფემციური და პარაზიტული დაავადებები	10213	3365	0,6	1,3	9399	3258	0,5	1,2
მათ შორის								
ნაწლავური ინფემციები	6943	2528	0,1	0,3	6408	2419	0,2	0,4
რესპირაციული ტუბერკულოზი	152	6	0,0	0,0	182	4	0,0	0,0
სპატიფეხია	140	86	32,9	40,7	107	72	31,8	38,9
ვირუსული კეპატიტი	328	1	0,0	0,0	119	2	0,0	0,0

ცხრილი 4.12 ინფემციური და პარაზიტული დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2007 - 2009								
	2007		2008		2009			
	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	ლეტალობა %		
ატარა	1818	1,5	1645	1,6	1213	1,2		
თბილისი	7740	1,3	9037	1,5	8610	1,4		
კახეთი	322	0,3	384	0,5	411	0,2		
იმერეთი	3418	1,0	2866	1,0	2645	0,8		
სამგერელო და ზემო სვანეთი	681	1,2	920	0,4	817	0,7		
შიდა ქართლი	520	0,6	707	0,1	689	0,3		
ქვემო ქართლი	943	0,1	847	0	1061	0,1		
გურია	379	0,5	470	0	279	0,0		
სამცხე-ჯავახეთი	757	0	799	0,1	777	0,4		
მცხეთა-მთიანეთი	1	0	0	--	0	0,0		
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	158	0	216	0	47	0,0		
სსპა უფუმეხები	251	0	212	0,5	313	0,0		
საქართველო	16988	1,0	18103	1,1	16862	1,0		

ცხრილი 4.13 ტუბერკულოზის გავრცელება, საქართველო, 1998 - 2009								
	ტუბერკულოზის ყველა ფორმა				ფილტვის ტუბერკულოზი			
	რეგისტრ. შემთხვევები	პრეპარატოზა	ახალი შემთხვევები	ინციდენცია	რეგისტრ. შემთხვევები	პრეპარატოზა	ახალი შემთხვევები	ინციდენცია
1998	8388	162,6	4470	99,2	6288	139,6	2856	55,4
1999	6583	143,0	4515	98,0	4506	162,4	2724	63,0
2000	5941	133,4	4279	96,5	4587	103,0	2989	67,1
2001	5707	128,8	3801	86,4	4603	103,9	2756	62,2
2002	6346	145,2	4220	96,5	5111	116,9	3093	70,8
2003	6208	143,4	4018	92,8	5012	115,8	2929	67,7
2004	6543	149,7	4145	94,8	5318	121,7	3026	69,2
2005	6696	153,2	4290	98,1	5373	122,9	3057	70,3
2006	6294	143,1	4261	96,9	4934	112,2	3030	68,9
2007	6450	147,0	4170	95,0	5104	116,3	2952	67,3
2008	5831	133,0	4153	94,7	4471	102,0	2931	66,9
2009	5993	135,9	4471	101,4	4587	104,0	3175	72,0

ცხრილი 4.14 ტუბერკულოზის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრ. შემთხვევები	პრეპარატ ტოზა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტ ტოზა	რეგისტრ. შემთხვევები	პრეპარატ ტოზა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტ ტოზა
აჭარა	687	180,2	492	129,0	632	164,3	480	124,8
თბილისი	1820	164,5	1372	124,0	1591	138,9	1278	111,6
კახეთი	281	70,0	220	54,8	312	77,4	240	59,5
იმერეთი	574	82,7	400	57,6	589	84,5	451	64,7
სამეგრელო	607	129,7	418	89,3	668	141,8	480	101,9
შიდა ქართლი	283	90,4	194	62,0	297	96,1	218	70,6
ქვემო ქართლი	518	102,6	350	69,3	530	106,9	398	80,3
გურია	142	102,3	115	82,9	147	105,5	109	78,2
სამცხე – ჯავახეთი	146	70,2	97	46,7	148	70,6	105	50,1
მცხეთა – მთიანეთი	106	89,8	86	72,8	108	99,7	76	70,2
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	20	41,8	14	29,2	26	54,5	22	46,1
სსკპ უწყვეტი	647	--	395	--	945	--	614	--
საქართველო	5831	133,0	4153	94,7	5993	135,9	4471	101,4

ცხრილი 4.15 ფილტვის ტუბერკულოზის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008– 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრ. შემთხვევები	პრეპარატ ტოზა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტ ტოზა	რეგისტრ. შემთხვევები	პრეპარატ ტოზა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტ ტოზა
აჭარა	485	127,2	300	78,7	459	119,3	314	81,6
თბილისი	1331	120,3	936	84,6	1196	104,4	911	79,5
კახეთი	223	55,5	165	41,1	226	56,1	161	39,9
იმერეთი	455	65,6	290	41,8	464	66,6	339	48,6
სამეგრელო	467	99,8	289	61,8	531	112,7	353	74,9
შიდა ქართლი	235	75,1	150	47,9	226	73,1	153	49,5
ქვემო ქართლი	369	73,1	226	44,8	376	75,9	255	51,4
გურია	117	84,3	90	64,8	122	87,6	85	61,0
სამცხე – ჯავახეთი	114	54,8	70	33,7	111	52,9	71	33,9
მცხეთა – მთიანეთი	91	77,1	72	61,0	82	75,7	55	50,8
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	16	33,4	10	20,9	17	35,6	13	27,3
სსკპ უწყვეტი	568	--	333	--	777	--	465	--
საქართველო	4471	102,0	2931	66,9	4587	104,0	3175	72,0

ცხრილი 4.16 ფილტვის ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების განაწილება ნახევლის მიხედვით, 2008 – 2009						
	2008			2009		
	მგზ+	მგზ-	მიპროსკოპიის გარეშე	მგზ+	მგზ-	მიპროსკოპიის გარეშე
აჭარა	177	108	15	176	126	12
თბილისი	546	367	23	545	349	17
კახეთი	110	53	2	112	48	1
იმერეთი	209	76	5	235	100	4
სამეგრელო	171	113	5	233	108	12
შიდა ქართლი	96	51	3	101	51	1
ქვემო ქართლი	148	73	5	153	89	13
გურია	45	45	0	45	40	0
სამცხე – ჯავახეთი	29	40	1	34	36	1
მცხეთა – მთიანეთი	49	23	0	39	16	0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	8	2	0	8	5	0
სსკ უწყვეტად	280	50	3	374	90	1
საქართველო	1868	1001	62	2055	1058	62

ცხრილი 4.17 ფილტვარეში ტუბერკულოზის ინციდენტობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009						
	2008			2009		
	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	% ტუბერკულოზის ახალ შემთხვევებთან სამართო რაოდენობიდან	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	% ტუბერკულოზის ახალ შემთხვევებთან სამართო რაოდენობიდან
აჭარა	192	50,4	39,0	166	43,2	34,6
თბილისი	436	39,4	31,8	367	32,0	28,7
კახეთი	55	13,7	25,0	79	19,6	32,9
იმერეთი	110	15,9	27,5	112	16,1	24,8
სამეგრელო	129	27,6	30,9	127	27,0	26,5
შიდა ქართლი	44	14,1	22,7	65	21,0	29,8
ქვემო ქართლი	124	24,6	35,4	143	28,8	35,9
გურია	25	18,0	21,7	24	17,2	22,0
სამცხე – ჯავახეთი	27	13,0	27,8	34	16,2	32,4
მცხეთა – მთიანეთი	14	11,9	16,3	21	19,4	27,6
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	4	8,4	28,6	9	18,9	40,9
სსკ უწყვეტად	62	--	15,7	149	--	24,3
საქართველო	1222	27,9	29,4	1296	29,4	29,0

ცხრილი 4.18 ფილტვარეში ტუბერკულოზის რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა ჯოგირითი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2004 - 2009						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ფილტვარეში ტუბერკულოზის შემთხვევები	1188	1323	1360	1346	1360	1406
გათ შორის						
ტუბერკულოზური მენინგიტი	26	44	28	24	44	32
კვალ-სახსართი ტუბერკულოზი	128	131	138	149	151	122
უროგენიტალური ტუბერკულოზი	81	66	96	115	91	97
ტუბერკულოზური პლევრიტი	534	649	652	649	616	688
ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი	364	397	189	330	320	346
სსკ ორგანოთა ტუბერკულოზი	55	36	257	79	138	121

ცხრილი 4.19 ტუბერკულოზური მენიგოიტი, საქართველო, 2002 - 2009								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა სულ	40	60	42	44	28	24	44	32
მათ შორის ბავშვებში	16	27	26	26	11	9	9	2

ცხრილი 4.20 12 თვის წინ რეგისტრირებული ფილტვის მგზ+ ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების მკურნალობის შედეგები (ჯანმო-ს ინდიკატორების შესაბამისად), საქართველო, 2006 - 2009				
	2006	2007	2008	2009
რეგისტრირებულ შემთხვევათა რაოდენობა	1606	1580	1860	1868
% სამართო რაოდენობიდან				
განკურნება	49,7	63,9	63,2	60,3
დასრულებული მკურნალობა	13,0	11,6	13,9	13,2
უშედეგო მკურნალობა	6,0	6,1	6,2	4,4
გარდაიცვალა	2,6	3,0	2,5	2,8
შეწყვეტილი მკურნალობა	11,6	8,9	8,8	8,8
სხვა დაწყებული შემთხვევები გადის	16,3	5,5	3,1	2,4
შეუფასებელი შემთხვევები	0,7	1,0	2,4	1,6
გადაყვანილია IV კატეგორიაში	--	--	--	6,6

ცხრილი 4.21 აივ/შიდსის გავრცელება, საქართველო, 2001 - 2009									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
რეგისტრირებული შემთხვევების ჯამური რაოდენობა	280	376	474	634	873	1151	1496	1834	2166
მათ შორის									
ახალი შემთხვევები	95	96	98	160	239	278	345	338	332
ინდიკატორები	2,2	2,2	2,3	3,9	5,7	6,3	7,9	7,7	7,7

ცხრილი 4.22 აივ/შიდსით დაავადების ახალ შემთხვევათა განაწილება რისკ-ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009				
რისკ-ჯგუფები	2008		2009	
	შემთხვევათა რაოდენობა	% სამართო რაოდენობიდან	შემთხვევათა რაოდენობა	% სამართო რაოდენობიდან
ს უ ლ	338	100	332	100
მათ შორის				
ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება	189	55,9	188	56,8
სისხლის პრეპარატების რეციპიენტები	0	0	3	0,9
პეტროლუმის უაღრესი კონტაქტები	127	37,6	125	37,8
კომუნალური უაღრესი კონტაქტები	6	1,8	5	1,5
ვერტიკალური გადაცემა	11	3,3	4	1,2
დაუდგენელი	5	1,5	7	1,8

ცხრილი 4.23 აივ/შიდსის ახლად გამოვლენილი შემთხვევების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2002 – 2009								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
აფხაზეთი	0	4	5	1	3	13	32	26
აჭარა	12	14	23	28	42	53	32	35
თბილისი	51	39	72	85	87	105	130	132
პანკისი	1	3	3	10	17	14	11	24
იმერეთი	10	9	17	30	45	61	44	36
სამეგრელო	13	23	21	53	39	59	56	46
შიდა ქართლი	3	1	2	5	8	11	12	12
ქვემო ქართლი	2	3	1	8	18	17	14	12
გურია	4	1	2	11	10	6	4	6
სამცხე - ჯავახეთი	0	0	11	4	6	2	3	3
მცხეთა - მთიანეთი	0	1	1	2	2	4	3	0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	2	2	1	0	0	0
საქართველო	96	98	160	239	278	345	338	332

ცხრილი 4.24 სქესობრივი გზით გადავლენი დაავადებების ახალი შემთხვევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009				
	სიფილისი		ბრუკელსი ინფექცია	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა
აჭარა	48	12,5	93	24,2
თბილისი	367	32,0	334	29,2
პანკისი	11	2,7	74	18,4
იმერეთი	23	3,3	19	2,7
სამეგრელო	25	5,3	44	9,3
შიდა ქართლი	12	3,9	3	1,0
ქვემო ქართლი	13	2,6	64	12,9
გურია	4	2,9	0	0,0
სამცხე - ჯავახეთი	0	0,0	22	10,5
მცხეთა - მთიანეთი	0	0,0	1	0,9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0,0	0	0,0
სსკპ უწყება	0	--	16	--
საქართველო	503	11,4	670	15,2

ცხრილი 4.25 სქესობრივი გზით გადავლენი ზოგიერთი დაავადებების ახალი შემთხვევები, საქართველო, 2007 – 2009						
	2007		2008		2009	
	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა	ინციდენტობა
სიფილისი	381	8,7	346	7,9	503	11,4
ბრუკელსი ინფექცია	720	16,4	684	15,6	670	15,2
ძვანდოვი ინფექცია	712	16,2	709	16,2	1276	28,9
ტრიქომონიასი	3241	73,9	3446	78,5	3925	89,0

ცხრილი 4.26 სქესობრივი გზით გადაადგილი დაავადებების განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2009													
	სქესი	ასაკობრივი ჯგუფები											
		სულ		0 - 14		15 - 19		20 - 29		30 - 39		40 და მეტი	
		შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა
სიფილისი, დაავადების ყველა ფორმა	მ	335	16,0	3	0,8	83	46,8	101	28,6	100	33,2	48	5,5
	ქ	168	7,3	0	0,0	13	7,6	55	15,8	53	16,7	47	4,2
ვირუსული ინფექცია	მ	566	27,0	0	0,0	175	98,7	248	70,3	113	37,5	30	3,5
	ქ	104	4,5	0	0,0	21	12,3	54	15,5	24	7,6	5	0,4
სხვა ვენერიული დაავადებები	მ	170	8,1	2	0,5	41	23,1	89	25,2	34	11,3	4	0,5
	ქ	328	14,2	1	0,3	19	11,1	153	44,0	134	42,3	21	1,9
ძვანადირი ინფექცია	მ	501	23,9	0	0,0	171	96,4	177	50,2	102	33,8	51	5,9
	ქ	775	33,5	0	0,0	175	102,3	409	117,7	171	54,0	20	1,8
ტრეპონემაზი	მ	1349	64,4	7	1,8	297	167,5	627	177,7	313	103,8	105	12,1
	ქ	2576	111,2	10	2,8	367	214,6	1196	344,3	714	225,6	289	25,7

ცხრილი 4.27 მიკოზები, საქართველო, 2007 - 2009						
	2007		2008		2009	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა
მიკოზები სულ	6455	147,1	8050	183,6	9770	221,5
გათ შორის						
ტრეპონემაზი	339	7,7	520	11,9	549	12,4
მიკროსპორია	180	4,1	131	3,0	163	3,7
კანდიდოზი	3632	82,8	5068	115,6	7133	161,7
სხვა მიკოზები	2304	52,5	2331	53,2	1925	43,6

ცხრილი 4.28 აპარიაზი (მუნი), საქართველო, 2003 - 2009		
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა
2003	1705	39,5
2004	2139	48,9
2005	2399	54,9
2006	2056	46,7
2007	1842	42,0
2008	1957	44,6
2009	1832	41,5

ცხრილი 4.29 სისხლის მიმოქცემის სისტემის დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 1988 – 2009								
	სულ				გავრცელება 0-15 წლამდე			
	წლის გოლოს რემონტირება გული შემთხვევები	პრეპალმ- ტობა*	ასალი შემთხვე ვები	ინციდენ- ტობა	წლის გოლოს რემონტირება გული შემთხვევები	პრეპალმ- ტობა*	ასალი შემთხვევ ები	ინციდენ- ტობა
1988	279125	5171,9	36166	670,1	6765	529,0	1521	118,9
1990	265255	4890,0	43438	800,8	6837	534,3	2075	162,2
1995	169075	3526,7	23251	485,0	4299	432,0	894	89,8
1996	113734	2433,1	16523	353,5	2911	307,0	1228	129,5
2000	155373	3503,2	44475	1002,8	3095	328,0	1223	134,5
2001	176678	3987,3	57485	1297,3	3445	380,6	1226	132,6
2002	187827	4296,6	56810	1299,6	3727	406,9	1321	144,2
2003	208472	4768,9	64140	1467,2	4049	442,1	1731	204,7
2004	235429	5385,5	70648	1616,1	5395	638,0	1614	176,2
2005	256981	5892,2	82533	1888,0	5214	634,3	1594	174,0
2006	282701	6427,9	83166	1891,0	5325	670,1	1732	218,0
2007	288964	6584,6	71198	1622,4	5181	675,3	1201	156,5
2008	306573	6993,3	74379	1696,7	5102	678,3	1250	166,2
2009	326421	7400,3	96038	2177,3	4775	634,2	1359	180,5

ცხრილი 4.30 სისხლის მიმოქცემის სისტემის დაავადებების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2003 – 2009							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
პრეპალმენტობა*	4768,9	5385,5	5892,2	6427,9	6584,6	6993,3	7400,3
ინციდენტობა	1481,7	1616,1	1888,0	1891,0	1622,4	1696,7	2177,3
გათ შორის							
გულის რემონტირება დაავადებები პრეპალმენტობა	278,9	282,8	307,2	377,8	351,8	341,7	314,0
ინციდენტობა	68,9	76,0	82,7	100,0	87,4	72,9	76,9
ჰიპერტენზიული დაავადება პრეპალმენტობა	2342,3	2609,6	2962,6	3329,9	3441,4	3719,8	4088,3
ინციდენტობა	686,4	801,9	950,7	917,4	803,5	814,0	1109,4
გულის იშემიური დაავადებები პრეპალმენტობა	1561,2	1637,2	1857,8	1955,7	1868,7	1951,9	1981,8
ინციდენტობა	441,0	449,8	545,7	569,9	427,5	429,8	521,6
ცერებროვასკულური დაავადებები პრეპალმენტობა	186,4	215,3	255,9	261,1	274,0	281,2	316,8
ინციდენტობა	91,3	107,8	111,3	116,9	88,2	101,3	123,9

* პრეპალმენტობა – საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე

ცხრილი 4.31 სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გავრცელება ბავშვებში ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2003 - 2009							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
პრეპალენტობა	442,1	638,0	634,3	670,1	675,3	678,3	634,2
ინციდენტობა	204,7	176,2	174,0	218,0	156,5	166,2	180,5
გათ შორის							
გულის რევმატული დაავადებები	190,9	199,9	231,4	333,7	315,7	308,2	273,1
<i>პრეპალენტობა</i>							
<i>ინციდენტობა</i>	69,7	57,7	82,1	81,4	53,2	51,0	33,3
კიპერტენიული დაავადება	3,7	3,5	4,4	4,9	5,6	6,5	8,0
<i>პრეპალენტობა</i>							
<i>ინციდენტობა</i>	2,2	2,6	3,4	2,4	0,8	1,3	5,7
ცერებროვასკულური დაავადებები	0,1	0,6	2,7	6,9	2,6	1,7	1,6
<i>პრეპალენტობა</i>							
<i>ინციდენტობა</i>	0,1	0,5	0,3	5,5	0,5	1,6	1,1

ცხრილი 4.32 სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009				
	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს	პრეპალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	13868	--	2403	--
აჭარა	15551	4043,4	6268	1629,7
თბილისი	133519	11657,0	17674	1543,0
ქახეთი	30759	7630,6	12297	3050,6
იმერეთი	53591	7687,7	21787	3125,4
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	24591	5221,0	6652	1412,3
შიდა ქართლი	14565	4713,6	7302	2363,1
ქვემო ქართლი	13182	2659,3	6701	1351,8
გურია	4242	3045,2	1233	885,1
სამცხე-ჯავახეთი	7759	3700,0	4001	1908,0
მცხეთა-მთიანეთი	7328	6766,4	4384	4048,0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	6972	14616,4	2431	5096,4
სსკა უწყება	550	--	2905	--
საქართველო	326421	7400,3	96038	2177,3

ცხრილი 4.33 სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების სტრუქტურა, საქართველო, 2009								
	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები				ახალი შემთხვევები			
	სულ		მ.შ. ბავშვებში		სულ		მ.შ. ბავშვებში	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	326421	100	4775	100	96038	100	1359	100
მათ შორის								
მწვავე რევმატული ცხელება	4296	1,3	514	10,8	1441	1,5	178	13,1
გულის ქრონიკული რევმატული დაზიანებები	9553	2,9	1542	32,3	1951	2,0	73	5,4
ჰიპერტენზიული დაავადება	180331	55,2	60	1,3	48934	51,0	43	3,2
გულის იშემიური დაავადებები	87414	26,8	--	--	23009	24,0	--	--
ფილტვისმიერი გული და ფილტვის სისხლის მიმოქცევის მოუღვა	1541	0,5	5	0,1	865	0,9	3	0,2
ცერებროვასკულური დაავადებები	13972	4,3	12	0,3	5467	5,7	8	0,6
არტერიების, არტერიოლების და კაპილარების დაავადებები	5099	1,6	12	0,3	1957	2,0	10	0,7
სისხლის მიმოქცევის სისტემის სხვა დაავადებები	24215	7,4	2630	55,1	12414	12,9	1044	76,8

ცხრილი 4.34 ჰიპერტენზიული დაავადების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009				
	რეგისტრირებულია წლის ბოლოს	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	9398	--	1318	--
აჭარა	9649	2508,8	3509	912,4
თბილისი	59395	5185,5	5949	519,4
პანკისი	18255	4528,7	6545	1623,7
იმერეთი	33046	4740,5	10394	1491,0
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	15078	3201,3	4037	857,1
შიდა ქართლი	9542	3088,0	4713	1525,2
ქვემო ქართლი	9298	1875,7	3350	675,8
გურია	2466	1770,3	654	469,5
სამცხე-ჯავახეთი	4836	2306,2	2366	1128,3
მცხეთა-მთიანეთი	4717	4355,5	2921	2697,1
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	4246	8901,5	1416	2968,6
სხვა უწყვეტა	405	--	1762	--
საქართველო	180331	4088,3	48934	1109,4

ცხრილი 4.35 გულის იშემიური დაავადებების სტრუქტურა, საქართველო, 2009				
	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები		ახალი შემთხვევები	
	რაოდენობა	%	რაოდენობა	%
გულის იშემიური დაავადება	87414	100	23009	100
მათ შორის				
სტენოკარდია	28692	32,8	9166	39,8
მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი	1237	1,4	2074	9,0
გულის სხვა მწვავე იშემიური დაავადება	8161	9,3	3852	16,7
გულის სხვა იშემიური დაავადება	48724	55,7	7917	34,4

ცხრილი 4.36 რეგისტრირებული დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 2009				
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
გულის რეგისტრირებული დაავადებები	19770	448,2	3874	87,8
მწვავე რეგისტრირებული ცხელება	5911	134,0	1441	32,7
მათ შორის მწვავე რეგისტრირებული ცხელება გულის დაზიანებით	1824	41,4	482	10,9
გულის ქრონიკული რეგისტრირებული დაზიანებები	12035	272,8	1951	44,2

ცხრილი 4.37 სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგირითი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2009			
	სულ	მათ შორის ბავშვები	ლეტალობა (%)
სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები	42823	208	6,4
მათ შორის			
მწვავე რეგისტრირებული ცხელება	220	26	1,4
მწვავე რეგისტრირებული ცხელება გულის დაზიანებით	110	22	2,7
გულის ქრონიკული რეგისტრირებული დაზიანებები	427	5	2,6
ჰიპერტენზიული დაავადება	3657	0	0,6
გულის იშემიური ავადმყოფობა	20423	0	4,6
მათ შორის: სტენოკარდია	7320	1	0,4
მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი	5610	0	9,9
მიოკარდიუმის განმეორებითი ინფარქტი	282	0	14,2
გულის სხვა მწვავე იშემიური დაავადება	2921	0	7,1
გულის ქრონიკული იშემიური დაავადება	4290	0	2,5
ფილტვისმიერი გული და სისხლის მიმოქცევის მცირე წრის დარღვევები	237	1	37,1
ემბოლიზაციური დაავადებები	6581	9	17,9
სუპრარენალიული სისხლწვევა	1070	3	22,9
სხვა ინტრამემბრული და ინტრაპერინალური სისხლწვევები	1456	6	23,6
თავის ტვინის ინფარქტი	1431	0	11,7
ინსულტი, ემბოლიური არტერიების ოკლუზია და სტენოზი და ემბოლიური დაზიანებები	124	0	3,2
სხვა ემბოლიური დაავადებები	151	0	6,0

ცხრილი 4.38 სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009			
	გასულ ავადმყოფთა რაოდენობა	მ.შ. გარდაცვლილ ავადმყოფთა რაოდენობა	ლეტალობა (%)
აფხაზეთი	168	7	4,2
აჭარა	3350	220	6,6
თბილისი	21245	1383	6,5
კახეთი	2424	179	7,4
იმერეთი	6367	397	6,2
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	3557	77	2,2
შიდა ქართლი	1392	110	7,9
ქვემო ქართლი	1838	126	6,9
გურია	623	69	11,1
სამცხე - ჯავახეთი	671	74	11,0
მცხეთა - მთიანეთი	676	65	9,6
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	270	18	6,7
სხვა უწყვეტი	242	11	4,5

საქართველო	42823	2736	6,4
------------	-------	------	-----

ცხრილი 4.39 ძირუბიული ოპერაციები სისხლის მიმოქცევის სისტემის ორგანოებზე, საქართველო, 2006 – 2009								
	2006		2007		2008		2009	
	სულ	ლიტალი ბა (%)	სულ	ლიტალი ბა (%)	სულ	ლიტალი ბა (%)	სულ	ლიტალი ბა (%)
ოპერაციები გულზე	1308	2,2	831	3,6	1253	4,6	1373	3,5
<i>გათ შორის</i>								
ღია გულზე	230	4,3	428	4,2	732	5,2	788	5,2
თანდამოვლილი მანქანის გარე	188	8,0	51	17,6	65	9,2	162	2,5
კარდოსტიოვულატორის იმპლანტაცია	180	0,5	183	1,1	250	0,8	112	0,9
ენდოვასკულური ბალონური დილატაცია	614	0,3	145	0	195	1,0	187	0
ოპერაციები სისხლძარღვებზე	1690	0,8	2466	1,3	3207	0,3	3957	0,5
<i>გათ შორის</i>								
არტერიები	334	1,5	437	0,9	315	0,6	732	1,9
ვენები	557	0,3	595	0	951	0,1	1678	0,1
ლიმფური სისტემები	11	0	23	4,3	76	0	24	0
ენდოვასკულური	450	0	811	1,6	1449	0,3	1216	0,2

ცხრილი 4.40 სიმსივნეების გავრცელება, საქართველო, 1988 – 2009								
	სულ				გავრცელება 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენცია	ახალი შემთხვევები	იგივე-ტოპია	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენცია	ახალი შემთხვევები	იგივე-ტოპია
1988	32183	596,3	7453	138,1	498	38,9	73	5,7
1990	31563	581,9	6994	128,9	236	18,4	107	8,4
1995	24598	513,1	3230	67,4	107	10,8	50	5,0
1996	25945	555,0	3576	76,5	81	8,5	29	3,1
2000	30452	684,0	5658	128,1	194	21,2	68	7,4
2001	34124	775,3	6927	157,4	222	24,2	93	10,2
2002	36686	839,2	7092	162,2	267	29,1	110	12,0
2003	37852	874,4	7117	164,4	263	28,7	123	13,4
2004	40902	935,6	8347	190,9	340	37,1	147	16,0
2005	43338	991,4	8364	191,3	405	51,2	166	21,0
2006	46365	1054,2	9186	208,9	442	56,7	132	16,9
2007	46455	1058,6	7445	169,7	433	56,4	111	14,5
2008	47580	1085,4	7886	179,9	387	51,4	148	19,7
2009	59000	1337,6	13001	294,7	315	41,8	156	20,7

ცხრილი 4.41 ავთვისებიანი სიმსივნეების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009

	წლის ბოლოსთვის	პრევალენტობა*	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	279	--	69	--
აჭარა	3727	969,1	570	148,2
თბილისი	6630	578,8	1277	111,5
ქვემო	4313	1070,0	632	156,8
იმერეთი	4776	685,1	913	131,0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	2324	493,4	627	133,1
შიდა ქართლი	3869	1252,1	426	137,9
ქვემო ქართლი	2107	425,1	441	89,0
გურია	961	689,9	199	142,9
სამცხე - ჯავახეთი	1029	490,7	240	114,4
მცხეთა - მთიანეთი	666	615,0	159	146,8
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	273	572,3	103	215,9
საქართველო	30954	701,8	5656	128,2

ცხრილი 4.42 ავთვისებიანი სიმსივნეების ინციდენტობა ლოკალიზაციის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009

ლოკალიზაცია	2008		2009	
	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა	შემთხვევების რაოდენობა	ინციდენტობა
სულ	5662	129,2	5656	128,2
მამაკაცი	2781	133,7	2694	128,6
ქალი	2881	124,9	2962	127,9
საშლასავი				
მამაკაცი	23	1,1	27	1,3
ქალი	9	0,4	9	0,4
კუჭი				
მამაკაცი	267	12,8	227	10,8
ქალი	149	6,5	161	7,0
სფორი ნაწლავი				
მამაკაცი	137	6,6	123	5,9
ქალი	111	4,8	108	4,7
ხორცი				
მამაკაცი	186	8,9	161	7,7
ქალი	11	0,5	12	0,5
ტრანკა, ბრინჯები, ვიტამინი				
მამაკაცი	661	31,8	663	31,6
ქალი	86	3,7	121	5,2
სარკვე ჯირკვლი				
ქალი	1006	43,7	1023	44,2
საშვილუნოს ყელი	267	11,6	281	12,1
ფინამგვარე ჯირკვლი	205	9,9	222	10,6
ლივფილური, სისხლმგვარი და მონათესავე ქსოვილები				
მამაკაცი	130	6,3	125	6,0
ქალი	115	5,0	114	4,9

* პრევალენტობა - საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ აკადემიკოსთა რაოდენობა 100000 მოსახლეზე

ცხრილი 4.43 ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების სტრუქტურა ლოკალიზაციის და სქემის მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
ლოკალიზაცია	2008				2009			
	ძალი		მაჰაპაცი		ძალი		მაჰაპაცი	
	ახალი შემთხვევები	% საერთო რაოდენობიდან	ახალი შემთხვევები	% საერთო რაოდენობიდან	ახალი შემთხვევები	% საერთო რაოდენობიდან	ახალი შემთხვევები	% საერთო რაოდენობიდან
სულ	2881	100	2781	100	2962	100	2694	100
მათ შორის								
ტუჩი, პირის ღრუს ორგანოები და სანა	40	1,4	117	4,2	38	1,3	114	4,2
საჭმლის მომნელობელი ორგანოები	530	18,4	742	26,7	554	18,7	716	26,6
სუნთქვის და გულმკერდის ორგანოები	106	3,7	862	31,0	145	4,9	853	31,7
კვლევი და სასახსრე სრტილები	29	1,0	51	1,8	34	1,1	58	2,2
კანი	108	3,7	120	4,3	122	4,1	121	4,5
მეფრთხილუმი და რბილი ქსოვილები	35	1,2	32	1,2	33	1,1	39	1,4
სარკვე ჯირკვლი	1006	34,9	9	0,3	1023	34,5	6	0,2
სასქსო ორგანოები	685	23,8	291	10,5	665	22,5	290	10,8
საშარღე სისტემა	64	2,2	239	8,6	54	1,8	181	6,7
თვლი, თავის ტვინი და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილები	54	1,9	80	2,9	64	2,2	84	3,1
ფარისებრი და სხვა ენდოკრინული ჯირკვლები	35	1,2	13	0,5	45	1,5	13	0,5
ლიმფური, სისხლგვარი და მონათესავე ქსოვილები	115	4,0	95	3,4	71	2,4	94	3,5
არაზუსტად აღნიშნული, მერადი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაცია	70	2,4	130	4,7	114	3,8	125	4,6

ცხრილი 4.44 ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2006 – 2009					
	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2006	4,7	25,7	22,0	43,3	4,3
2007	4,1	21,5	23,2	45,1	6,0
2008	6,0	21,5	23,2	45,1	4,1
2009	4,8	17,6	23,9	48,0	5,7

ცხრილი 4.45 სარკვე ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2006 – 2009					
	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2006	7,8	42,0	23,5	25,8	1,0
2007	5,7	39,6	25,2	26,8	4,0
2008	7,4	39,7	25,4	24,0	3,4
2009	7,1	32,0	29,3	28,5	3,2

ცხრილი 4.46 საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნეების ახალი შემთხვევების განაწილება სტადიების მიხედვით (%), საქართველო, 2006 – 2009					
	I სტადია	II სტადია	III სტადია	IV სტადია	უცნობი
2006	11,0	38,8	23,2	24,8	2,2
2007	11,5	34,5	27,3	24,2	2,5
2008	12,4	36,0	22,1	25,1	4,5
2009	10,7	25,3	29,5	30,6	3,9

ცხრილი 4.47 სარკვევ ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეები, საქართველო, 2002 – 2009								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	1040	1007	1116	1156	1211	952	1015	1023
<i>ინციდენტობა 100000 ქალზე</i>	44,6	43,8	47,8	49,4	51,5	40,9	43,7	44,2
წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	7230	7614	7892	8174	8393	8448	8655	9019
<i>პრეპლენტობა წლის ბოლოს 100000 ქალზე</i>	313,0	329,6	341,7	353,9	363,4	366,0	375,3	389,4
ბარდაცვლილთა რაოდენობა	682	626	719	677	595	602	617	628
<i>სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ქალზე</i>	29,5	27,1	31,1	29,3	25,8	26,1	26,8	27,1
<i>ბარდაცვლილ ქალთა % წლის განმავლობაში რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობიდან</i>	7,3	7,6	8,2	7,5	6,3	6,4	6,5	6,4
საანგარიშო წინა წელს პირველად აღრიცხულთა დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელიწადში გარდაიცვალა	230	251	227	194	256	220	186	224
<i>პირველად აღრიცხულთა დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელიწადში გარდაიცვალის %</i>	23,2	24,1	22,5	17,4	22,1	18,2	19,5	21,9

ცხრილი 4.48 საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნეები, საქართველო, 2002 – 2009								
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ახალი შემთხვევების რაოდენობა	259	285	308	334	327	252	267	281
<i>ინციდენტობა 100000 ქალზე</i>	11,2	12,5	13,3	14,5	14,1	10,9	11,6	12,1
წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	2193	2306	2388	2374	2378	2372	2398	2464
<i>პრეპლენტობა წლის ბოლოს 100000 ქალზე</i>	96,2	100,7	104,6	103,2	102,7	102,7	104,1	106,4
ბარდაცვლილთა რაოდენობა	223	197	201	249	215	197	203	230
<i>სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100000 ქალზე</i>	9,7	8,5	8,8	10,8	9,3	8,5	8,8	9,9
<i>ბარდაცვლილ ქალთა % წლის განმავლობაში რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობიდან</i>	9,1	7,8	7,7	9,2	8,0	7,5	7,7	8,4
საანგარიშო წინა წელს პირველად აღრიცხულთა დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელიწადში გარდაიცვალა	81	80	74	94	91	84	71	86
<i>პირველად აღრიცხულთა დიაგნოზის დადგენიდან 1 წელიწადში გარდაიცვალის %</i>	31,9	30,9	26,0	30,5	27,2	25,7	28,2	30,6

ცხრილი 4.49 საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნეები, ახალი შემთხვევების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 1999 – 2009											
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
აფხაზეთი	--	5	2	2	5	4	6	5	2	4	6
აჭარა	8	11	18	14	26	25	27	24	17	19	25
თბილისი	54	45	68	80	74	70	70	81	71	72	56
კახეთი	26	14	23	19	38	31	28	45	23	29	36
იმერეთი	37	30	37	42	34	37	48	42	30	40	34
სამეგრელო	22	17	22	24	15	28	35	35	33	29	36
შიდა ქართლი	17	19	25	27	28	24	36	19	19	18	35
ქვემო ქართლი	25	14	17	18	19	41	39	24	27	31	20
გურია	16	10	8	9	8	12	16	14	9	5	8
სამცხე-ჯავახეთი	11	14	15	13	21	11	14	14	8	9	13
მცხეთა-მთიანეთი	9	4	7	7	10	17	14	19	12	10	8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	4	2	2	2	5	6	1	5	1	1	4
სსკპ უწყვეტი	3	1	5	2	2	2	0	0	0	0	0
საქართველო	232	186	249	259	285	308	334	327	252	267	281

ცხრილი 4.50 საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნეები, ზღვის ბოლოს აღრიცხვაზე გეოგრაფიული ავადმყოფობა რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 1999 – 2009											
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
აფხაზეთი	--	4	--	--	9	8	11	11	10	9	14
აჭარა	122	126	140	142	158	164	141	153	163	169	179
თბილისი	632	622	620	542	568	563	576	559	559	560	555
კახეთი	228	204	239	221	262	266	238	262	256	273	334
იმერეთი	404	409	405	382	375	385	377	392	386	375	373
სამეგრელო	199	180	191	193	179	191	209	211	215	222	195
შიდა ქართლი	209	215	210	214	231	234	257	263	270	277	296
ქვემო ქართლი	181	183	192	200	201	225	240	228	218	233	236
გურია	88	80	77	82	88	109	107	92	90	89	93
სამცხე-ჯავახეთი	97	94	98	106	120	109	102	91	95	98	101
მცხეთა-მთიანეთი	68	68	72	70	74	95	98	101	94	79	69
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	20	14	15	23	25	24	18	15	16	14	19
სსკპ უწყვეტი	17	18	21	18	16	15	0	0	0	0	0
საქართველო	2265	2217	2280	2193	2306	2388	2374	2378	2372	2398	2464

ცხრილი 4.51 საშვილოსნოს ტანის ავთვისებიანი სიმსივნეები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 1999 – 2009

ახალი შემთხვევების რაოდენობა											
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
აფხაზეთი	--	4	--	--	1	1	3	3	3	2	--
აჭარა	7	13	19	12	13	28	31	28	23	19	17
თბილისი	44	54	50	79	68	49	72	69	44	49	40
კახეთი	11	8	9	15	24	15	16	15	14	13	21
იმერეთი	39	25	34	34	31	47	47	61	29	34	29
სამეგრელო	8	15	19	23	28	25	27	32	17	15	10
შიდა ქართლი	8	5	8	25	11	11	17	16	13	15	7
ქვემო ქართლი	9	11	13	13	18	21	13	16	18	14	16
გურია	9	6	5	6	7	8	13	12	9	7	2
სამცხე-ჯავახეთი	3	6	5	5	6	9	9	15	12	6	7
მცხეთა-მთიანეთი	2	4	2	5	5	7	10	12	12	10	9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	2	1	0	4	3	5	3	2	3	9	6
სსკა უწყვეტები	2	4	1	2	4	3	0	0	0	0	0
საქართველო	144	156	165	223	219	229	261	281	197	193	164
წლის ბოლოს აღრიცხვაზე მეოთხე ავადმყოფთა რაოდენობა											
აფხაზეთი	--	4	2	2	3	2	4	7	11	9	9
აჭარა	91	103	106	118	128	150	159	180	193	200	210
თბილისი	438	451	441	455	477	457	483	488	480	471	469
კახეთი	129	128	131	133	151	157	163	168	160	162	197
იმერეთი	189	200	208	197	215	230	250	281	271	265	262
სამეგრელო	98	102	115	124	143	156	176	189	141	150	121
შიდა ქართლი	98	99	100	117	130	134	146	155	163	174	171
ქვემო ქართლი	46	54	61	65	72	83	85	75	81	91	104
გურია	44	44	44	49	51	63	64	50	51	49	48
სამცხე-ჯავახეთი	24	28	31	35	34	40	48	49	54	57	63
მცხეთა-მთიანეთი	38	41	44	41	46	47	52	59	60	59	56
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1	1	1	5	9	18	16	19	20	25	25
სსკა უწყვეტები	6	10	10	10	12	20	0	0	0	0	0
საქართველო	1202	1265	1294	1351	1471	1557	1646	1720	1685	1712	1735

ცხრილი 4.52 სარკვევ ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეები, ახალი შემთხვევების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 1999 – 2009

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
აფხაზეთი	0	13	5	11	8	20	57	11	12	12	8
აჭარა	82	76	78	75	82	79	93	95	94	106	79
თბილისი	238	253	319	360	319	325	394	423	282	312	310
კახეთი	77	66	75	102	91	121	82	87	97	82	112
იმერეთი	155	147	163	159	147	187	178	178	177	182	163
სამეგრელო	69	63	57	85	88	74	85	85	61	71	86
შიდა ქართლი	65	60	64	80	86	107	68	95	69	71	91
ქვემო ქართლი	62	55	59	67	70	91	99	115	76	69	70
გურია	35	29	32	27	29	29	26	36	27	38	18
სამცხე-ჯავახეთი	28	24	45	35	34	36	31	41	25	32	41
მცხეთა-მთიანეთი	15	22	18	17	21	22	24	29	21	25	33
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	13	9	12	16	24	19	19	16	11	15	18
სსკა უწყვეტები	17	2	10	6	8	6	0	0	0	0	0
საქართველო	856	819	937	1040	1007	1116	1156	1211	952	1015	1029

ცხრილი 4.53 სარკმელ ჯირკვლის ავთვისებიანი სიმსივნეები, წლის ბოლოს აღრიცხვამდე გეგმიური ავადმყოფობის რაოდენობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 1999 – 2009											
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
აფხაზეთი	0	13	4	10	16	20	75	78	86	75	74
აჭარა	518	567	608	657	701	737	764	816	850	841	871
თბილისი	2112	2136	2139	2125	2227	2235	2422	2439	2430	2486	2583
კახეთი	769	713	830	890	941	1012	1002	1047	1096	1133	1225
იმერეთი	1095	1146	1187	1161	1196	1264	1317	1377	1396	1407	1442
სამეგრელო	461	417	462	488	529	526	552	583	537	564	575
შიდა ქართლი	571	533	620	663	710	737	737	807	841	892	938
ქვემო ქართლი	969	386	420	442	462	505	545	514	504	532	551
გურია	205	206	206	222	231	272	262	240	238	252	250
სამცხე-ჯავახეთი	185	191	211	223	233	231	230	230	224	224	246
მცხეთა-მთიანეთი	173	179	178	184	200	174	179	185	179	174	182
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	81	48	58	72	80	87	89	77	67	75	82
სსკპ უწყვეტი	91	87	91	93	88	92	0	0	0	0	0
საქართველო	6630	6682	7014	7230	7614	7892	8174	8393	8448	8655	9019

ცხრილი 4.54 ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზის დადგენიდან პირველ წელს გარდაცვლილი ავადმყოფები, საქართველო, 2002 – 2009			
	სიმსივნეები პირველად აღრიცხული ავადმყოფების რაოდენობა	მათ შორის გარდაიცვალა	გარდაცვლილთა % სიმსივნეები პირველად აღრიცხულ ავადმყოფთა რაოდენობიდან
2002	5332	2209	41,4
2003	5251	2125	40,5
2004	5726	2177	38,0
2005	6045	2068	34,2
2006	6200	2306	37,2
2007	5066	2022	39,9
2008	5662	2007	35,4
2009	5656	2024	35,8

ცხრილი 4.55 სუთი ფლის და მუტი ღროის განმავლობაში აღრიცხვაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა სიმსივნის ლოკალიზაციის მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009						
ლოკალიზაცია	2008			2009		
	კონტინენტი ფლის ბოლოს	5 და მუტი ფული აღრიცხვაზე იმყოფება % კონტინენტიდან	5 და მუტი ფული აღრიცხვაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობის %	კონტინენტი ფლის ბოლოს	5 და მუტი ფული აღრიცხვაზე იმყოფება %	5 და მუტი ფული აღრიცხვაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობის %
სულ	29890	12641	42,3	30954	13126	42,4
<i>მათ შორის</i>						
ტუჩი, პირის ღრუს ორგანოები და ხახა	1144	554	48,4	1163	557	47,9
საჭმლის მომნელობელი ორგანოები	3109	833	26,8	3301	872	26,4
სუნთქვის და გულმკერდის ორგანოები	2720	998	36,7	2879	979	34,0
ძვლები და სახასხრე ხრტილები	367	138	37,6	404	136	33,7
კანი	3214	1611	50,1	3106	1516	48,8
მეოთხეული და რბილი ძვლები	364	116	31,9	382	137	35,9
ხარკვე ჯირკვავი	8655	4395	50,8	9019	4742	52,6
ძალის სასქესო ორგანოები	5316	2291	43,1	5465	2336	42,7
გამაკაცის სასქესო ორგანოები	1131	434	38,4	1180	462	39,2
საშარდო სისტემა	1222	382	31,3	1267	426	33,6
თვალი, თაჭის ტვიფი და ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილები	468	86	18,4	505	98	19,4
ვარისებრი და სხვა უმდებრეული ჯირკვლები	355	132	37,2	396	150	37,9
არაუზუსტად აღნიშნული, მორადი და დაუზუსტებელი ლოკალიზაცია	244	29	11,9	254	34	13,4
ლიმფური, სისხლმავალი და მონათესავე ძვლები	1566	642	41,0	1633	681	41,7

ცხრილი 4.56 მონაცემები ავთვისებიანი სიმსივნეებით დაავადებულთა სპეციალური მკურნალობის შესახებ, საქართველო, 2006 – 2009				
	2006	2007	2008	2009
აღრიცხული ავადმყოფები II კლინიკური ჯგუფის	3020	2253	2589	2525
დაამთავრა მკურნალობა	2436	1684	2005	2130
მათ შორის მკურნალობის მეთოდით:				
ქირურგიული	818	571	776	791
ხეობრი	226	148	270	212
მედიკამენტური	240	193	252	334
კომბინირებული	1025	684	617	710

ცხრილი 4.57 სიმსივნეების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009						
	2008			2009		
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %
ავსიაზეთი	158	0	0,0	0	0	0
აჭარა	998	18	1,8	941	21	2,2
თბილისი	9960	206	2,1	11900	253	2,1
კახეთი	54	3	5,6	91	11	12,1
იმერეთი	1589	18	1,1	1544	35	2,3
სამეგრელო და ჯემო სვანეთი	26	0	0,0	53	3	5,7
შიდა ქართლი	38	2	5,2	37	3	8,1
ქვემო ქართლი	103	8	7,8	106	6	5,7
გურია	11	1	9,1	9	1	11,1
სამცხე – ჯავახეთი	6	0	0,0	37	1	2,7
მცხეთა – მთიანეთი	0	0	0,0	6	0	0
რაჭა – ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	0	0	0,0	3	0	0
სსპა უფუფეები	90	2	2,2	145	1	0,7
საქართველო	13033	258	2,0	14872	335	2,3

ცხრილი 4.58 სიმსივნეების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009*						
	2008			2009		
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა %
აჭარა	31	1	3,2	29	2	6,9
თბილისი	743	3	0,4	877	13	1,5
კახეთი	0	0	0,0	0	0	0,0
იმერეთი	1	0	0,0	1	0	0,0
სამეგრელო	0	0	0,0	1	0	0,0
სამცხე – ჯავახეთი	0	0	0,0	20	0	0,0
საქართველო	775	4	0,5	928	15	1,6

* დანარჩენ რეგიონებში არ არის აღრიცხული ბავშვთა პოსტიტალიზაციის შემთხვევა

ცხრილი 4.59 სასუნთქი სისტემის ორგანოთა დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 1988 - 2009								
	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეზისტრი რეპული შემთხვევა	პრეპალმტოზა	ასალი შემთხვევა	ივდილმტოზა	რეზისტრი რეპული შემთხვევა	პრეპალმტოზა	ასალი შემთხვევა	ივდილმტოზა
1988	730480	13534,9	558365	10345,8	399837	31266,6	327608	25618,4
1990	688168	12686,5	420342	7749,1	338885	26483,7	228161	17830,6
1995	253640	5290,5	168928	3523,6	123206	12381,3	98891	9937,8
1996	214753	4594,1	156414	3346,1	119845	12637,9	95268	10046,2
2000	215841	4848,1	150606	3382,8	95182	10464,6	76566	8417,9
2001	225259	5083,7	156535	3532,7	101740	11238,8	79996	8836,9
2002	260808	5966,1	188241	4306,1	129307	14117,3	105717	11541,9
2003	304217	7027,6	236091	5453,8	157730	18655,2	137155	16221,8
2004	306984	7022,3	235532	5387,9	161811	17666,0	139364	15215,3
2005	328310	7510,2	249115	5698,6	177023	19326,8	151521	16542,6
2006	381538	8675,3	313784	7134,7	203398	25600,8	182795	23007,6
2007	351087	8000,3	288793	6580,8	184920	24103,2	169776	22129,3
2008	362824	8276,5	299800	6838,8	184384	24512,6	169762	22568,7
2009	505340	11456,6	447518	10145,7	259136	34418,4	246604	32753,9

ცხრილი 4.60 სასუნთქი სისტემის დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009								
	რეზისტრი რეპული შემთხვევა		პრეპალმტოზა		ასალი შემთხვევა		ივდილმტოზა	
	სულ	ბავშვები	სულ	ბავშვები	სულ	ბავშვები	სულ	ბავშვები
აფხაზეთი	18543	10014	--	--	14722	9325	--	--
აჭარა	44569	19600	11588,4	29832,6	36760	18567	9558,0	28260,3
თბილისი	141252	85011	12332,1	43483,9	122022	78323	10653,2	40062,9
კახეთი	49052	22579	12168,7	32818,3	45148	22202	11200,2	32270,3
იმერეთი	81827	44186	11738,2	37131,1	74312	42905	10660,2	36054,6
სამეგრელო	33319	14562	7074,1	18111,9	26876	13399	5706,2	16665,4
შიდა ქართლი	42164	23080	13645,3	43795,1	40094	22639	12975,4	42958,3
ქვემო ქართლი	29388	14597	5928,6	17254,1	27317	14408	5510,8	17030,7
გურია	16695	7565	11984,9	31785,7	15396	7270	11052,4	30546,2
სამცხე - ჯავახეთი	18790	9172	8960,4	25620,1	17382	9072	8289,0	25340,8
მცხეთა - მთიანეთი	16035	6607	14806,1	35713,5	14980	6475	13831,9	35000,0
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	5250	1727	11006,3	21321,0	4708	1677	9870,0	20703,7
სსპა უფრეზა	8456	436	--	--	7801	342	--	--
საქართველო	505340	259136	11456,6	34418,4	447518	246604	10145,7	32753,9

ცხრილი 4.61 სასუნთქი სისტემის დაავადებების გავრცელება ჯოგბერტი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2009				
	სულ		ბავშვები	
	პრეპალენტობა	ინციდენტობა	პრეპალენტობა	ინციდენტობა
სასუნთქი სისტემის დაავადებები სულ	11456,6	10145,7	34418,4	32753,9
მათ შორის				
ზედა სასუნთქი გზების გვავავე რესპირაციული ინფექციები	6778,9	6672,9	24429,0	24280,0
პნევმონია	773,0	747,4	1795,7	1756,1
ქვედა სასუნთქი გზების სხვა გვავავე რესპირაციული ინფექციები	1120,3	1082,3	2989,1	2937,4
ზედა სასუნთქი გზების სხვა დაავადებები	960,4	604,4	2331,3	1378,9
მათ შორის: ალერგიული რინიტი	254,0	173,5	473,9	340,3
ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული დაავადებები	1026,2	359,4	844,2	473,0
მათ შორის: ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი	454,9	192,8	441,4	315,0
ჰეპიზება	24,6	7,6	9,4	4,3
ასთმა და ასთმური სტატუსი	298,3	75,3	172,8	66,0
ფილტვის სხვა ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები	95,7	39,7	71,3	28,8
ბრონქოექტაზია	9,0	3,6	4,9	0,7
ფილტვის ავადმყოფობები გამომწვეული გარეგანი ფაქტორებით	10,0	3,8	11,2	7,8
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აზიანებენ ინტერსტიციუმს	11,7	6,4	12,2	9,7
ქვედა სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული ემპიემატოზები	2,2	1,2	0,5	0,4
პლევრის და სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები	105,3	54,4	111,4	83,5

ცხრილი 4.62 სასუნთქი სისტემის დაავადებების სტრუქტურული განაწილება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2009								
	სულ				გავრცელება			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	ახალი შემთხვევები	%	რეგისტრირებული შემთხვევები	%	ახალი შემთხვევები	%
სასუნთქი სისტემის დაავადებები სულ	505340	100	447518	100	259136	100	246604	100
მათ შორის								
ზედა სასუნთქი გზების მოვლადი რესპირატორული ინფექციები	299009	59,2	294335	65,8	183926	71,0	182804	74,1
პნევმონია	34097	6,7	32965	7,4	13520	5,2	13222	5,4
ქვედა სასუნთქი გზების სხვა მოვლადი რესპირატორული ინფექციები	49417	9,8	47740	10,7	22505	8,7	22116	9,0
ზედა სასუნთქი გზების სხვა დაავადებები	42362	8,4	26659	6,0	17552	6,8	10382	4,2
მათ შორის: ალერგიული რინიტი	11205	2,2	7651	1,7	3568	1,4	2562	1,04
ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული დაავადებები	45264	9,0	15852	3,5	6356	2,5	3561	1,4
მათ შორის: ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი	20065	4,0	8506	1,9	3323	1,3	2372	1,0
მიფიჭება	1084	0,2	334	0,1	71	0,03	32	0,01
ასთმა და ასთმური სტატუსი	16000	3,2	3323	0,7	1840	0,7	497	0,2
ფილტვის სხვა ქრონიკული ინფლემაციული დაავადებები	4222	0,8	1749	0,4	537	0,2	217	0,1
ბრონქოექტაზია	396	0,1	157	0,04	37	0,01	5	0,0
ფილტვის ავადმყოფობები გამომწვეული გარემოებით	439	0,1	169	0,04	84	0,03	59	0,02
სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აწინააღმდეგებიან ინტენსივურულ მკურნალებს	517	0,1	282	0,1	92	0,04	73	0,03
ქვედა სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული ინფლემაციები	98	0,0	55	0,01	4	0,0	3	0,0
პლევრის და სასუნთქი სისტემის სხვა ავადმყოფობები	4645	0,9	2400	0,5	839	0,3	629	0,3

ცხრილი 4.63 ასთმა და ასთმური სტატუსის გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირებული შემთხვევები		პრევალენტობა		რეგისტრირებული შემთხვევები		პრევალენტობა	
	სულ	გავრცელება	სულ	გავრცელება	სულ	გავრცელება	სულ	გავრცელება
აფხაზეთი	--	--	--	--	635	56	--	--
აჭარა	1305	365	342,3	557,8	1159	188	301,3	286,1
თბილისი	4771	748	431,1	393,9	4370	509	381,5	260,3
ქანთი	1217	69	303,0	100,1	1193	60	295,9	87,2
იმერეთი	3182	524	458,6	440,1	3396	540	487,2	453,8
სამეგრელო	1960	283	418,9	352,5	1843	219	391,3	272,4
შიდა ქართლი	779	23	249,0	42,8	756	56	244,7	106,3
ქვემო ქართლი	877	64	173,7	73,9	840	50	169,4	59,1
გურია	733	136	528,1	570,9	742	130	532,7	546,2
სამცხე - ჯავახეთი	8	0	3,8	0,0	399	12	190,3	33,5
მცხეთა - მთიანეთი	303	9	256,6	44,4	300	9	277,0	48,6
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	260	14	542,8	170,3	261	11	547,2	135,8
სხვა უწყვეტი	0	0	--	--	106	0	--	--
საქართველო	16443	2300	375,1	305,8	16000	1840	362,7	244,4

ცხრილი 4.64 ასთმის და ასთმური სტატუსის ახალი შემთხვევები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	ახალი შემთხვევები		ინციდენტობა		ახალი შემთხვევები		ინციდენტობა	
	სულ	გავრცელება	სულ	გავრცელება	სულ	გავრცელება	სულ	გავრცელება
აფხაზეთი	91	10	--	--	61	8	--	--
აჭარა	190	64	49,8	97,8	217	39	56,4	59,4
თბილისი	1143	214	103,3	112,7	889	179	77,6	91,6
კახეთი	228	14	56,8	20,3	283	12	70,2	17,4
იმერეთი	741	170	106,8	142,8	689	120	98,8	100,8
სამეგრელო	196	47	41,9	58,5	230	51	48,8	63,4
შიდა ქართლი	168	4	53,7	7,5	288	36	93,2	68,3
ქვემო ქართლი	160	16	31,7	18,5	261	24	52,7	28,4
გურია	84	44	60,5	184,7	102	23	73,2	96,6
სამცხე - ჯავახეთი	70	--	33,7	--	93	2	44,3	5,6
მცხეთა - მთიანეთი	58	3	49,1	14,8	61	--	56,3	--
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	57	2	119,0	24,3	46	3	96,4	37,0
სსკა უწყება	3	0	--	--	103	0	--	--
საქართველო	3189	588	72,8	78,2	3323	497	75,3	66,0

ცხრილი 4.65 სასუნთქი სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2009						
	სულ		მათ შორის გავრცელება			
	სტაციონარიდან გასული	ლეტალობა %	0 - 15 წლამდე		0 - 1 წლამდე	
			სტაციონარიდან გასული	ლეტალობა %	სტაციონარიდან გასული	ლეტალობა %
სასუნთქი სისტემის დაავადებები სულ	55117	0,9	34847	0,3	10824	0,6
მათ შორის						
ზედა სასუნთქი გზების გვზავე რესპირაციული ინფექციები	14481	0,05	12918	0,05	4485	0,1
ბრინჯი	4065	0,2	3137	0	702	0
პნევმონია	15062	1,0	7856	0,2	2777	0,5
ქვედა სასუნთქი გზების სსკა გვზავე რესპირაციული ინფექციები	3837	0,3	3498	0,03	1539	0
ზედა სასუნთქი გზების სსკა დაავადებები	6308	0	3764	0	253	0
მათ შორის: აღმრბიული რინიტი	42	0	27	0	0	0
ქვედა სასუნთქი გზების ქრონიკული დაავადებები	3868	1,3	1333	0	350	0
მათ შორის: ქრონიკული და დაუზუსტებელი ბრონქიტი	1063	0,4	605	0	160	0
მეფიზიკა	6	16,7	0	0	0	0
ასთმა და ასთმური სტატუსი	1145	1,6	148	0	1	0
ფილტვის სსკა ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები	1023	2,2	183	0	58	0
ბრონქოექტაზია	40	0	21	0	9	0
ფილტვის ავადმყოფობები გამოწვეული ბარეზანი ფაქტორებით	27	25,9	0	0	0	0
სასუნთქი სისტემის სსკა ავადმყოფობები, რომლებიც უპირატესად აწინააღმდეგებენ ინტენსიტივებს	280	16,4	60	0	0	0
ქვედა სასუნთქი გზების ჩირქოვანი და ნეკროზული მდგომარეობები	198	1,0	23	0	0	0
სასუნთქი სისტემის სსკა ავადმყოფობები	1595	10,2	575	12,2	250	20,0

ცხრილი 4.66 ბრიკისმაგვარი ღაავადების კოსპიტალიზაციის შემთხვევების რაოდენობა ინციდენტობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	ბრიკისმაგვარი ღაავადების კოსპიტალიზ. შემთხვევები	ინციდენტობა	ბრიკისმაგვარი ღაავადების კოსპიტალიზ. შემთხვევები	ინციდენტობა
აჭარა	15	3,9	1373	357,0
თბილისი	1049	91,6	3520	307,3
პანკისი	6	1,5	345	85,6
იმერეთი	762	109,3	1896	272,0
სამეგრელო	2847	604,4	2900	615,7
შიდა ქართლი	764	247,2	932	301,6
ქვემო ქართლი	847	170,9	991	199,9
გურია	5	3,6	144	103,4
სამცხე-ჯავახეთი	264	125,9	569	271,3
მცხეთა-მთიანეთი	158	145,9	208	192,1
რაჭა-ლეჩხუმი	64	134,2	409	857,4
სსპა უწყვეტა	224	--	369	--
საქართველო	7005	158,8	13656	309,6

ცხრილი 4.67 ბრიკისმაგვარი ღაავადების კოსპიტალიზირებული შემთხვევების რაოდენობა ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, საქართველო, 2005 - 2009								
	სულ	მათ შორის						
		<1	1-4	5-14	15-19	20-29	30-59	60 +
2005	469	113	168	119	32	12	12	13
2006	689	101	227	190	36	49	65	21
2007	5098	1 120	2 160	916	120	138	332	312
2008	7005	1 745	2 859	1 071	126	179	463	562
2009	13656	3 349	4 765	2 269	459	598	1 018	1 198

ცხრილი 4.68 ძირუბიკული ოპერაციები სასუნთქი სისტემის ორგანოებზე, საქართველო, 2009				
	ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	მათ შორის ბავშვები	ბარდაივივალა	ღებულობა (%)
ოპერაციები სუნთქვის ორგანოებზე	1035	58	18	1,7
მათ შორის				
პულმონექტომია	69	0	9	13,0
ფილტვის ფილის მოკვეთა (რეზექცია)	106	3	4	3,8
ფილტვის სეგმენტის მოკვეთა (რეზექცია)	91	1	0	0
სტრუქტურა	287	6	4	1,4
სასუნთქ რეზექცია	60	0	0	0
ბრონქის რეზექცია	9	0	0	0
პლევრის რეზექცია	23	2	0	0

ცხრილი 4.69 ფსიქიური და ძველი აზროვნების გავრცელება, საქართველო, 1988 - 2009								
	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენ-ტოზა	ახალი შემთხვევები	იგივე ტოზა	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენ-ტოზა	ახალი შემთხვევები	იგივე ტოზა
1988	77537	1436,7	3627	67,2	2728	213,3	587	45,9
1990	74757	1378,2	2718	50,1	5074	396,5	465	36,3
1995	65031	1356,5	2122	44,3	3171	318,7	160	16,1
1996	66392	1420,3	1459	31,2	2747	289,7	131	13,8
2000	67641	1519,3	1817	40,8	1905	201,9	99	10,5
2001	67299	1526,1	1741	39,5	1710	185,0	147	15,9
2002	65161	1490,6	1728	39,5	1747	190,7	217	23,7
2003	65788	1519,7	1645	38,0	1459	172,6	215	25,4
2004	68993	1578,2	3206	73,3	1537	167,8	412	45,0
2005	71179	1628,2	3974	91,0	1662	181,5	564	61,6
2006	74022	1683,3	3810	87,2	1716	216,0	344	37,6
2007	72588	1654,1	2677	61,0	1496	195,0	167	21,8
2008	75448	1721,1	3740	85,3	1672	222,3	284	37,8
2009	76457	1733,4	2505	56,8	1651	219,3	343	45,6

ცხრილი 4.70 წლის ბოლოს აღრიცხვაზე მეორე ფსიქიურ ავადმყოფთა კონტინენტის განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	სულ		მათ შორის ბავშვები		სულ		მათ შორის ბავშვები	
	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენ-ტოზა	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენ-ტოზა	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენ-ტოზა	წლის ბოლოს რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენ-ტოზა
აფხაზეთი	1138	--	0	--	1171	--	0	--
აჭარა	7080	1856,8	386	589,9	7313	1901,5	329	500,8
თბილისი	10083	911,1	268	1411,2	9978	871,1	394	201,5
პანკისი	5638	1403,5	120	174,1	5731	1421,7	131	190,4
იმერეთი	17875	2576,0	224	188,1	18359	2633,6	237	199,2
სამეგრელო	12216	2610,8	313	389,8	12128	2574,9	186	231,3
შიდა ქართლი	7053	2254,1	115	214,2	7376	2387,1	114	216,3
ქვემო ქართლი	7164	1419,2	140	161,6	7246	1461,8	154	182,0
გურია	3130	2255,0	41	172,1	3196	2294,3	40	168,1
სამცხე-ჯავახეთი	1847	888,4	57	159,8	1893	902,7	60	167,6
მცხეთა-მთიანეთი	2224	1883,2	8	39,5	2066	1907,7	6	32,4
საქართველო	75448	1721,1	1672	222,3	76457	1733,4	1651	219,3

ცხრილი 4.71 ფსიქიკური და ქვეყნითი აზლილობების ასალი შემოსვების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	სულ		მათ შორის ბავშვები		სულ		მათ შორის ბავშვები	
	ასალი შემოსვები	ინციდენტობა	ასალი შემოსვები	ინციდენტობა	ასალი შემოსვები	ინციდენტობა	ასალი შემოსვები	ინციდენტობა
აფსაქსი	37	--	0	--	33	--	0	--
აჭარა	424	111,2	46	70,3	254	66,0	43	65,4
თბილისი	739	66,8	61	32,1	481	42,0	81	41,4
ქასეთი	170	42,3	30	43,5	170	42,2	22	32,0
იმერეთი	577	83,2	96	80,6	596	85,5	82	68,9
სამეგრელო	1076	230,0	1	1,2	190	40,3	12	14,9
შიდა ქართლი	316	101,0	18	33,5	413	133,7	28	53,1
ქვემო ქართლი	149	29,5	21	24,2	145	29,3	19	22,5
გურია	131	94,4	0	0,0	103	73,9	26	109,2
სამცხე-ჯავახეთი	92	44,3	10	28,0	88	42,0	30	83,8
მცხეთა-მთიანეთი	29	24,6	1	4,9	32	29,5	0	0,0
საქართველო	3740	85,3	284	37,8	2505	56,8	343	45,6

ცხრილი 4.72 ფლის ბოლოს აღრიცხვაზე მყოფ ფსიქიკური ავადმყოფთა კონტინენტის განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2009						
	სულ	მათ შორის				
		0-14 წ.	15-17 წ.	18-19 წ.	20-59 წ.	ქალები
ფსიქიკური და ქვეყნითი აზლილობები	76457	1651	1023	1452	60877	30192
<i>მათ შორის:</i>						
ორგანული გუნების აზლილობები, სივტორული აზლილობათა ჩათვლით	10885	338	220	282	8267	4202
ფსიქოპათიური ნივთიერებით განვირობული ფსიქიკური და ქვეყნითი აზლილობები	2147	0	0	0	2051	160
შიზოფრენია, შიზოტიპური და ბოლვითი აზლილობები	22832	47	83	355	19068	10131
მათ შორის: შიზოფრენია	14897	24	40	256	12294	6337
გუნებ-განწყობის (ავმტური) აზლილობები	5495	27	51	15	4857	2197
ნეპროზული, სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული აზლილობები	8552	1	45	94	7170	4703
ქვეყნითი სინდრომები დაკავშირებული ფიზიოლოგიურ დარღვევებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან	537	0	0	0	521	216
მოზრდოლთა პერსონალიზირებული და ქვეყნითი აზლილობები	2840	0	0	41	2065	480
ბონებრივი ჩამორჩენილობა	21450	1054	523	615	15521	7356
ფსიქიკური განვითარების დარღვევები	1304	73	56	16	1148	610
გაუგებთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქვეყნითი და მმოცირი აზლილობები	415	111	45	34	209	137

ცხრილი 4.73 ფსიქიური და ქვევითი აშლილობების ასალი შემთხვევების განაწილება ასაკის და სქესის მიხედვით, საქართველო, 2009						
	სულ	მათ შორის				
		0-14 წ.	15-17 წ.	18-19 წ.	20-59 წ.	ქალები
ფსიქიური და ქვევითი აშლილობები	2505	343	106	209	1687	1007
<i>მათ შორის:</i>						
ორგანული ბუნების აშლილობები, სიმპტომატურ აშლილობათა ჩათვლით	481	19	18	36	324	178
ფსიქოპათიური ნივთიერებით განხირობებული ფსიქიური და ქვევითი აშლილობები	47	0	0	0	46	17
შიზოფრენია, შიზოტიპური და პოდვითი აშლილობები	699	1	2	44	606	280
მათ შორის შიზოფრენია	282	1		28	238	110
ბუნებ-განწყობის (აფექტური) აშლილობები	282	14	2	4	251	171
ნეპროზული, სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული აშლილობები	147	1	0	12	129	86
ქვევითი სინდრომები დაკავშირებული ფიზიოლოგიურ დარღვევებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან	21	0	0	0	21	16
მოზრდილთა პერსონოლოგიური და ქვევითი აშლილობები	96	0	0	27	67	5
ბონეპრივი ჩამორჩენილობა	649	269	77	82	217	228
ფსიქიური განვითარების დარღვევები	33	10		1	16	14
გავრცედა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქვევითი და მოციფიური აშლილობები	50	29	7	3	10	12

ცხრილი 4.74 ფსიქიური და ქვევითი აშლილობების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა ჯოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2009			
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)
სულ	3488	52	1,5
<i>მათ შორის:</i>			
ორგანული ბუნების აშლილობები, სიმპტომატურ აშლილობათა ჩათვლით	429	19	4,4
ფსიქოპათიური ნივთიერებით განხირობებული ფსიქიური და ქვევითი აშლილობები	139	0	0,0
შიზოფრენია, შიზოტიპური და პოდვითი აშლილობები	2617	29	1,1
მათ შორის შიზოფრენია	1673	26	1,6
ბუნებ-განწყობის (აფექტური) აშლილობები	111	0	0,0
ნეპროზული, სტრესთან დაკავშირებული და სომატოფორმული აშლილობები	42	1	2,4
ქვევითი სინდრომები დაკავშირებული ფიზიოლოგიურ დარღვევებთან და ფიზიკურ ფაქტორებთან	1	0	0,0
მოზრდილთა პერსონოლოგიური და ქვევითი აშლილობები	35	2	5,7
ბონეპრივი ჩამორჩენილობა	112	1	0,9

ცხრილი 4.75 ფსიქიური და ქვევითი აშლილობების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2007 - 2009			
	2007	2008	2009
სტაციონარიდან გასული ავადმყოფები	4377	3705	3488
მათ შორის: გარდაიცვალა	65	82	52
ლეტალობა (%)	1,5	2,2	1,5
დღის სტაციონარში გპურნალობა	992	670	155

ცხრილი 4.76 ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებები, საქართველო, 1988 – 2009								
	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	წლის ბოლოს (კონტინგენტი)	პრეპალმე-ტოზა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტოზა	წლის ბოლოს (კონტინგენტი)	პრეპალმე-ტოზა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტოზა
1988	78637	1457,1	11197	207,4	11812	923,7	4481	325,5
2000	140145	3147,8	32116	721,4	32756	3601,3	11856	1303,5
2001	121866	2750,3	31573	712,3	22434	2478,2	9484	1047,7
2002	120087	2747,0	30056	687,5	21842	2384,6	9452	1031,9
2003	124264	2870,6	28859	666,7	22420	2651,7	7985	944,4
2004	129346	2958,8	29920	684,4	22227	2426,7	6580	718,4
2005	137216	3138,9	31843	720,2	23716	2589,2	7906	863,2
2006	124016	2819,8	27660	628,9	18310	2304,6	6441	810,7
2007	118812	2707,4	27307	622,3	10392	1354,5	5602	730,2
2008	119864	2734,2	30580	697,6	9356	1243,8	5323	707,7
2009	124793	2829,2	40054	908,1	9053	1202,4	7982	1060,2

ცხრილი 4.77 ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებები, რეპროდუქციის მიხედვით, საქართველო, 2008 -2009								
	2008				2009			
	რეპროდუქციულ ფუნქციის დაზიანება	პრეპალმე-ტოზა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტოზა	რეპროდუქციულ ფუნქციის დაზიანება	პრეპალმე-ტოზა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტოზა
ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებები	119864	2734,2	30580	697,6	124793	2829,2	40054	908,1
გათ შორის								
სუბკლინიკური იოდ-დეფიციტური კიბერ-თირკმელი და კიბერთირკმლის სხვა ფორმები	25864	590,0	7421	169,3	25913	587,5	7999	181,3
არატოქსიური ჩივილის სხვა ფორმები	16440	375,0	5772	131,7	15793	358,0	6634	150,4
თირკმელის კიბერ-თირკმელი [კიბერთირკმელი]	5945	135,6	2086	47,6	5637	127,8	2213	50,2
ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (ტიპი I)	17817	406,4	2630	60,0	19461	441,2	3390	76,9
ინსულინდამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი (ტიპი II)	46625	1063,6	6795	155,0	49453	1121,2	7737	175,4

ცხრილი 4.78 ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევებით გამოწვეული დაავადებები, რეპროდუქციის მიხედვით, საქართველო, 2009								
	ფლის ბოლოს (კონტინგენტი)				ახალი შემთხვევები			
	სულ		მ.შ. გავრცელება		სულ		მ.შ. გავრცელება	
	რაოდენობა	კრედიტობა	რაოდენობა	კრედიტობა	რაოდენობა	კრედიტობა	რაოდენობა	კრედიტობა
აფხაზეთი	2881	--	138	--	899	--	175	--
აჭარა	13300	3458,1	424	645,4	4796	1247,0	1765	2686,5
თბილისი	39039	3408,3	1430	731,5	6922	604,3	505	258,3
კახეთი	17794	4414,3	2798	4066,9	4543	1127,0	753	1094,5
იმერეთი	24786	3555,6	848	712,6	7765	1113,9	900	756,3
სამეგრელო	6970	1479,8	312	388,1	2508	532,5	679	844,5
შიდა ქართლი	8393	2716,2	2325	4411,8	4423	1431,4	1725	3273,2
ქვემო ქართლი	5906	1191,4	197	232,9	2368	477,7	720	851,1
გურია	1580	1134,2	121	508,4	785	563,5	224	941,2
სამცხე - ჯავახეთი	3044	1451,6	214	597,8	1611	768,2	251	701,1
მცხეთა - მთიანეთი	2480	2289,9	153	827,0	877	809,8	192	1037,8
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1280	2683,4	79	975,3	303	635,2	77	950,6
სსკ უწყვეტი	340	--	14	--	2254	--	16	--
საქართველო	124793	2829,2	9053	1202,4	40054	908,1	7982	1060,2

ცხრილი 4.79 შაქრიანი დიაბეტის გავრცელება, საქართველო, 2007 – 2009						
ახალი შემთხვევები	2007		2008		2009	
	რაოდენობა	ინციდენცია	რაოდენობა	ინციდენცია	რაოდენობა	ინციდენცია
	7461	170,0	9425	215,0	11127	252,3
მათ შორის						
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული (ტიპი I)	2415	55,0	2630	60,0	3390	76,9
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული (ტიპი II)	5046	115,0	6795	155,0	7737	175,4
ფლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფი ავადმყოფები (კონტინგენტი)	რაოდენობა	პრევალენცია	რაოდენობა	პრევალენცია	რაოდენობა	პრევალენცია
	59875	1364,4	64442	1470,0	68914	1562,4
მათ შორის						
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული (ტიპი I)	16686	380,2	17817	406,4	19461	441,2
შაქრიანი დიაბეტი ინსულინდამოკიდებული (ტიპი II)	43189	984,2	46625	1063,6	49453	1121,2

ცხრილი 4.80 შაქრიანი ღიაგების გავრცელება 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2007 – 2009						
	2007		2008		2009	
	რაოდენობა	ინციდენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა
ასალი შემთხვევები	69	9,0	45	6,0	64	8,5
გათ შორის						
შაქრიანი ღიაგები ინსულინდამოკიდებული (ტიპი I)	59	7,7	35	4,6	57	7,6
შაქრიანი ღიაგები ინსულინდამოკიდებული (ტიპი II)	10	1,3	10	1,3	7	0,9
წლის ბოლოს შემთხვევითობა (კონტინენტი)	263	34,3	234	31,1	257	34,1
გათ შორის						
შაქრიანი ღიაგები ინსულინდამოკიდებული (ტიპი I)	208	27,1	184	24,5	228	30,3
შაქრიანი ღიაგები ინსულინდამოკიდებული (ტიპი II)	55	7,2	50	6,6	29	3,9

ცხრილი 4.81 შაქრიანი ღიაგების გავრცელება რეგიონებში, საქართველო, 2009								
	კონტინენტი				ასალი შემთხვევები			
	სულ წლის ბოლოს		მ.შ. ბავშვები		სულ		მ.შ. ბავშვები	
	რაოდენობა	პროცენტობა	რაოდენობა	პროცენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა	რაოდენობა	ინციდენტობა
აფხაზეთი	1511	--	5	--	192	--	1	--
აჭარა	6812	1771,2	17	25,9	1118	290,7	6	9,1
თბილისი	24027	2097,7	78	39,9	1651	144,1	12	6,1
კახეთი	6336	1571,8	23	33,4	1422	352,8	7	10,2
იმერეთი	13355	1915,8	45	37,8	2698	387,0	8	6,7
სამეგრელო	3663	777,7	28	34,8	622	132,1	6	7,5
შიდა ქართლი	4600	1488,7	26	49,3	1477	478,0	9	17,1
ქვემო ქართლი	3771	760,7	6	7,1	575	116,0	3	3,5
გურია	1009	724,3	8	33,6	183	131,4	2	8,4
სამცხე - ჯავახეთი	1523	726,3	12	33,5	584	278,5	6	16,8
მცხეთა - მთიანეთი	1120	1034,2	5	27,0	268	247,5	3	16,2
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	928	1945,5	3	37,0	130	272,5	1	12,3
სხვა უწყვეტი	246	--	1	--	137	--	0	--
საქართველო	68914	1562,4	257	34,1	11127	252,3	64	8,5

ცხრილი 4.82 ენდოკრინული სისტემის, კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით გამოწვეული დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფთა რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	ბასულია სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები		ბასულია სულ	ლეტალობა (%)	მ.შ. ბავშვები	
			ბასულია	ლეტალობა (%)			ბასულია	ლეტალობა (%)
ენდოკრინული სისტემის დაავადებები სულ	4487	1,8	363	0,5	3836	1,8	406	0
გათ შორის								
თირკმელის ფუნქცია	436	0	0	0	435	0,2	2	0
შაქრიანი ღიაგები	2596	2,7	205	0,5	1950	2,7	194	0

ცხრილი 4.83 ენდოკრინული პროფილის საწოლების გუშაგის მაჩვენებლები, რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009				
	საწოლთა რაოდენობა	დაბირთვა საწოლზე	დაზოგნება	ბრუნვა
აჭარა	8	47,6	2,8	17,4
თბილისი	35	83,8	4,0	20,7
იმერეთი	3	62,7	2,7	23,0
სამეგრელო	2	84,5	3,0	28,0
შიდა ქართლი	2	13,5	2,3	6,0
ქვემო ქართლი	1	132,0	2,8	47,0
საქართველო	51	75,1	3,7	20,6

ცხრილი 4.84 ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევის შედეგები, საქართველო, 2007 – 2009						
	2007		2008		2009	
	სულ	%	სულ	%	სულ	%
<i>სამკურნალო დაწესებულებებს მიმართა გამოსაკვლევად</i>						
სულ	43413	100	45037	100	46486	100
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	25690	59,2	24288	53,9	25780	55,4
მკურნალობა დაენიშნა	21242	82,7	20497	84,4	22764	88,3
<i>მათ შორის ბავშვები</i>						
სულ	14535	100	16402	100	9912	100
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	7333	50,4	6845	41,7	5617	56,7
მკურნალობა დაენიშნა	4820	65,7	5534	80,8	4616	82,2

ცხრილი 4.85 ფარისებრი ჯირკვლის გადიდების შემთხვევათა სტრუქტურა, საქართველო, 2008 - 2009												
	2008						2009					
	სულ	% ბავშვთა რაოდენობიდან	სტრუქტურა %-ში სტადიების მიხედვით				სულ	% ბავშვთა რაოდენობიდან	სტრუქტურა %-ში სტადიების მიხედვით			
			I	II	III	IV			I	II	III	IV
ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა სულ	24288	53,9	36,2	29,0	24,1	10,6	25780	55,4	35,1	26,3	25,9	12,7
მათ შორის ბავშვები	6845	41,7	51,6	28,2	14,7	5,4	5617	56,7	46,0	26,7	21,8	5,6

ცხრილი 4.86 ფარისებრი ჯირკვლის გადიდების გამოკვლევის შედეგები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009						
	გამოკვლეულთა რაოდენობა			მათ შორის ბავშვები		
	სულ	მათ შორის ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	% სავითო რაოდენობიდან	სულ	მათ შორის ფარისებრი ჯირკვლის გადიდება აღმოაჩნდა	% სავითო რაოდენობიდან
აფხაზეთი	500	437	87,4	41	31	75,6
აჭარა	2829	2149	76,0	876	344	39,3
თბილისი	10296	5179	50,3	400	215	53,8
კახეთი	2935	1441	49,1	1584	529	33,4
იმერეთი	17759	10323	58,1	3410	2063	60,5
სამეგრელო	6555	2627	40,1	1172	701	59,8
შიდა ქართლი	2929	2060	70,3	1052	880	83,7
ქვემო ქართლი	361	220	60,9	100	64	64,0
გურია	400	306	76,5	255	244	95,7
ხაზინა - ჯავახეთი	952	677	71,1	692	447	64,6
მცხეთა - მთიანეთი	764	258	33,8	314	83	26,4
რაჭა - ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	206	103	50,0	16	16	100,0
საქართველო	46486	25780	55,5	9912	5617	56,7

ცხრილი 4.87 ჩატარებული იოლოპროფილაქტიკა, საქართველო, 2005 – 2009					
	2005	2006	2007	2008	2009
იოლოპროფილაქტიკა ჩატარდა	29475	24910	25471	24805	21521
მ.შ. ბავშვებს	14146	11205	10001	12369	7113

ცხრილი 4.88 შარდსაქმის სისტემის დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 1988 – 2009								
	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
1988	75934	1407,0	23998	444,7	6259	489,4	1251	97,8
1990	90052	1660,1	31528	581,2	7927	619,5	2890	225,9
1995	48415	1009,9	14804	308,8	5091	511,6	1958	196,8
1996	40211	860,2	15153	324,2	4233	446,4	2397	252,8
2000	51574	1158,4	21233	476,9	4892	537,8	3166	348,1
2001	55205	1245,9	25223	569,2	5155	569,5	3200	353,5
2002	58945	1348,4	25000	571,9	5841	637,7	3852	420,6
2003	60127	1389,0	27001	623,7	5932	701,6	4073	481,7
2004	69913	1599,3	31485	720,2	6895	752,8	4671	510,0
2005	70913	1622,2	31644	723,9	7013	765,7	4914	536,5
2006	79722	1812,7	40356	917,6	6136	772,3	4064	511,5
2007	79233	1805,5	33772	769,6	5635	734,5	3599	469,1
2008	91904	2096,4	48298	1101,7	5861	779,2	3878	515,6
2009	112647	2553,8	64652	1465,7	7981	1060,0	6152	817,1

ცხრილი 4.89 შარდ-სასქმის სისტემის დაავადებების სტრუქტურა, საქართველო, 2008 – 2009				
	2008		2009	
	შემთხვევების რაოდენობა	% საერთო რაოდენობიდან	შემთხვევების რაოდენობა	% საერთო რაოდენობიდან
შარდ-სასქმის სისტემის დაავადებები	91904	100	112647	100
მათ შორის				
გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზი	7989	8,7	8158	7,2
ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [თირკმლების ინფექციები]	6444	7,0	6904	6,1
თირკმლების უკმარისობა	1283	1,4	1408	1,2
თირკმლების და შარდსაწვეთების კენჭები	10607	11,5	12103	10,7
მაჰაპაციის სასქმის ორგანოების დაავადებები	13224	14,4	16670	14,8
მათ შორის: წინამდებარე ჯირკვლის პიკეპლავია	4971	5,4	5897	5,2
წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები	3924	4,3	5027	4,5
მაჰაპაციის უნაყოფოობა	549	0,6	729	0,6
ძალის სასქმის ორგანოების დაავადებები	40855	44,5	52538	46,6
მათ შორის: სალკინგითი, ორფორითი	7616	8,3	10470	9,3
ჰემლიმფრომა	1840	2,0	2257	2,0
საშვილოსნოს ყელის მრეზია და მტრეპიონი	7406	8,1	8533	7,6
მენსტრუალური ციკლის დარღვევა	7049	7,7	9073	8,1
მენოპაუზური და სხვა პერიმენოპაუზური დარღვევები	4944	5,4	6247	5,5
ძალის უნაყოფოობა	2718	3,0	2867	2,5

ცხრილი 4.90 შარღ-სასქესო სისტემის დაავადებათა გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრეპალმ. ტოპა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ. ტოპა	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრეპალმ. ტოპა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ. ტოპა
აფხაზეთი	9618	--	4097	--	6805	--	3062	--
აჭარა	6548	1717,3	3355	879,9	12276	3191,9	6661	1731,9
თბილისი	22477	2031,0	10855	980,8	30399	2654,0	16005	1397,3
კახეთი	6977	1736,9	3505	872,5	8783	2178,9	5041	1250,6
იმერეთი	15137	2181,4	8923	1285,9	17546	2517,0	10461	1500,6
სამეგრელო	9348	1997,9	4533	968,8	10570	2244,2	5551	1178,6
შიდა ქართლი	4181	1336,2	2528	807,9	5555	1797,7	3826	1238,2
ქვემო ქართლი	6972	1381,1	4932	977,0	6493	1309,9	4397	887,0
გურია	2279	1641,9	1223	881,1	2718	1951,2	1690	1213,2
სამცხე-ჯავახეთი	3865	1859,1	2061	991,3	3718	1773,0	2407	1147,8
მცხეთა-მთიანეთი	1914	1620,7	1022	865,4	2905	2682,4	1950	1800,6
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1285	2682,7	379	791,2	1325	2777,8	511	1071,3
სსკა უწყვეტები	1303	--	885	--	3554	--	3090	--
საქართველო	91904	2096,4	48298	1101,7	112647	2553,8	64652	1465,7

ცხრილი 4.91 შარღ-სასქესო სისტემის დაავადებათა გავრცელება გავრცელებულ რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრეპალმ. ტოპა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ. ტოპა	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრეპალმ. ტოპა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ. ტოპა
აფხაზეთი	684	--	380	--	553	--	312	--
აჭარა	442	675,5	252	385,1	1073	1633,2	846	1287,7
თბილისი	2276	1198,5	1551	816,7	2452	1254,2	1775	907,9
კახეთი	374	542,6	231	335,1	647	940,4	520	755,8
იმერეთი	609	511,5	409	343,5	857	720,2	702	589,9
სამეგრელო	365	454,6	172	214,2	520	646,8	371	461,4
შიდა ქართლი	499	929,4	426	793,4	809	1535,1	690	1309,3
ქვემო ქართლი	182	210,1	94	108,5	365	431,4	288	340,4
გურია	341	1431,6	295	1238,5	374	1571,4	347	1458,0
სამცხე-ჯავახეთი	31	86,9	15	42,0	142	396,6	121	338,0
მცხეთა-მთიანეთი	48	236,8	46	226,9	124	670,3	123	664,9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	6	73,0	3	36,5	59	728,4	53	654,3
სსკა უწყვეტები	4	--	4	--	6	--	4	--
საქართველო	5861	779,2	3878	515,6	7981	1060,0	6152	817,1

ცხრილი 4.92 შარდ-სასქმსო სისტემის დაავადებათა გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2009*				
	რეგისტრირ. შემთხვევები	პრეპალმე ტოზა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ ტოზა
შარდ-სასქმსო სისტემის დაავადებები	112647	2553,8	64652	1465,7
გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზი	8158	185,0	3352	76,0
ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [თირკმლების ინფექციები]	6904	156,5	2704	61,3
თირკმლების უკმარისობა	1408	31,9	553	12,5
თირკმლების და შარდსაწვეთების კენჭები	12103	274,4	4759	107,9
მაჰაპაციის სასქმსო ორგანოების დაავადებები	16670	795,8	9405	449,0
მათ შორის: წინამდებარე ჯირკვლის კიპერალაზია	5897	281,5	2887	137,8
წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები	5027	240,0	2716	129,7
მაჰაპაციის უნაყოფოობა	729	52,8	343	24,9
ქალის სასქმსო ორგანოების დაავადებები	52538	2268,4	32590	1407,1
მათ შორის: სალპინგიტი, ოოფორიტი	10470	452,1	6843	295,5
ენდომეტრიოზი	2257	97,4	1417	61,2
საშვილოსნოს ყელის მრეზია და მტრეპიონი	8533	368,4	4954	213,9
მენსტრუალური ციკლის დარღვევა	9073	391,7	5629	243,0
მენოპაუზური და სხვა პერიმენოპაუზური დარღვევები	6247	269,7	3826	165,2
ქალის უნაყოფოობა	2867	244,7	1281	109,3

ცხრილი 4.93 შარდ-სასქმსო სისტემის დაავადებათა გავრცელება ბავშვებში ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2009				
	რეგისტრირ. ახალი შემთხვევები	პრეპალმე ტოზა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ ტოზა
შარდ-სასქმსო სისტემის დაავადებები	7981	1060,0	6152	817,1
გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზი	929	123,4	477	63,4
ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [თირკმლების ინფექციები]	1004	133,4	406	53,9
თირკმლების უკმარისობა	39	5,2	11	1,5
თირკმლების და შარდსაწვეთების კენჭები	81	10,8	51	6,8
მაჰაპაციის სასქმსო ორგანოების დაავადებები	1289	324,7	1077	271,3
მათ შორის: წინამდებარე ჯირკვლის კიპერალაზია	6	1,5	3	0,8
წინამდებარე ჯირკვლის ანთებითი ავადმყოფობები	3	0,8	0	0
ქალის სასქმსო ორგანოების დაავადებები	378	106,2	320	89,9
მათ შორის: სალპინგიტი, ოოფორიტი	58	16,3	47	13,2
ენდომეტრიოზი	0	0	0	0
საშვილოსნოს ყელის მრეზია და მტრეპიონი	2	0,6	1	0,3
მენსტრუალური ციკლის დარღვევა	162	45,5	136	38,2

* ქალთა და მამაკაცთა სასქესო ორგანოების დაავადებათა მაჩვენებლები გამოთვლილია თითოეული სქესის შესაბამის კონტინენტზე

ცხრილი 4.94 შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების ღიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა, რეპრონების მიხედვით, საქართველო, 2009						
	სტაციონარი- დან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)	მათ შორის გავშვები 15 წლამდე		
				სტაციონარი- დან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვა- ლა	ლეტალობა (%)
აჭარა	1236	21	1,7	163	0	0,0
თბილისი	6057	71	1,2	505	4	0,8
კახეთი	694	1	0,1	33	0	0,0
იმერეთი	1971	11	0,6	117	0	0,0
სამეგრელო	666	6	0,9	44	0	0,0
შიდა ქართლი	650	2	0,3	25	0	0,0
ქვემო ქართლი	240	0	0,0	20	0	0,0
გურია	180	1	0,6	8	0	0,0
სამცხე-ჯავახეთი	89	0	0,0	2	0	0,0
მცხეთა-მთიანეთი	142	1	0,7	0	0	0,0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	96	0	0,0	4	0	0,0
სსკპ უწყებები	163	0	0,0	0	0	0,0
საქართველო	12184	114	0,9	921	4	0,4

ცხრილი 4.95 შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებების ღიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2009					
	სტაციონარი- დან გავიდა	სულ		გავშვები 15 წლამდე	
		მ.შ. გარდაიცვალა		სტაციონარიდან გავიდა	
		სულ	ლეტალობა (%)	სულ	ლეტალობა (%)
სულ	12184	114	0,9	921	0,4
მათ შორის					
გლომერულონეფრიტი, ნეფრიტული სინდრომი და ნეფროზი	691	9	1,3	122	0,8
ქრონიკული ტუბულო-ინტერსტიციული ნეფრიტი [თირკმლების ინფექციები]	445	2	0,4	97	0,0
თირკმლების და შარდსაწვეთის კენჭები	877	4	0,5	6	0,0
წინამდებარე ჯირკმლის დაავადებები	1692	3	0,2	21	0,0

ცხრილი 4.96 ქირურგიული ოპერაციები შარდ-სასქესო სისტემის ორგანოებზე, საქართველო, 2009				
	ჩატარებული ოპერაციების რიცხვი	მათ შორის ბავშვები	ბარდაიშვალა	ლეტალუბა (%)
სულ	53743	686	36	0,1
ოპერაციები თირკმელზესა და შარდსაწვეთზე	2421	136	11	0,5
მათ შორის: თირკმლის გადანერგვა	9	0	1	11,1
თირკმლის რეზექცია	60	0	0	0
ნეფრექტომია	350	6	5	1,4
შარდსაწვეთებზე	209	9	1	0,5
შარდის ბუშტზე	865	86	3	0,3
შარდსაღვზე	217	18	0	0
ოპერაციები წინამდებარე ჯირკვალზე	1275	12	5	0,4
ორქექტომია	373	17	0	0
ოპერაციები ქალის სასქესო ორგანოებზე	9722	8	8	0,1
მათ შორის: საშვილოსნოს გამოფხვების გამო	2395	0	0	0
ქალის სტერილიზაცია	192	0	0	0
საშვილოსნოს ამპუტაცია	1235	0	1	0,1
საშვილოსნოს მსტირეკაცია	3570	1	7	0,2
საკვერცხის რეზექცია	851	7	0	0
ოვარექტომია	657	0	0	0
ქალის გარეთა სასქესო ორგანოებზე ქსოვილის ამოკვეთით	177	0	0	0
სამეანო-გინეკოლოგიური ოპერაციები	35535	3	4	0,01

ცხრილი 4.97 ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების შემთხვევების ზომიერების სხვა შემთხვევები, საქართველო, 1990 - 2009								
	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრემალფ-ტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ-ტობა	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრემალფ-ტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენ-ტობა
1990	274460	5059,7	162789	3001,1	53000	4141,9	43363	3388,8
1995	54250	1131,6	44663	931,6	16158	1623,7	13884	1395,2
1996	29113	622,8	22159	474,0	9156	965,5	7163	755,3
2000	25785	579,2	19811	445,0	5611	600,7	4435	487,6
2001	29332	662,0	23709	535,1	6146	678,9	4979	550,0
2002	34355	785,9	28714	656,8	8172	892,2	6908	754,2
2003	34007	785,6	28741	663,9	7152	845,9	6058	716,5
2004	36948	845,2	32488	743,2	7717	842,5	6936	757,3
2005	35614	814,7	32032	732,7	7431	811,3	6804	742,8
2006	32892	747,9	29697	675,2	7174	903,0	6808	856,9
2007	32318	736,4	28715	654,3	7174	903,0	6279	818,4
2008	31088	709,2	29201	666,1	7298	970,2	6978	927,7
2009	44673	1012,8	42147	955,5	7428	986,6	7211	957,8

ცხრილი 4.98 ტრაპეზები, მოწყავლებები და გარეგანი მიწეების შემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი, ინციდენტობა და სტრუქტურა, საქართველო, 2009						
	სულ			მათ შორის პაპშეშები		
	ასალი შემოსევები	ინციდენტობა	%	ასალი შემოსევები	ინციდენტობა	%
ტრაპეზები, მოწყავლებები და გარე მიწეების შემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი	42147	955,5	100	7211	957,8	100
მათ შორის						
თაყის ძალასა და სანის კვლების, კისრის მალის, ნეკნების, კეპრდის კვლის და ზეგნების მოტეხილობა	1221	27,7	2,9	109	14,5	1,5
ინტრაპრანული დაწინააზება	803	18,2	1,9	81	10,8	1,1
ზედა და ქვედა კიდეების კვლების მოტეხილობა	4766	108,1	11,3	828	110,0	11,5
ამოვარდნილობა (კვლების მოტეხილობის გარეშე), დაკაბულობა, დაჭიმულობა, სანსრების და მიმდებარე კუნთების დეფორმაცია	5363	121,6	12,7	1010	134,1	14,0
გულკეპრდის, გუცლისა და მენჯის ღრუს შინაგანი ორგანოების ტრაპეზები	997	22,6	2,4	32	4,3	0,4
ჭრილობები, სისხლკარღვების დაწინააზება, ზედაპირული ტრაპეზები, დაშედილობები და დაწეპიდილობები	20976	475,5	49,8	3600	478,2	49,9
ნერვებისა და ზურბის ტვინის ტრაპეზები	319	7,2	0,8	43	5,7	0,6
თერგული და ქიმიური დაფვრებები	1065	24,1	2,5	331	44,0	4,6
სამკურნალო ნივთიერებებით, მდიკაჟენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწყავლები, უპირატესად არასამდიკოეო დანიშნულების ნივთიერებათა ტოქსიკური მოქმედება და აგრეთვე სხვა გარეშე დაუზუსტებელი მიწეების მოქმედება	897	20,3	2,1	152	20,2	2,1
მათ შორის: სამკურნალო საშუალებებით, მდიკაჟენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწყავლა	296	6,7	0,7	35	4,6	0,5
უპირატესად არასამდიკოეო დანიშნულების სუბსტანციების ტოქსიკური ეფექტები	291	6,6	0,7	40	5,3	0,6

ცხრილი 4.99 ტრაპეზები, მოწყავლებები და გარეგანი მიწეების შემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი, გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირებული შემოსევები	არამასტობობა	ასალი შემოსევები	ინციდენტობა	რეგისტრირებული შემოსევები	არამასტობობა	ასალი შემოსევები	ინციდენტობა
აფსაზეთი	1662	--	1637	--	1350	--	1303	--
აჭარა	2410	632,0	2384	625,2	4830	1255,9	4461	1159,9
თბილისი	5368	485,0	4367	394,6	5821	508,2	4562	398,3
კახეთი	3121	776,9	2988	743,8	3636	902,0	3548	880,2
იმერეთი	5365	773,2	5193	748,4	5584	801,0	5442	780,7
სამეგრელო	2889	617,4	2767	591,4	10890	2312,1	10769	2286,4
შიდა ქართლი	1930	616,8	1897	606,3	2390	773,5	2196	710,7
ქვემო ქართლი	2051	406,3	1930	382,3	2310	466,0	2291	462,2
გურია	1909	1375,4	1866	1344,4	1684	1208,9	1664	1194,5
სამცხე-ჯავახეთი	1610	774,4	1508	725,3	2158	1029,1	2024	965,2
მცხეთა-მთიანეთი	965	817,1	860	728,2	1230	1135,7	1117	1031,4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	788	1645,1	786	1640,9	788	1652,0	785	1645,7
სხვა უფეება	1020	--	1018	--	2002	--	1985	--
საქართველო	31088	709,2	29201	666,1	44673	1012,8	42147	955,5

ცხრილი 4.100 ტრავმები, მოწამვლები და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგი, გავრცელება გავშვებში რეგისტრაციის მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რამდენი სტატისტიკური შემთხვევა	არამალექტობა	აბსოლუტური შემთხვევა	ინციდენტობა	რამდენი სტატისტიკური შემთხვევა	არამალექტობა	აბსოლუტური შემთხვევა	ინციდენტობა
აფხაზეთი	188	--	179	--	178	--	178	--
აჭარა	1240	1895,2	1239	1893,6	967	1471,8	934	1421,6
თბილისი	1232	648,7	1108	583,4	1233	630,7	1152	589,3
კახეთი	893	1295,5	883	1281,0	906	1316,9	903	1312,5
იმერეთი	1204	1011,2	1162	975,9	1267	1064,7	1236	1038,7
სამეგრელო	603	751,0	570	709,9	731	909,2	714	888,1
შიდა ქართლი	322	599,7	309	575,5	384	728,7	365	692,6
ქვემო ქართლი	418	482,6	379	437,5	407	481,1	396	468,1
გურია	588	2468,5	584	2451,7	555	2331,9	553	2323,5
სამცხე-ჯავახეთი	323	905,3	302	846,4	495	1382,7	485	1354,7
მცხეთა-მთიანეთი	166	818,9	142	700,5	207	1118,9	197	1064,9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	118	1435,5	118	1435,5	96	1185,2	96	1185,2
სსპა უწყვეტა	3	--	3	--	2	--	2	--
საქართველო	7298	970,2	6978	927,7	7428	986,6	7211	957,8

ცხრილი 4.101 ტრავმების, მოწამვლების და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების შედეგების დიაგნოზით სტატისტიკური ანგარიშების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	სულ		მათ შორის გავშვები		სულ		მათ შორის გავშვები	
	სტატისტიკური შემთხვევა	ლეტალობა (%)	სტატისტიკური შემთხვევა	ლეტალობა (%)	სტატისტიკური შემთხვევა	ლეტალობა (%)	სტატისტიკური შემთხვევა	ლეტალობა (%)
ტრავმები, დამწვრობები და მოწამვლები	23754	2,7	2684	1,2	21636	2,7	2287	1,0
მათ შორის								
მოტოციკლები	7355	2,5	789	1,0	7043	2,3	559	1,2
თერმული და ქიმიური დამწვრობები	601	6,8	247	1,2	565	5,0	280	0,7
სამკურნალო ნივთიერებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლები	2286	0,6	217	0	2025	1,1	264	0
უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების სუბსტანციების ტოქსიური ეფექტები	2104	0,5	281	0	1798	1,5	142	0

ცხრილი 4.102 ტრავმების, მოწამვლების და გარეგანი მიზეზების ზემოქმედების შედეგების ღიაგნოვით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2009							
	სულ			მათ შორის ბავშვები			
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)	ლეტალობა (%) 1 წლამდე ბავშვებში
ატარა	1565	46	2,9	138	2	1,4	10,0
თბილისი	9731	241	2,5	1292	14	1,1	1,2
ქანეთი	1432	42	2,9	145	0	0	0
იმერეთი	3918	81	2,1	408	3	0,7	4,0
სამხრეთი	1322	84	6,4	68	2	2,9	0
შიდა ქართლი	922	28	3,0	126	1	0,8	0
ქვემო ქართლი	577	22	3,8	50	0	0	0
გურია	380	2	0,5	16	0	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	313	14	4,5	39	1	2,6	0
მცხეთა-მთიანეთი	566	23	4,1	1	0	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	117	0	0	4	0	0	0
თავდაცვის სამინისტრო	793	9	1,1	0	0	0	0
საქართველო	21636	592	2,7	2287	23	1,0	1,9

ცხრილი 4.103 სისხლის და სისხლგამდი ორგანოების დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 1998 - 2009								
	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალე-ტობა	ახალი შემთხვე-ვები	ინციდენ-ტობა	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალე-ტობა	ახალი შემთხვე-ვები	ინციდენ-ტობა
1988	11423	211,7	4061	75,23	9691	757,8	3818	277,36
1990	10688	197,0	3311	61,07	8872	693,3	2932	216,32
1995	8788	183,3	3499	67,81	6719	675,2	2563	206,99
1996	9827	210,2	4978	97,50	6857	723,1	3218	262,63
2000	13189	296,2	6784	152,4	5576	613,0	2909	319,8
2001	16330	371,0	8511	193,4	6966	753,6	3826	413,9
2002	16442	376,1	7730	176,8	7469	815,4	4022	439,1
2003	14695	339,5	7400	170,9	7072	836,4	3700	437,6
2004	16175	370,0	8605	196,8	8233	898,9	4848	529,3
2005	16305	373,0	8505	194,6	8651	944,5	4955	541,0
2006	17048	387,6	9397	213,7	7624	959,6	4391	552,7
2007	19030	433,6	10264	233,9	7975	1039,5	4854	632,7
2008	19546	445,9	11672	266,3	8501	1130,2	5686	755,9
2009	25064	568,2	17653	400,2	12414	1648,8	10285	1366,1

ცხრილი 4.104 სისხლის და სისხლგამადი ორგანოების დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრემალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრემალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	2265	--	1148	--	1941	--	870	--
აჭარა	1630	427,5	1124	294,8	3188	828,9	2331	606,1
თბილისი	2599	234,8	1246	112,6	3288	287,1	1871	163,3
კახეთი	1507	375,2	881	219,3	2130	528,4	1540	382,0
იმერეთი	3380	487,1	2166	312,1	4834	693,4	3590	515,0
სამეგრელო	2236	477,9	1485	317,4	2645	561,6	1977	419,7
შიდა ქართლი	1421	454,1	895	286,0	1613	522,0	1235	399,7
ქვემო ქართლი	1490	295,2	976	193,3	1861	375,4	1518	306,2
გურია	1171	843,7	857	617,4	1791	1285,7	1540	1105,5
სამცხე-ჯავახეთი	1047	503,6	390	187,6	890	424,4	548	261,3
მცხეთა-მთიანეთი	429	363,3	332	281,1	503	464,5	423	390,6
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	336	701,5	156	325,7	309	647,8	152	318,7
სსპა უფლებები	35	--	16	--	71	--	58	--
საქართველო	19546	445,9	11672	266,3	25064	568,2	17653	400,2

ცხრილი 4.105 სისხლის და სისხლგამადი ორგანოების დაავადებების გავრცელება გავრცელებულ რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრემალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრემალენტობა	ასალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	1038	--	721	--	884	--	474	--
აჭარა	895	1367,9	703	1074,4	1703	2592,1	1495	2275,5
თბილისი	733	386,0	368	193,8	993	507,9	817	417,9
კახეთი	666	966,2	441	639,8	1062	1543,6	856	1244,2
იმერეთი	1697	1425,2	1160	974,2	2814	2364,7	2412	2026,9
სამეგრელო	812	1011,3	484	602,8	1180	1467,7	983	1222,6
შიდა ქართლი	595	1108,2	395	735,7	818	1552,2	679	1288,4
ქვემო ქართლი	796	919,0	504	581,9	1144	1352,2	974	1151,3
გურია	758	3182,2	577	2422,3	1188	4991,6	1072	4504,2
სამცხე-ჯავახეთი	244	683,9	130	364,3	286	798,9	238	664,8
მცხეთა-მთიანეთი	167	823,9	138	680,8	233	1259,5	208	1124,3
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	98	1192,2	63	766,4	101	1246,9	71	876,5
ასპა უფლებები	2	--	2	--	8	--	6	--
საქართველო	8501	1130,2	5686	755,9	12414	1648,8	10285	1366,1

ცხრილი 4.106 სისხლის და სისხლგამადი ორგანოების დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2009					
	სტაციონარიდან გავიდა			მათ შორის ბავშვები 0-15	
	სულ	მათ შორის გარდაიცვალა	ლეტალობა (%)	სულ	ლეტალობა (%)
აჭარა	281	6	2,1	22	4,3
თბილისი	516	13	2,5	274	1,1
კახეთი	29	0	0	0	0
იმერეთი	122	2	1,6	52	0
სამეგრელო	63	1	1,6	0	0
შიდა ქართლი	2	1	50,0	0	0
ქვემო ქართლი	9	0	0	0	0
გურია	1	0	0	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	0	0	0	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	0	0	0	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი	0	0	0	0	0
სსკპ უფლებები	5	0	0	0	0
საქართველო	1028	23	2,2	349	1,1

ცხრილი 4.107 ანემიების გავრცელება, საქართველო, 2003 – 2009							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
რეგისტრირებული შემთხვევები	13378	14578	14236	14102	15828	16670	21914
<i>პრეპალენტობა 100000 მოსახლეზე</i>	<i>309,0</i>	<i>333,5</i>	<i>325,6</i>	<i>320,7</i>	<i>360,7</i>	<i>380,3</i>	<i>496,8</i>
ახალი შემთხვევები	7400	8115	7751	8024	8976	10419	16012
<i>ინციდენტობა 100000 მოსახლეზე</i>	<i>170,9</i>	<i>185,6</i>	<i>177,3</i>	<i>182,5</i>	<i>204,5</i>	<i>237,7</i>	<i>363,0</i>

ცხრილი 4.108 ანემიების გავრცელება 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, საქართველო, 2003 - 2009							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
რეგისტრირებული შემთხვევები	6465	7665	7851	6662	6930	7594	11449
<i>პრეპალენტობა</i>	<i>764,6</i>	<i>825,9</i>	<i>857,2</i>	<i>838,5</i>	<i>903,3</i>	<i>1009,6</i>	<i>1520,7</i>
ახალი შემთხვევები	3550	4626	4636	3883	4416	5177	9666
<i>ინციდენტობა</i>	<i>419,9</i>	<i>504,9</i>	<i>506,1</i>	<i>488,7</i>	<i>575,6</i>	<i>688,2</i>	<i>1283,8</i>

ცხრილი 4.109 ანემიების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	1766	--	1045	--	1941	--	825	--
აჭარა	1414	370,8	975	255,7	3188	828,9	2039	530,2
თბილისი	1766	159,6	870	78,6	3288	287,1	1382	120,7
კახეთი	1374	342,0	834	207,6	2130	528,4	1459	361,9
იმერეთი	3097	446,3	2022	291,4	4834	693,4	3361	482,1
სამეგრელო	2070	442,4	1403	299,9	2645	561,6	1901	403,6
შიდა ქართლი	1279	408,8	794	253,8	1613	522,0	1188	384,5
ქვემო ქართლი	1304	258,3	864	171,2	1861	375,4	1305	263,3
გურია	1152	830,0	848	611,0	1791	1285,7	1529	1097,6
სამცხე-ჯავახეთი	713	343,0	154	74,1	890	424,4	500	238,4
მცხეთა-მთიანეთი	366	309,9	291	246,4	503	464,5	324	299,2
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	334	697,3	154	321,5	309	647,8	147	308,2
სსკპ უფლებები	35	--	0	--	70	--	52	--
საქართველო	16670	380,3	10419	237,7	25064	568,2	16012	363,0

ცხრილი 4.110 საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 1988 - 2009								
	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
1988	259211	4802,9	79482	1472,7	78738	6157,2	33950	2654,8
1990	597037	11006,5	362417	6681,2	167613	13098,9	127683	9978,3
1995	246690	4590,9	125867	2439,4	78603	6341,5	55708	5069,6
1996	132784	2467,6	79424	1555,7	48925	3953,2	42620	3993,9
2000	81198	1823,8	27999	628,9	9900	1088,4	5954	654,6
2001	97651	2203,8	39997	902,7	12250	1353,1	7114	785,9
2002	98854	2261,3	36380	832,2	15249	1664,8	10193	1112,8
2003	103803	2397,9	39759	918,5	11414	1350,0	6813	805,8
2004	113272	2591,1	41885	958,1	13398	1462,8	8085	882,7
2005	161769	3700,5	84876	1941,6	18123	1978,6	12609	1376,6
2006	141047	3207,1	56599	1286,9	14926	1878,7	9605	1208,9
2007	216640	4936,7	120659	2749,5	23700	3089,2	17872	2329,5
2008	198957	4538,5	92400	2107,8	24501	3257,2	16901	2246,9
2009	280680	6363,3	166087	3765,4	25164	3342,3	19030	2527,6

ცხრილი 4.111 საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები, პრევალენტობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2009				
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	მათ შორის ბავშვებში	
			რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა
საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები	280680	6363,3	25164	3342,3
მათ შორის				
პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლის და მკვების ავადმყოფობები	126584	2869,8	7912	1050,9
საყლაკავის, კუჭის და თორმეტბოჯა ნაწლავის დაავადებები	62519	1273,0	4364	579,6
მათ შორის: კუჭისა და თორმეტბოჯა ნაწლავის წყლული	19322	438,1	206	27,4
გასტრიტი, ღვრღნეტი	40001	906,9	3133	416,1
ღვიძლის ავადმყოფობები	4641	105,2	92	12,2
ნაღვლის ბუშტის, ნაღვლის ბუშტისა და პანკრეასის დაავადებები	58265	1320,9	3507	465,8
მათ შორის: ქოლერითი, ქოლერისტიტი	43925	995,8	2030	269,6
მწვავე პანკრეატიტი და პანკრეასის სხვა დაავადებები	2450	55,5	32	4,3

ცხრილი 4.112 საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები, ინციდენტობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2009				
	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	მათ შორის ბავშვებში	
			ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
საქმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები	166087	3765,4	19030	2527,6
მათ შორის				
პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლის და მკვების ავადმყოფობები	106420	2412,7	7309	970,8
საყლაკავის, კუჭის და თორმეტბოჯა ნაწლავის დაავადებები	23135	524,5	2795	371,2
მათ შორის: კუჭისა და თორმეტბოჯა ნაწლავის წყლული	5149	116,7	99	13,1
გასტრიტი, ღვრღნეტი	16360	370,9	2076	275,7
ღვიძლის ავადმყოფობები	2003	45,4	41	5,4
ნაღვლის ბუშტის, ნაღვლის ბუშტისა და პანკრეასის დაავადებები	17720	401,7	1822	242,0
მათ შორის: ქოლერითი, ქოლერისტიტი	12660	287,0	1001	132,9
მწვავე პანკრეატიტი და პანკრეასის სხვა დაავადებები	1088	24,7	23	3,1

ცხრილი 4.113 სატელის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები, ინციდენტობა რეპირების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	აბსოლუტური შემთხვევები	ინციდენტობა	მ.შ. ბავშვები		აბსოლუტური შემთხვევები	ინციდენტობა	მ.შ. ბავშვები	
			აბსოლუტური შემთხვევები	ინციდენტობა			აბსოლუტური შემთხვევები	ინციდენტობა
აფსაზემები	4684	--	953	--	3711	--	839	--
ატარა	2469	647,5	589	900,2	7413	1927,5	1701	2589,0
თბილისი	55084	4977,3	10940	5760,6	73150	6386,4	8628	4413,3
პანკეი	4548	1132,2	660	957,5	8405	2085,1	1495	2173,0
იმერეთი	7376	1063,0	1283	1077,5	22458	3221,6	1561	1311,8
სამგერელი და ჯემო სპანეთი	5230	1117,8	909	1132,1	8373	1777,7	1227	1526,1
შიდა ქართლი	3799	1214,1	460	856,8	7854	2541,7	981	1861,5
ქვემო ქართლი	3166	627,2	335	386,7	5567	1123,1	847	1001,2
გურია	878	632,6	340	1427,4	2489	1786,8	795	3340,3
სამცხე-ჯავახეთი	2242	1078,4	94	263,5	2977	1419,6	288	804,5
მცხეთა-მთიანეთი	1529	1294,7	258	1272,8	2517	2324,1	537	2902,7
რატა-ლენსუმი და ქვემო სპანეთი	876	1828,8	75	912,4	675	1415,1	92	1135,8
სსპა უფრვა	519	--	5	--	20498	--	39	--
საქართველო	92400	2107,8	16901	2246,9	166087	3765,4	19030	2527,6

ცხრილი 4.114 სატელის მომწოდებელი სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2009				
	სულ გასული ავადმყოფები	ლეტალობა %	მ.შ. ბავშვები	ლეტალობა %
სატელის მომწოდებელი სისტემის დაავადებები	30694	1,8	4207	0,1
გათ შორის				
პირის ღრუს, სანერწყვე ჯირკვლების და ყვების ავადმყოფობები	735	0	156	0
კუჭისა და თირკმეტოჯა ნაწლავის ფეულე	2586	2,1	21	0
გასტრიტი, ღუღუნეტი	1156	1,6	223	0
ღვიძლის ავადმყოფობები	843	15,2	13	15,4
ქოლენიტი, ქოლენისტიტი და სანაღველე გზების სსპა დაავადებები	4409	0,6	33	0

ცხრილი 4.115 საჭმლის მომწოდებელი სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	სულ		მათ შორის ბავშვები		სულ		მათ შორის ბავშვები	
	სტაციონარიდან გადის	ლეტალობა	სტაციონარიდან გადის	ლეტალობა	სტაციონარიდან გადის	ლეტალობა	სტაციონარიდან გადის	ლეტალობა
აჭარა	2460	2,3	315	0	2640	1,8	675	0,1
თბილისი	13642	2,1	1615	0,4	12542	2,2	1591	0,2
კახეთი	1974	1,9	298	0	2150	1,5	243	0
იმერეთი	5040	1,5	202	0	4628	1,5	361	0
სამეგრელო და ზემო სვანეთი	1718	0,6	149	0	1259	1,7	112	0
შიდა ქართლი	2099	1,0	327	0	2233	1,3	324	0
ქვემო ქართლი	2376	1,2	316	0	3023	1,0	536	0
გურია	706	1,0	109	0	619	2,1	118	0
სამცხე-ჯავახეთი	707	0,7	121	0	620	0,6	225	0
მცხეთა-მთიანეთი	723	1,1	1	0	146	2,1	1	0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	346	0,3	14	0	251	1,2	21	0
სსკ უფყვბა	519	1,0	0	0	583	0,9	0	0
საქართველო	32346	1,7	3467	0,2	30694	1,8	4207	0,1

ცხრილი 4.116 ნერვული სისტემის დაავადებების გავრცელება საქართველო, 2006 - 2009								
	სულ				ბავშვები 0-15 წლამდე			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალან-ტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტობა	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრეპალან-ტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენ-ტობა
2006	92154	2095,4	31898	725,3	22329	2810,4	8102	1019,8
2007	93749	2136,3	26013	592,8	22003	2868,0	6555	854,4
2008	104523	2384,3	29049	662,6	22224	2954,5	6267	833,2
2009	121062	2744,6	45489	1031,3	27474	3649,1	13149	1746,4

ცხრილი 4.117 ნერვული სისტემის დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რამოსტრიკული შემთხვევები	პრემალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რამოსტრიკული შემთხვევები	პრემალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	7808	--	2273	--	6398	--	1483	--
აჭარა	4924	1291,4	2138	560,7	6367	1655,5	2453	637,8
თბილისი	45562	4116,9	7277	657,5	52972	4624,8	12965	1131,9
პანკისი	6986	1739,1	2801	697,3	8332	2067,0	3199	793,6
იმერეთი	15061	2170,5	5933	855,0	15012	2153,5	7023	1007,5
სამეგრელო	6698	1431,5	1799	384,5	6563	1393,4	2288	485,8
შიდა ქართლი	5519	1763,8	2060	658,4	8725	2823,6	5969	1931,7
ქვემო ქართლი	5161	1022,4	2186	433,0	5127	1034,3	2430	490,2
გურია	904	651,3	294	211,8	1170	839,9	582	417,8
სამცხე-ჯავახეთი	2403	1155,8	695	334,3	1681	801,6	545	259,9
მცხეთა-მთიანეთი	2057	1741,7	970	821,3	2655	2451,5	1653	1526,3
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1108	2313,2	356	743,2	1476	3094,3	477	1000,0
სსკპ უწყვეტობა	332	--	267	--	4584	--	4422	--
საქართველო	104523	2384,3	29049	662,6	121062	2744,6	45489	1031,3

ცხრილი 4.118 ნერვული სისტემის დაავადებების გავრცელება გავრცელებული რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რამოსტრიკული შემთხვევები	პრემალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რამოსტრიკული შემთხვევები	პრემალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	742	--	410	--	669	--	415	--
აჭარა	1050	1604,8	604	923,1	891	1356,2	392	596,7
თბილისი	13656	7190,8	2104	1107,9	14733	7536,1	4329	2214,3
პანკისი	936	1357,9	437	634,0	942	1369,2	539	783,4
იმერეთი	1476	1239,6	556	467,0	1689	1419,3	845	710,1
სამეგრელო	1102	1372,5	448	558,0	1195	1486,3	666	828,4
შიდა ქართლი	1499	2792,0	830	1545,9	4913	9322,6	4278	8117,6
ქვემო ქართლი	1329	1534,3	746	861,2	1790	2115,8	1294	1529,6
გურია	187	785,1	47	197,3	336	1411,8	210	882,4
სამცხე-ჯავახეთი	109	305,5	11	30,8	147	410,6	72	201,1
მცხეთა-მთიანეთი	105	518,0	58	286,1	119	643,2	84	454,1
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	28	340,6	11	133,8	31	382,7	10	123,5
სსკპ უწყვეტობა	5	--	5	--	19	--	15	--
საქართველო	22224	2954,5	6267	833,2	27474	3649,1	13149	1746,4

ცხრილი 4.119 ნერვული სისტემის დაავადებების გავრცელება ზოგიერთი ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რამდენი შემთხვევაა	პრემალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რამდენი შემთხვევაა	პრემალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
ნერვული სისტემის დაავადებები	104523	2384,3	29049	662,6	121062	2744,6	45489	1031,3
მათ შორის								
ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი დაავადებები	3821	87,2	1155	26,3	3857	87,4	1163	26,4
ცენტრალური ნერვული სისტემის პირველადი დაზიანებით გამოწვეული სისტემური ატროფიები	1560	35,6	433	9,9	1598	36,2	542	12,3
მულტიპლარული და მოძრაობის მოუღიწველობები	5624	128,3	1265	28,9	7650	173,4	2055	46,6
ნერვული სისტემის სხვა დამენერაციული და დამენერაციით მიმდინარე დაავადებები	1950	44,5	547	12,5	2173	49,3	756	17,1
პერიფერული და პაროქსიზმული დარღვევები	19067	434,9	4119	94,0	21802	494,3	5772	130,9
მათ შორის: ეპილეფსია და ეპილეფსიის სტატუსი	8559	195,2	1291	29,4	8928	202,4	1450	32,9
პერიფერული ნერვული სისტემის დაავადებები	36633	835,6	12333	281,3	40272	913,0	16230	368,0
ცენტრალური დაზიანება და სხვა პარალიზური სინდრომები	5068	115,6	1376	31,4	5738	130,1	1720	39,0

ცხრილი 4.120 ნერვული სისტემის დაავადებების გავრცელება გავრცელებულ ნოზოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რამდენი შემთხვევაა	პრემალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რამდენი შემთხვევაა	პრემალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
ნერვული სისტემის დაავადებები	22224	2954,5	6267	833,2	27474	3649,1	13149	1746,4
მათ შორის								
ცენტრალური ნერვული სისტემის ანთებითი დაავადებები	236	31,4	95	12,6	260	34,5	141	18,7
ცენტრალური ნერვული სისტემის პირველადი დაზიანებით გამოწვეული სისტემური ატროფიები	67	8,9	20	2,7	89	11,8	33	4,4
მულტიპლარული და მოძრაობის მოუღიწველობები	338	44,9	77	10,2	514	68,3	224	29,8
ნერვული სისტემის სხვა დამენერაციული და დამენერაციით მიმდინარე დაავადებები	80	10,6	29	3,9	120	15,9	52	6,9
პერიფერული და პაროქსიზმული დარღვევები	4844	644,0	1582	210,3	5068	673,1	1668	221,5
მათ შორის: ეპილეფსია და ეპილეფსიის სტატუსი	2169	288,4	322	42,8	2237	297,1	325	43,2
პერიფერული ნერვული სისტემის დაავადებები	1639	217,9	583	77,5	1440	191,3	407	54,1
ცენტრალური დაზიანება და სხვა პარალიზური სინდრომები	1641	218,2	246	32,7	1873	248,8	489	64,9

ცხრილი 4.121 ნერვული სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ღებულობა, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	სტაციონარიდან გავიდა	ღებულობა %	სტაციონარიდან გავიდა	ღებულობა %
ნერვული სისტემის დაავადებები	7212	3,3	5486	4,8
<i>მათ შორის</i>				
გავრცედა გერმანული დაავადება	195	1,0	146	2,1
პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები	896	4,0	1070	1,2

ცხრილი 4.122 ნერვული სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ღებულობა, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	სტაციონარიდან გავიდა	ღებულობა (%)	მათ შორის 1 წლამდე ასაკის		სტაციონარიდან გავიდა	ღებულობა (%)	მათ შორის 1 წლამდე ასაკის	
			გავიდა	ღებულობა (%)			გავიდა	ღებულობა (%)
ნერვული სისტემის დაავადებები	2374	0,9	780	1,2	1539	1,5	586	1,9
<i>მათ შორის</i>								
გავრცედა გერმანული დაავადება	184	1,1	25	0	137	2,2	41	2,5
პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები	276	1,1	214	0,5	267	0	206	0

ცხრილი 4.123 ნევროლოგიური პროფილის საწოდების გუშარების მარკმენებლები რეპირემების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	საწოდება რაოდენობა	დაყოფნა	დატვირთვა	ბრუნვა	საწოდება რაოდენობა	დაყოფნა	დატვირთვა	ბრუნვა
აჭარა	35	9,4	182,9	20,3	30	8,2	158,3	19,9
თბილისი	165	8,4	186,2	22,6	165	6,1	121,6	20,2
იმერეთი	49	9,3	195,9	22,0	29	6,0	168,4	28,9
სამეგრელო	5	5,0	354,4	70,2	8	5,2	272,4	52,4
შიდა ქართლი	0	0	0	0	2	5,1	92,0	18,0
ქვემო ქართლი	28	5,5	84,3	15,6	025	4,2	62,0	14,9
გურია	10	5,7	75,4	13,3	10	5,5	54,1	9,7
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	5	9,9	263,2	27,4	5	7,2	140,8	19,6
სსკა უწყება	22	9,3	205,6	22,1	22	11,6	238,5	20,5
საქართველო	319	8,3	180,1	22,2	296	6,5	135,5	21,1

ცხრილი 4.124 ნერგული სისტემის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა და ლეტალობა რეპრონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	სტაციონარიდან გავიდა		ლეტალობა (%)		სტაციონარიდან გავიდა		ლეტალობა (%)	
	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	ბავშვები	სულ	მათ შორის ბავშვები	სულ	ბავშვები
ავსაზეთი	5	0	0	0	0	0	0	0
აჭარა	579	167	2,9	0	618	115	4,9	0
თბილისი	4090	1443	3,3	1,1	2364	811	4,1	1,5
კახეთი	329	29	6,1	0	323	27	1,2	3,7
იმერეთი	884	515	1,9	1,0	970	456	4,4	0,7
სამეგრელო	254	29	1,6	0	296	46	0	0
შიდა ქართლი	418	94	6,5	0	340	43	16,8	16,3
ქვემო ქართლი	253	57	4,7	0	87	19	14,9	0
გურია	50	36	0	0	74	18	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	98	4	4,1	0	102	4	6,9	0
მცხეთა-მთიანეთი	1	0	0	0	11	0	9,1	0
რაჭა-ლეჩხუმი	33	0	0	0	13	0	0	0
სსკა უფლებები	218	0	0	0	288	0	3,5	0
საქართველო	7212	2374	3,3	0,9	5486	1539	4,8	1,5

ცხრილი 4.125 ნერგული სისტემის ორგანოებზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა და ლეტალობა, საქართველო, 2007 - 2009						
	2007		2008		2009	
	რაოდენობა	ლეტალობა %	რაოდენობა	ლეტალობა %	რაოდენობა	ლეტალობა %
სულ	2649	3,8	3239	3,6	3450	2,7
თავის ტვინზე	944	7,9	1020	7,1	1101	6,6
ფარისებრი ტვინზე	138	0	198	0	133	2,3
ტვინის გარსებზე	71	5,6	60	10,0	284	0
პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	142	0	103	6,8	144	0,7
გულ-სისხლძარღვთა დისტრუქციის ფონზე	1194	0	1742	0,1	1701	0,1

ცხრილი 4.126 ნერგული სისტემის ორგანოებზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების განაწილება რეპრონების მიხედვით, საქართველო, 2009						
	სულ	მათ შორის				
		თავის ტვინზე	ფარისებრი ტვინზე	ტვინის გარსებზე	პერიფერიულ ნერვულ სისტემაზე	გულ-სისხლძარღვთა დისტრუქციის ფონზე
აჭარა	293	36	3	0	0	254
თბილისი	2356	905	111	140	135	978
იმერეთი	1	1	0	0	0	0
სამეგრელო	532	96	4	131	0	301
შიდა ქართლი	132	32	0	11	0	89
ქვემო ქართლი	43	9	15	0	1	18
სსკა უფლებები	93	22	0	0	0	61
საქართველო	3450	1101	133	284	144	1701

ცხრილი 4.127	თვალის და მისი დანაბრების დაავადებების გავრცელება
--------------	---

საქართველო, 2006 - 2009								
	სულ				მათ შორის გავშვებში			
	რეგისტრ. შემოს. ვეგები	პრეპალენ ტობა	ასალი შემოს. ვეგები	ინციდენ ტობა	რეგისტრ. შემოს. ვეგები	პრეპალენ ტობა	ასალი შემოს. ვეგები	ინციდენ ტობა
2006	83434	1897,1	30137	685,2	13243	1666,8	7346	924,6
2007	86322	1967,1	24573	560,0	14340	1869,1	7473	974,1
2008	104858	2391,9	35072	800,0	17102	2273,6	8648	1149,7
2009	123384	2797,3	47797	1083,6	19241	2555,6	10415	1383,3

ცხრილი 4.128 თვალის და მისი დანამატების დაავადებების გავრცელება ზოგიერთი ნოვოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირებული შემოს. ვეგები	პრეპალენ ტობა	ასალი შემოს. ვეგები	ინციდენ ტობა	რეგისტრირებული შემოს. ვეგები	პრეპალენ ტობა	ასალი შემოს. ვეგები	ინციდენ ტობა
თვალის და მისი დანამატების დაავადებები	104858	2391,9	35072	800,0	123384	2797,3	47797	1083,6
მათ შორის								
ბროლის დაზიანებები (კატარაქტა)	29394	670,5	8662	197,6	33967	770,1	11341	257,1
გლაუკომა	9938	226,7	2496	56,9	10962	248,5	3277	74,3
თვალის, თვალის კუნთების, და მისი დანამატების დაავადებები	29595	675,1	10545	240,5	36488	827,2	15168	343,9

ცხრილი 4.129 თვალის და მისი დანამატების დაავადებების გავრცელება გავშვებში ზოგიერთი ნოვოლოგიის მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირებული შემოს. ვეგები	პრეპალენ ტობა	ასალი შემოს. ვეგები	ინციდენ ტობა	რეგისტრირებული შემოს. ვეგები	პრეპალენ ტობა	ასალი შემოს. ვეგები	ინციდენ ტობა
თვალის და მისი დანამატების დაავადებები	17102	2273,6	8648	1149,7	19241	2555,6	10415	1383,3
მათ შორის								
ბროლის დაზიანებები (კატარაქტა)	208	27,7	70	9,3	313	41,6	159	21,1
გლაუკომა	75	10,0	20	2,7	78	10,4	23	3,1
თვალის, თვალის კუნთების, და მისი დანამატების დაავადებები	7809	1038,2	2448	325,4	8703	1155,9	2926	388,6

ცხრილი 4.130 თვალის და მისი დანაშაულების დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	6531	--	2163	--	6732	--	2090	--
აჭარა	10974	2878,0	6321	1657,7	15215	3956,1	8316	2162,2
თბილისი	48634	4394,5	9494	857,9	58493	5106,8	15386	1343,3
კახეთი	6447	1604,9	2728	679,1	6299	1562,6	2685	666,1
იმერეთი	14580	2101,2	6073	875,2	14776	2119,6	6099	874,9
სამეგრელო	3403	727,3	1129	241,3	4492	953,7	2272	482,4
შიდა ქართლი	3645	1164,9	1477	472,0	3292	1065,4	1688	546,3
ქვემო ქართლი	3151	624,2	2053	406,7	4193	845,9	3422	690,3
გურია	1465	1055,5	506	364,6	2412	1731,5	1408	1010,8
სამცხე-ჯავახეთი	2415	1161,6	1633	785,5	2097	1000,0	1308	623,7
მცხეთა-მთიანეთი	1693	1433,5	754	638,4	2179	2012,0	1203	1110,8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	703	1467,6	277	578,3	1132	2373,2	500	1048,2
სსკ უფლებები	1217	--	464	--	2072	--	1420	--
საქართველო	104858	2391,9	35072	800,0	123384	2797,3	47797	1083,6

ცხრილი 4.131 თვალის და მისი დანაშაულების დაავადებების გავრცელება გავრცელებული რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რეგისტრირებული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	705	--	388	--	855	--	509	--
აჭარა	2138	3267,6	1389	2122,9	2730	4155,3	1750	2663,6
თბილისი	8353	4398,4	4131	2175,2	8493	4344,2	3821	1954,5
კახეთი	785	1138,8	469	680,4	806	1171,5	451	655,5
იმერეთი	2722	2286,1	1014	851,6	2690	2260,5	1306	1097,5
სამეგრელო	409	509,4	177	220,5	533	662,9	297	369,4
შიდა ქართლი	831	1547,8	336	625,8	1342	2546,5	840	1593,9
ქვემო ქართლი	560	646,5	399	460,6	957	1131,2	790	933,8
გურია	263	1104,1	137	575,1	446	1873,9	349	1466,4
სამცხე-ჯავახეთი	131	367,2	75	210,2	119	332,4	89	248,6
მცხეთა-მთიანეთი	141	695,6	96	473,6	193	1043,2	161	870,3
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	59	717,8	33	401,5	71	876,5	47	580,2
სსკ უფლებები	5	--	4	--	6	--	5	--
საქართველო	17102	2273,6	8648	1149,7	19241	2555,6	10415	1383,3

ცხრილი 4.132 თვალის და მისი დანამატების დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა, საქართველო, 2008 - 2009						
	2008			2009		
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის ბავშვები		სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის ბავშვები	
		0-15 წლამდე	0-1 წლამდე		0-15 წლამდე	0-1 წლამდე
თვალის და მისი დანამატების დაავადებები	5533	227	14	4809	205	6
<i>მათ შორის</i>						
ბროლის დაზიანებები (კატარაქტა)	3069	26	0	2587	22	0
გლავოპია	518	6	2	519	4	0

ცხრილი 4.133 ოფტალმოლოგიური პროფილის საფოლთა მუშაობის მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	საფოლთა რაოდენობა	დაყოფილი	დატვირთვა	ბრუნვა	საფოლთა რაოდენობა	დაყოფილი	დატვირთვა	ბრუნვა
აჭარა	13	2,0	154,1	76,5	13	2,0	103,8	52,8
თბილისი	149	4,2	77,4	18,5	83	3,8	95,8	25,1
კახეთი	10	1,1	43,0	39,8	5	1,0	54,4	52,6
იმერეთი	7	1,2	49,9	41,9	8	1,2	38,4	33,1
სამეგრელო	2	1,0	109,0	109,0	2	1,0	2,5	2,5
შიდა ქართლი	0	0	0	0	0	0	0	0
ქვემო ქართლი	0	0	0	0	0	0	0	0
გურია	3	0,7	3,7	5,0	3	2,0	5,3	2,7
ხაშვილი ჯავახეთი	0	0	0	0	0	0	0	0
საქართველო	184	3,0	79,2	26,2	114	3,0	86,8	29,1

ცხრილი 4.134 ძირუბიული ოპერაციები თვალზე და მის დანამატებზე, საქართველო, 2006 - 2009				
	2006	2007	2008	2009
<i>სტაციონარში ჩატარებული ოპერაციები</i>				
ს უ ლ	3795	3634	5748	5124
გლავოპიის გაყოფა	316	373	603	594
მენსკევიჩის	152	132	149	132
კატარაქტის გაყოფა	2073	2077	3651	2803
<i>ამბულატორიული ოპერაციები</i>				
ს უ ლ	2831	3949	5214	6751
გლავოპიის გაყოფა	329	415	450	730
კატარაქტის გაყოფა	1725	2624	3297	4123
მიკრომიკრობიული	1455	2431	2212	3162

ცხრილი 4.135 თვალზე და მის დანამატებზე სტაციონარში ჩატარებული ძირუბრიული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008-2009								
	2008				2009			
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		
		გლუპორომის ბაჟო	მეპლმაცია	კატარაჟტის ბაჟო		გლუპორომის ბაჟო	მეპლმაცია	კატარაჟტის ბაჟო
აჭარა	967	38	1	762	684	52	2	478
თბილისი	2498	272	87	1131	2075	169	82	663
კახეთი	238	34	5	185	250	40	9	187
იმერეთი	1555	232	56	1169	1410	229	33	956
სამეგრელო	226	5	0	206	234	5	4	203
შიდა ქართლი	7	3	0	2	248	79	0	164
მვერ ქართლი	116	14	0	93	81	13	0	65
გურია	0	0	0	0	8	0	0	0
სამცხე-ჯავახეთი	15	0	0	0	52	5	0	47
რაჭა-ლეკსუმი	48	4	0	0	0	0	0	0
სსვა უწყება	77	1	0	0	82	2	2	40
საქართველო	5748	603	149	3651	5124	594	132	2803

ცხრილი 4.136 თვალზე და მის დანამატებზე აბულატორიულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში ჩატარებული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 – 2009								
	2008				2009			
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		
		მიკრომი-რურბია	გლუპ-კომის ბაჟო	კატარაჟტის ბაჟო		მიკრომი-რურბია	გლუპ-კომის ბაჟო	კატარაჟტის ბაჟო
აჭარა	183	147	14	122	31	31	0	0
თბილისი	3921	1943	356	2536	5784	2640	676	3455
კახეთი	0	0	0	0	0	0	0	0
იმერეთი	796	105	80	566	569	433	44	384
სამეგრელო	29	6	6	6	7	7	0	0
შიდა ქართლი	0	0	0	0	0	0	0	0
მვერ ქართლი	183	11	0	0	119	20	0	99
გურია	73	0	0	73	151	11	0	139
სამცხე-ჯავახეთი	29	0	0	0	14	0	0	0
რაჭა-ლეკსუმი	0	0	0	0	56	0	10	46
სსვა უწყება	0	0	0	0	20	20	0	0
საქართველო	5214	2212	450	3297	6751	3162	730	4123

ცხრილი 4.137 ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 2006 - 2009								
	სულ				მათ შორის გავრცელება			
	რეგისტრ. შემთხვევები	პრეპულქ ტოპა	ასალი შემთხვევები	ოვოღქ ტოპა	რეგისტრ. შემთხვევები	პრეპულქ ტოპა	ასალი შემთხვევები	ოვოღქ ტოპა
2006	26352	599,2	15982	363,4	7821	984,4	5883	740,5
2007	27799	633,5	15382	350,5	8570	1117,0	6568	856,1
2008	32167	733,8	19900	453,9	8859	1177,7	6872	913,6
2009	42031	952,9	28289	641,3	13682	1817,2	11621	1543,5

ცხრილი 4.138 ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებების გავრცელება, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	32167	733,8	19900	453,9	42031	952,9	28289	641,3
მათ შორის								
შუა ყურის ანთებები	15053	343,4	9000	205,3	18789	426,0	12587	285,4

ცხრილი 4.139 ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებების გავრცელება ბავშვებში, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებები	8859	1177,7	6872	913,6	13682	1817,2	11621	1543,5
მათ შორის								
შუა ყურის ანთებები	4904	652,0	3419	454,5	6621	879,4	5333	708,3

ცხრილი 4.140 ყურის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებების გავრცელება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა	რემისტრიკული შემთხვევები	პრევალენტობა	ახალი შემთხვევები	ინციდენტობა
აფხაზეთი	5166	--	1952	--	4725	--	1477	--
აჭარა	1777	466,0	1172	307,4	4442	1155,0	3091	803,7
თბილისი	8284	748,5	5297	478,6	10935	954,7	6885	601,1
კახეთი	3112	774,7	2435	606,2	3099	768,8	2240	555,7
იმერეთი	6062	873,6	4048	583,4	8293	1189,6	6444	924,4
სამეგრელო	2351	502,5	1162	248,3	2926	621,2	1718	364,8
შიდა ქართლი	1309	418,3	891	284,8	2265	733,0	1917	620,4
ქვემო ქართლი	1458	288,8	1057	209,4	1874	378,1	1595	321,8
გურია	817	588,6	674	485,6	1025	735,8	883	633,9
სამცხე-ჯავახეთი	467	224,6	202	97,2	784	373,9	600	286,1
მცხეთა-მთიანეთი	578	489,4	319	270,1	507	468,1	400	369,3
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	370	772,4	288	601,3	352	737,9	246	515,7
სსკპ ყფშევა	416	--	403	--	804	--	793	--
საქართველო	32167	733,8	19900	453,9	42031	952,9	28289	641,3

ცხრილი 4.141 მუხრის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებების გავრცელება გავშვებში რეპროდუქციის მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009								
	2008				2009			
	რეპროდუქციის შემთხვევები	პრეპალენ ტოპა	ახალი შემთხვევები	ინციდენცია ტოპა	რეპროდუქციის შემთხვევები	პრეპალენ ტოპა	ახალი შემთხვევები	ინციდენცია ტოპა
აფხაზეთი	992	--	559	--	826	--	518	--
აჭარა	560	855,9	372	568,5	2084	3172,0	1741	2649,9
თბილისი	2483	1307,5	2181	1148,4	3051	1560,6	2700	1381,1
კახეთი	727	1054,7	624	905,3	911	1324,1	697	1013,1
იმერეთი	1461	1227,0	1093	917,9	2496	2097,5	2180	1831,9
სამეგრელო	799	995,1	552	687,5	1026	1276,1	748	930,3
შიდა ქართლი	357	664,9	288	536,4	1158	2197,3	1089	2066,4
ქვემო ქართლი	567	654,6	434	501,0	897	1060,3	824	974,0
გურია	558	2342,6	516	2166,2	669	2810,9	634	2663,9
სამცხე-ჯავახეთი	73	204,6	35	98,1	282	787,7	253	706,7
მცხეთა-მთიანეთი	171	843,6	122	601,9	184	994,6	155	837,8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	101	1228,7	89	1082,7	98	1209,9	82	1012,3
სსკა უწყვეტა	10	--	7	--	0	--	0	--
საქართველო	8859	1177,7	6872	913,6	13682	1817,2	11621	1543,5

ცხრილი 4.142 მუხრის და ღვრილისებრი მორჩის დაავადებების დიაგნოზით სტაციონარიდან გასული ავადმყოფების რაოდენობა, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გავშვები	სტაციონარიდან გავიდა	მათ შორის გავშვები
აჭარა	469	4	372	4
თბილისი	122	35	131	27
კახეთი	6	0	2	0
იმერეთი	123	63	112	78
სამეგრელო	8	0	4	0
შიდა ქართლი	2	0	0	0
ქვემო ქართლი	76	37	115	51
გურია	6	0	1	0
სამცხე-ჯავახეთი	0	0	0	0
მცხეთა-მთიანეთი	0	0	0	0
რაჭა-ლეჩხუმი	0	0	0	0
სსკა უწყვეტა	16	0	16	0
საქართველო	828	139	753	160

ცხრილი 4.143 სტაციონარში მუხრზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციები, საქართველო, 2006 - 2009				
	2006	2007	2008	2009
ს უ ლ	156	187	245	308
მათ შორის გავშვებში	6	48	15	3

ცხრილი 4.144 სტაციონარში ყურადღება ჩატარებული ძირუბიული ოპერაციების განაწილება რეგიონების მიხედვით, საქართველო, 2008 - 2009				
	2008		2009	
	სულ	მათ შორის გავრცელებული	სულ	მათ შორის გავრცელებული
აჭარა	69	0	72	1
თბილისი	146	4	210	2
კახეთი	0	0	7	0
იმერეთი	15	0	13	0
სამეგრელო	2	1	6	0
ქვემო ქართლი	13	10	0	0
სსკა უწყება	0	0	0	0
საქართველო	245	15	308	3

თავი 5

ზოგიერთი დემოგრაფიული და ჯანდაცვის მონაცემი საქართველოს რაიონების მიხედვით

ცხრილი 5.1 ზოგიერთი დემოგრაფიული მონაცემი, საქართველო, 2009				
რაიონი, რაიონი	მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (ათასეული)	ცოცხალშობილთა რიცხოვნობა	გარდაცვლილთა რიცხოვნობა	ბუნებრივი მატება
აჭარა	384,6	6322	2950	3372
ბათუმი	123,0	1793	1233	560
ქედი	20,1	441	206	235
ქობულეთი	90,4	1341	586	755
შუახევი	22,5	439	153	286
ხელვაჩაური	93,4	1572	573	999
ხულო	35,2	736	199	537
თბილისი	1145,4	16696	12397	4299
ქვემო	403,1	5378	4972	406
ახმეტა	41,8	561	436	125
გურჯაანი	69,9	896	1049	-153
დემოფლისწყარო	30,4	408	421	-13
თელავი	70,2	908	910	-2
ლაგოდეხი	51,5	765	535	230
საბარეო	59,3	886	583	303
სიღნაღი	43,0	482	557	-75
ყვარელი	37,0	472	481	-9
იმერეთი	697,1	9776	8318	1458
ქუთაისი	190,7	3403	2508	895
ბაღდათი	28,6	319	346	-27
კანი	33,8	367	384	-17
ჯესტაფონი	75,3	941	873	68
თერჯოლა	44,8	518	509	9
სამტრედი	60,1	777	624	153
საჩხერე	47,1	942	582	360
ტყიბული	30,0	387	378	9
წყალტუბო	73,3	703	659	44
ჭიათურა	54,9	752	764	-12
ხარაბაული	27,4	317	356	-39
ხონი	31,1	350	335	15
სამეგრელო	471,0	6187	4976	1211
ფოთი	47,6	709	753	-44
აბაშა	27,8	361	429	-68
ჯუბილი	173,3	2025	1110	915
მარტვილი	44,6	603	597	6
მესტია	14,5	238	107	131
სენაკი	52,0	748	665	83
ჩხორიწყუ	30,0	447	427	20
წალენჯიხა	40,2	563	463	100
ხობი	41,0	493	425	68

რეგიონი, რაიონი	მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (ათასეული)	ცოცხალშობილთა რიცხოვნობა	გარდაცვლილთა რიცხოვნობა	გუნებრივი მატება
შიდა ქართლი	309,0	4801	3575	1226
გორი	143,3	2341	1588	753
კასპი	52,4	734	645	89
ქარელის	51,1	785	459	326
ხაშური	62,2	941	883	58
ცხინვალი	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	495,7	7283	3896	3387
რუსთავი	118,7	1666	1261	405
ბოლნისი	77,3	1188	424	764
ბარდბანი	96,8	1458	794	664
ღვინისი	28,4	397	251	146
თეთრიწყარო	27,3	313	328	-15
მარნეული	125,1	1962	718	1244
წალკა	22,1	299	120	179
გურია	139,3	2034	1610	424
ლაგხეთი	38,8	496	486	10
ოჯურბეთი	77,5	1155	809	346
ჩოქატაური	23,0	383	315	68
სამცხე - ჯავახეთი	209,7	2912	1884	1028
ალიბანი	20,6	385	233	152
ასპინძა	12,8	220	146	74
ახალქალაქი	63,0	760	317	443
ახალციხე	47,3	668	550	118
ბორჯომი	31,6	425	500	-75
ნინოწმინდა	34,4	454	138	316
მცხეთა - მთიანეთი	108,3	1465	1280	185
ახალგორი	--	--	--	--
ღუშეთი	33,6	404	338	66
თიანეთი	13,2	174	176	-2
მცხეთა	56,6	782	665	117
ყაზბეგი	4,9	105	101	4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	47,7	523	767	-244
ამბროლაური	14,6	132	344	-212
ლენტეხი	9,0	131	49	82
ონი	8,5	97	183	-86
ცაგერი	15,6	163	191	-28
სამართლმლო	4410,9	63377	46625	16752

ცხრილი 5.2 ზოგიერთი დემოგრაფიული მაჩვენებელი, საქართველო, 2009			
რეგიონი, რაიონი	შობადობა (1000 მოსახლეზე)	სიკვდილიანობა (1000 მოსახლეზე)	გუნებრივი მატება (1000 მოსახლეზე)
აჭარა	16,4	7,7	8,8
ბათუმი	14,6	10,0	4,6
ქედი	21,9	10,2	11,7
ქობულეთი	14,8	6,5	8,4
შუახევი	19,5	6,8	12,7
ხელვაჩაური	16,8	6,1	10,7
ხულო	20,9	5,7	15,3
თბილისი	14,6	10,8	3,8
ქვემო	13,3	12,3	1,0
ახმეტა	13,4	10,4	3,0
გურჯაანი	12,8	15,0	-2,2
დემოფლისწყარო	13,4	13,8	-0,4
თელავი	12,9	13,0	0,0
ლაგოდეხი	14,9	10,4	4,5
საბარეო	14,9	9,8	5,1
სიღნაღი	11,2	13,0	-1,7
ყვარელი	12,8	13,0	-0,2
იმერეთი	14,0	11,9	2,1
ქუთაისი	17,8	13,2	4,7
ბაღდათი	11,2	12,1	-0,9
კანი	10,9	11,4	-0,5
ზესტაფონი	12,5	11,6	0,9
თერჯოლა	11,6	11,4	0,2
სამტრედი	12,9	10,4	2,5
საჩხერე	20,0	12,4	7,6
ტყიბული	12,9	12,6	0,3
წყალტუბო	9,6	9,0	0,6
ჭიათურა	13,7	13,9	-0,2
ხარაბაული	11,6	13,0	-1,4
ხონი	11,3	10,8	0,3
სამეგრელო	13,1	10,6	2,6
ფოთი	14,9	15,8	-0,9
აბაშა	13,0	15,4	-2,4
ზუგდიდი	11,7	6,4	5,3
მარტვილი	13,5	13,4	0,1
მესტია	16,4	7,4	9,0
სენაკი	14,4	12,8	1,6
ჩხოროწყუ	14,9	14,2	0,7
წალენჯიხა	14,0	11,5	2,5
სოფი	12,0	10,4	1,7

რეგიონი, რაიონი	შოგადობა (1000 მოსახლემ)	სიკვდილიანობა (1000 მოსახლემ)	ბუნებრივი მატება (1000 მოსახლემ)
შიდა ქართლი	15,5	11,6	4,0
გორი	16,3	11,1	5,3
კასპი	14,0	12,3	1,7
ქარელი	15,4	9,0	6,4
ხაშური	15,1	14,2	0,9
ცხინვალი	--	--	--
ქვემო ქართლი	14,7	7,9	6,8
რუსთავი	14,0	10,6	3,4
ბოლნისი	15,4	5,5	9,9
ბარდბანი	15,1	8,2	6,9
ღვინისი	14,0	8,8	5,1
თეთრიწყარო	11,5	12,0	-0,5
მარნეული	15,7	5,7	9,9
წალკა	13,5	5,4	8,1
გურია	14,6	11,6	3,0
ლაგხე უთი	12,8	12,5	0,3
ოჯურბეთი	14,9	10,4	4,5
ჩოხატაური	16,7	13,7	3,0
სამცხე - ჯავახეთი	13,9	9,0	4,9
ალიგენი	18,7	11,3	7,4
ასპინძა	17,2	11,4	5,8
ასალქალაქი	12,1	5,0	7,0
ასალციხე	14,1	11,6	2,5
ბორჯომი	13,4	15,8	-2,4
ნინოწმინდა	13,2	4,0	9,2
მცხეთა - მთიანეთი	13,5	11,8	1,7
ასალგორი	--	--	--
ღუშეთი	12,0	10,1	2,0
თიანეთი	13,2	13,3	-0,2
მცხეთა	13,8	11,7	2,1
ყაზბეგი	21,4	20,6	0,8
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	11,0	16,1	-5,1
ამგროლაური	9,0	23,6	-14,5
ლენტეხი	14,6	5,4	9,1
ონი	11,4	21,5	-10,1
ცაგერი	10,4	12,2	-1,8
სამართველო	14,4	10,6	3,8

ცხრილი 5.3 საწოლთა ფონდი და მისი გამოყენება, საქართველო, 2009					
რეგიონი, რაიონი	საანგარიშო წლის პოლუს ფაქტობრივად გაწეული საწოლთა რაოდენობა	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	ბრუნვა	დაყოფილება	დატვირთვა
აფხაზეთი	16	--	10,5	4,3	45,0
აჭარა	1036	269,4	28,1	6,1	172,5
ბათუმი	778	632,5	30,3	6,4	194,4
ქედა	40	199,0	13,2	3,8	50,6
ქობულეთი	98	108,4	30,8	4,4	133,7
სუბსეპი	45	200,0	15,2	7,2	111,5
ხელვაჩაური	20	21,4	7,4	6,6	47,8
სულ	55	156,3	20,7	5,6	115,4
თბილისი	5716	499,0	25,9	6,4	166,8
ქახეთი	660	163,7	26,2	4,2	110,2
ახმეტა	80	191,4	19,7	4,3	85,8
გურჯაანო	125	178,8	19,2	3,7	70,0
ღმდოფელისწყარო	35	115,1	48,8	4,6	227,5
თელავი	155	220,8	28,0	4,6	126,9
ლაგოდეხი	62	120,4	32,3	4,9	157,7
საბარეჯო	82	138,3	29,1	3,8	109,5
სიღნაღი	56	130,2	29,4	3,6	106,3
ყვარელი	65	175,7	19,0	3,9	73,4
იმერეთი	2385	342,1	20,5	7,2	146,8
ქუთაისი	853	447,3	34,1	5,3	180,9
ტყიბული	30	100,0	31,3	2,5	77,5
წყალტუბო	40	54,6	8,8	4,9	42,8
ჭიათურა	190	346,1	15,7	5,6	88,4
ბაღდათი	60	209,8	3,4	6,4	21,6
პანო	40	118,3	11,5	3,4	39,5
ზემტაფონი	170	225,8	25,7	5,4	138,7
თერჯოლა	100	223,2	12,9	3,7	48,1
სამტრედიი	146	242,9	17,6	3,2	57,3
საჩხერე	156	331,2	34,0	6,2	211,6
ხარაგაულის	20	73,0	8,9	4,7	41,7
სონი	580	1865,0	1,6	104,2	175,5
სამეგრელო	962	204,2	21,8	5,8	127,6
ზუგდიდი	313	180,6	27,3	5,9	162,0
აბაშა	75	269,8	13,5	7,0	94,7
მარტვილი	60	134,5	30,3	5,3	161,6
სენაკი	178	342,3	19,6	5,8	115,6
ჩხოროწყუ	51	170,0	18,1	5,0	90,4
ჭალქეჯისა	63	156,7	21,2	5,9	124,3
სოხი	90	219,5	14,6	5,1	74,6
ფოთი	105	220,6	19,1	6,4	121,9
მესტია	27	186,2	18,7	5,2	97,1

რეგიონი, რაიონი	საანგარიშო წლის ბოლოს ფაქტობრივად გაშლილ საწოლთა რაოდენობა	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	ბრუნვა	დაყოვნება	დატვირთვა
შიდა ქართლი	594	192,2	23,4	6,2	146,1
გორი	205	143,1	39,6	4,0	157,8
კასპი	42	80,2	21,7	3,8	82,9
ქარელის	57	111,5	38,2	4,2	161,8
ხაშური	290	466,2	9,4	15,3	143,8
ცხინვალის	--	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	845	170,5	19,9	6,1	121,0
რუსთავის	288	242,6	28,7	4,0	114,9
ბოლნისის	80	103,5	27,0	4,3	116,0
ბარდაბანის	90	93,0	19,4	2,6	50,1
ღვინის	30	105,6	8,7	3,9	34,1
თეთრიწყაროს	45	164,8	20,2	4,6	93,6
მარნეულის	185	147,9	17,0	3,8	65,0
წალკის	127	574,7	2,7	110,1	295,9
გურია	264	189,5	19,4	5,3	103,3
ლაგოდეხის	40	103,1	32,5	4,5	148,5
ოკუპაციის	189	243,9	16,1	5,7	92,2
ჩოქატაურის	35	152,2	22,7	4,9	112,1
სამცხე - ჯავახეთი	633	301,9	13,0	8,2	106,1
აღიანის	203	985,4	4,4	44,6	194,8
ახანის	40	312,5	6,4	5,4	34,8
ახალქალაქის	101	160,3	15,2	4,8	72,7
ახალციხის	86	181,8	39,4	3,0	116,9
ბორჯომის	98	310,1	14,2	3,9	55,2
ნინოწმინდის	105	305,2	7,1	4,6	32,6
მცხეთა - მთიანეთი	131	121,0	27,0	3,3	87,6
ახალგორის	--	--	--	--	--
დუშეთის	55	163,7	9,8	5,1	49,7
თიანეთის	25	189,4	17,7	5,0	88,5
მცხეთის	33	58,3	73,8	2,5	180,8
ყაზბეგის	18	367,3	6,7	4,7	31,4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	215	450,7	9,4	6,5	61,7
ამბროლაურის	65	445,2	5,9	6,1	36,2
ლენტეხის	60	666,7	7,6	9,5	71,8
ოგის	35	411,8	9,5	6,1	58,2
ცაგერის	55	352,6	15,6	5,3	83,3
სამართლებლო	13633	309,1	23,4	6,3	148,2

ცხრილი 5.4 რესურსების გამოყენების მაჩვენებლები, საქართველო, 2009					
რეგიონი, რაიონი	სტაციონარული განსული აგაღმყოფების რაოდენობა	კონსტიტუციური მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე	საწოდება რაოდენობა სტაციონარული მომსახურება 1 მძიმეზე	მიმართულება აგაღმყოფულ-პოლიტიკური დაწესებულებებში	მიმართულება 1 სულ მოსახლეზე
აფხაზეთი	168	--	1,6	189981	-
აჭარა	29082	7561,6	1,7	722854	1,9
ბათუმი	23570	19162,6	1,6	342933	2,8
ქუდა	526	2616,9	2,7	26827	1,3
ქობულეთი	3017	3337,4	1,8	129976	1,4
ფუანევი	686	3048,9	2,4	16177	0,7
ხეღუანუარი	147	157,4	2,2	173501	1,9
ხულო	1136	3227,3	2,5	33440	1,0
თბილისი	146947	12829,3	1,0	2821149	2,5
კახეთი	17293	4290,0	1,3	641155	1,6
ანეჭა	1578	3775,1	1,4	57746	1,4
გურჯაანო	2401	3434,9	1,9	99188	1,4
ღმლოფლისწყუარი	1708	5618,4	1,3	85185	2,8
თელავი	4333	6172,4	1,5	160598	2,3
ლაგოდეხი	2005	3893,2	1,2	54973	1,1
საბარეჭო	2388	4027,0	0,9	71213	1,2
სიღნაღი	1647	3830,2	1,0	56882	1,3
ყვარელი	1233	3332,4	1,1	55370	1,5
იმერეთი	48712	6987,8	2,0	1217015	1,7
ქუთაისი	29113	15266,4	1,3	420978	2,2
ტყიბული	938	3126,7	1,4	33878	1,1
ფეალტუბო	353	481,6	1,5	79606	1,1
ჭიათურა	2986	5439,0	1,8	61625	1,1
ბაღდათი	203	709,8	2,9	66453	2,3
კანი	461	1363,9	1,9	19771	0,6
ჟესტაფონი	4374	5808,8	2,3	104903	1,4
თერჯოლა	1289	2877,2	2,6	86608	1,9
სამტრედიი	2576	4286,2	3,0	92507	1,5
საჩხერე	5303	11259,0	1,6	173928	3,7
სარაბაული	177	646,0	1,5	28571	1,0
სონი	939	3019,3	13,6	48187	1,5
სამეგრელო	20885	4434,2	1,8	552225	1,2
ზუბიდი	8548	4932,5	1,8	183872	1,1
აბაზა	1013	3643,9	1,9	37426	1,3
მარტვილი	1816	4071,7	1,5	58587	1,3
სენაკი	3492	6715,4	2,7	59880	1,2
ჩხოროწყუ	922	3073,3	1,8	35882	1,2
ჭალენჯიხი	1333	3315,9	1,5	55864	1,4
სოპი	1312	3200,0	1,4	36348	0,9
ფოთი	2001	4203,8	1,8	65142	1,4
მესტია	448	3089,7	2,2	19224	1,3

რეგიონი, რაიონი	სტაციონარიდან გასული აგადგომების რაოდენობა	კონსტიტუციის მარკინგული 100000 მოსახლეობა	საყოფა რაოდენობა სტაციონარში მომუშავე 1 მომხმ.	მიმართვაში აგადგომის კოორდინატურ დაწესებულებაში	მიმართვაში 1 სულ მოსახლეობა
შიდა ქართლი	13921	4505,2	1,9	515982	1,7
გორი	8110	5659,5	1,3	252325	1,8
პასკი	910	1736,6	1,1	47945	0,9
ქარელი	2178	4262,2	1,4	62040	1,2
საშური	2723	4377,8	3,6	153672	2,5
ცხინვალი	--	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	16841	3397,4	1,9	440161	0,9
რუსთავი	8272	6968,8	1,3	152682	1,3
ბოლნისი	2156	2789,1	2,4	36436	0,5
ბარდბანი	1748	1805,8	2,3	141564	1,5
დმანისი	261	919,0	2,1	30461	1,1
თმთრიფხარი	909	3329,7	1,6	20729	0,8
მარნეული	3138	2508,4	2,1	54477	0,4
წალკა	357	1615,4	8,1	3812	0,2
გურია	5133	3684,9	2,2	196273	1,4
ლანჩხუთი	1300	3350,5	1,5	63455	1,6
ოჯურბეთი	3040	3922,6	2,5	100784	1,3
ჩოხატაური	793	3447,8	2,1	32034	1,4
სამცხე - ჯავახეთი	8199	3909,9	3,3	258867	1,2
აღიბეი	884	4291,3	7,3	27197	1,3
ასპინძა	257	2007,8	10,0	12706	1,0
ახალქალაქი	1531	2430,2	3,7	41071	0,7
ახალციხე	3386	7158,6	1,5	96964	2,0
ბორჯომი	1395	4414,6	1,8	59714	1,9
ნინოწმინდა	746	2168,6	4,6	21215	0,6
მცხეთა - მთიანეთი	7058	3268,7	2,4	137230	1,3
ახალგორი	--	--	--	--	--
ღუშეთი	539	1604,2	1,5	24668	0,7
თიანეთი	443	3356,1	2,8	9018	0,7
მცხეთა	2437	4305,7	0,6	87081	1,5
ყაზბეგი	121	2469,4	2,6	16463	3,4
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	2029	4253,7	3,0	50207	1,1
ამბროლაური	386	2643,8	3,6	21348	1,5
ლენტეხი	453	5033,3	4,6	7202	0,8
ონი	331	3894,1	2,5	8846	1,0
ცაგერი	859	5506,4	2,1	12811	0,8
საქართველო	316993	7186,6	1,4	7889951	1,8

ცხრილი 5.5 ლეტალობის მაჩვენებლები, საქართველო, 2009			
რეგიონი, რაიონი	ლეტალობა (%)		
	სულ	ბავშვები 15 წლამდე	ბავშვები 1 წლამდე
აფხაზეთი	4,2	0,0	0,0
აჭარა	1,8	1,3	3,2
ბათუმი	1,9	1,7	3,9
ქედა	0,0	0,0	0,0
ქობულეთი	1,6	0,1	0,3
სუახევი	0,9	0,0	0,0
ხელვაჩაური	0,0	0,0	0,0
სულ	0,1	0,0	0,0
თბილისი	2,5	2,3	5,1
კახეთი	1,9	0,7	1,8
ახმეტა	1,0	0,0	0,0
გურჯაანი	1,7	0,1	0,4
ღმდოფლისწყარო	0,9	0,3	0,0
თელავი	2,3	1,5	4,1
ლაგოდეხი	2,8	2,6	8,1
საბარეჯო	1,6	0,2	0,8
სიღნაღი	1,3	0,4	0,8
ყვარელი	2,6	0,0	0,0
იმერეთი	2,0	1,6	3,9
ქუთაისი	2,6	2,4	5,5
ტყიბული	0,0	0,0	0,0
წყალტუბო	0,3	0,0	0,0
ჭიათურა	0,7	0,0	0,0
ბაღდათი	0,5	0,0	0,0
კანი	1,5	0,0	0,0
ჯესტაფონი	0,4	1,7	2,3
თერჯოლა	0,4	0,0	0,0
სამტრედიი	2,2	0,0	0,0
საჩხერე	2,1	0,0	0,0
ხარაგაული	0,0	0,0	0,0
ხონი	1,1	0,0	0,0
სამეგრელო	1,1	0,2	0,6
ჯუგდიდი	1,7	0,3	0,8
აბაშა	0,0	0,0	0,0
მარტვილი	0,2	0,0	0,0
სენაკი	0,8	0,2	0,4
ჩხოროწყუ	0,2	0,5	1,2
ჭალქიძისა	0,0	0,0	0,0
ხობი	0,3	0,0	0,0
ფოთი	2,2	0,2	0,6

რეგიონი, რაიონი	ლბტალობა (%)		
	სულ	გაფრეზები 15 წლამდე	გაფრეზები 1 წლამდე
შიდა ქართლი	1,9	0,8	2,4
გორი	1,9	1,0	2,6
კასპი	1,0	2,9	4,8
ქარელი	1,6	0,0	0,0
საშური	2,5	0,3	1,7
ცხინვალის	--	--	--
მესტია	0,7	0,7	3,3
ქვემო ქართლი	1,4	0,4	1,1
რუსთავი	2,0	0,5	1,2
ბოლნისი	1,0	0,5	0,9
ბარდბაბანი	0,0	0,0	0,0
ღვინისი	0,3	0,0	0,0
თეთრიწყარო	1,1	0,0	0,0
მარნეული	0,8	0,4	14,3
წალკა	2,0	3,2	0,0
გურია	1,7	0,2	0,4
ლაწხის	1,7	0,4	0,6
ოჭურბეთი	2,2	0,1	0,4
ჩოხატაური	0,4	0,0	0,0
სამცხე - ჯავახეთი	1,6	0,6	1,1
აღიგანი	0,4	0,0	0,0
ასპინძა	0,4	0,0	0,0
ახალქალაქი	0,7	1,1	3,2
ახალციხე	2,4	0,4	1,0
ბორჯომი	2,1	1,1	1,3
ნინოწმინდა	0,1	0,0	0,0
მცხეთა - მთიანეთი	2,7	1,1	3,4
ახალგორი	--	--	--
ღუშეთი	3,5	5,6	14,3
თიანეთი	1,6	0,0	0,0
მცხეთა	2,8	1,0	3,6
ყაზბეგი	1,7	0,0	0,0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	1,1	0,0	0,0
ამბროლაური	3,1	0,0	0,0
ლენტეხი	0,0	0,0	0,0
ონი	0,9	0,0	0,0
ცაგერი	0,7	0,0	0,0
სამართლებლო	2,1	1,5	3,6

ცხრილი 5.6 სამეურნალო-პროფილაქტიკური ღაფისებულებების სამედიცინო კადრები, საქართველო, 2009					
	მედიკთა რაოდენობა, ფიზიკური პირი	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	საშუალო სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	საშუალო სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა 1 მედიკზე
აფხაზეთი	235	--	129	--	0,5
აჭარა	1107	287,8	1321	343,5	1,2
ბათუმი	809	657,7	879	714,6	1,1
ქედი	23	114,4	38	189,1	1,7
ქობულეთი	130	143,8	210	232,3	1,6
უბახევი	30	133,3	46	204,4	1,5
ხედიკაჩაური	82	87,8	76	81,4	0,9
ხულო	33	93,8	72	204,5	2,2
თბილისი	9274	809,7	5345	466,6	0,6
კახეთი	1112	275,9	814	201,9	0,7
ახმეტი	100	239,2	86	205,7	0,9
გურჯაანი	185	264,7	116	166,0	0,6
დელიფლისწყარი	67	220,4	53	174,3	0,8
თელიკი	273	388,9	169	240,7	0,6
ლაგოდეხი	143	277,7	128	248,5	0,9
საბარეკო	142	239,5	99	166,9	0,7
სიღნაღი	101	234,9	78	181,4	0,8
მკარელი	101	273,0	85	229,7	0,8
იმერეთი	2363	339,0	2200	315,6	0,9
ქუთაისი	1246	653,4	961	503,9	0,8
ტიბუღი	60	200,0	40	133,3	0,7
ფედიტუბო	81	110,5	80	109,1	1,0
ჭიკიურა	152	276,9	158	287,8	1,0
ბაღდათი	65	227,3	51	178,3	0,8
კანი	57	168,6	50	147,9	0,9
ფესტაფონი	179	237,7	183	243,0	1,0
თერჯოლა	69	154,0	92	205,4	1,3
სამტრედი	180	299,5	177	294,5	1,0
სახხერი	144	305,7	225	477,7	1,6
სარაბაული	44	160,6	46	167,9	1,0
სონი	86	276,5	137	440,5	1,6
სამეგრელო	1194	253,5	1208	256,5	1,0
ფუბიდი	436	251,6	444	256,2	1,0
აბაზა	81	291,4	79	284,2	1,0
მარტვილი	84	188,3	82	183,9	1,0
სენაკი	135	259,6	138	265,4	1,0
ჩხორიფუ	66	220,0	97	323,3	1,5
ფალმეხისა	90	223,9	122	303,5	1,4
სონი	100	243,9	103	251,2	1,0
ფოთი	167	350,8	114	239,5	0,7
მესტია	35	241,4	35	241,4	1,0
შიდი ქართლი	737	238,5	687	222,3	0,9
გორი	359	250,5	321	224,0	0,9
კახი	97	185,1	112	213,7	1,2
ქარელი	97	189,8	83	162,4	0,9
საფური	184	295,8	171	274,9	0,9

	მძიმითა რაოდენობა, ფიზიკური პირი	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	საშუალო სამგდინო პერსონალის რაოდენობა	უზრუნველყოფა 100000 მოსახლეზე	საშუალო სამგდინო პერსონალის რაოდენობა 1 მძიმეზე
ცხინვალში					
ქვემო ქართლი	1100	221,9	946	190,8	0,9
რუსთავი	454	382,5	369	310,9	0,8
ბოლნისი	102	132,0	100	129,4	1,0
ბარდაბანი	181	187,0	123	127,1	0,7
ღმანისი	32	112,7	33	116,2	1,0
თქორიწყარო	69	252,7	60	219,8	0,9
მარნეული	225	179,9	231	184,7	1,0
წალკა	37	167,4	30	135,7	0,8
გურია	290	208,2	337	241,9	1,2
ლაგოდეხი	80	206,2	90	232,0	1,1
ოჯორბეთი	163	210,3	189	243,9	1,2
ჩოხატაური	47	204,3	58	252,2	1,2
სამცხე - ჯავახეთი	419	199,8	522	248,9	1,2
აღიშენი	45	218,4	61	296,1	1,4
ასპინძა	30	234,4	44	343,8	1,5
ახალქალაქი	59	93,7	93	147,6	1,6
ახალციხე	152	321,4	128	270,6	0,8
ბორჯომი	97	307,0	120	379,7	1,2
ნინოწმინდა	36	104,7	76	220,9	2,1
მცხეთა - მთიანეთი	281	259,5	244	225,3	0,9
ახალგორი					
ღუშეთი	87	258,9	64	190,5	0,7
თიანეთი	37	280,3	33	250,0	0,9
მცხეთა	138	243,8	134	236,7	1,0
ყაზბეგი	19	387,8	13	265,3	0,7
რატა-ლენს უში და ქვემო სვანეთი	172	360,6	173	362,7	1,0
აგბროლაური	55	376,7	46	315,1	0,8
ლენტეხი	25	277,8	31	344,4	1,2
ონი	38	447,1	39	458,8	1,0
ცაგერი	54	346,2	57	365,4	1,1
სამხრეთ-დასავლეთი	18486	419,1	14060	318,8	0,8

ცხრილი 5.7 სიცოცხლეში პირველად დადგენილი დიაგნოზით აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა და ინციდენტობა (აბსოლუტურულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2009*						
	შემთხვევათა რაოდენობა სულ	ინციდენტობა	ცვლილება 2008 წლის მიმართ (%-ში)	შემთხვევათა რაოდენობა აბსოლუტურულ-პოლიკლინიკურ დაწესებულებებში		ცვლილება 2008 წლის მიმართ (%-ში)
				სულ	% სამართო რაოდენობიდან	
ავსაზეთი	36033	--	-14,5	13944	38,7	5,6
ატარა	101197	26312,3	90,4	37150	36,7	-51,6
ბათუმი	39261	31919,5	21,4	13818	35,2	-17,1
ქედა	3684	18328,4	95,6	1608	43,6	-68,3
ქობულეთი	14946	16533,2	170,1	6281	42,0	-54,3
შუახევი	3387	15053,3	186,3	1115	32,9	-57,8
ხელვაჩაური	29812	31918,6	280,3	10809	36,3	-83,1
ხულო	10107	28713,1	130,8	3519	34,8	-76,0
თბილისი	339911	29676,2	29,3	118433	34,8	-13,6
კახეთი	100694	24979,9	52,9	34252	34,0	-39,5
ახმეტა	8770	20980,9	432,5	3138	35,8	-91,7
გურჯაანი	13048	18666,7	92,9	4597	35,2	-54,2
ღვთისმშობლისძეგარი	6831	22470,4	11,1	2285	33,5	-34,7
თელავი	29092	41441,6	20,4	9820	33,8	-13,2
ლაგოდეხი	8243	16005,8	57,9	2819	34,2	-34,3
საბარეჯო	11832	19952,8	52,0	4596	38,8	-48,7
სიღნაღი	12769	29695,3	69,6	4177	32,7	-27,8
ყვარელი	10109	27321,6	53,4	2820	27,9	-60,3
იმერეთი	186387	26737,5	40,7	64665	34,7	-34,3
ქუთაისი	66723	34988,5	41,3	16408	24,6	-24,3
ტყეზული	4755	15850,0	30,6	2042	42,9	-27,7
წყალტუბო	11228	15317,9	70,6	4864	43,3	-39,3
ჭიათურა	20973	38202,2	19,9	4944	23,6	-20,2
ბაღდათი	12664	44279,7	29,8	4644	36,7	-33,9
ვახი	8716	25787,0	672,0	2872	33,0	-94,0
ზესტაფონი	11149	14806,1	38,1	7503	67,3	-30,2
თერჯოლა	9006	20102,7	40,8	3170	35,2	-51,5
სამტრედი	12577	20926,8	50,6	7087	56,3	-47,8
საჩხერე	14337	30439,5	43,0	7783	54,3	-25,0
ხარაბაული	7885	28777,4	0,8	1788	22,7	-40,7
ხონი	6374	20495,2	6,0	1560	24,5	-29,3
სამეგრელო	80394	17068,8	59,7	22751	28,3	-43,3
ზუგდიდი	27926	16114,3	59,9	5238	18,8	-22,3
აბაშა	3142	11302,2	37,3	1281	40,8	-46,1
მარტვილი	9779	21926,0	52,5	2290	23,4	-50,4
სენაკი	6119	11767,3	24,1	1528	25,0	-56,2
ჩხორიწყე	4965	16550,0	648,9	1409	28,4	-96,6
წყალენჯიხა	6745	16778,6	93,2	1927	28,6	-42,3
ხობი	6738	16434,1	35,8	2176	32,3	-75,6
ფოთი	10113	21245,8	35,9	5392	53,3	-33,7
მესტია	4867	33565,5	80,0	1510	31,0	-28,6

* რაიონის დონეზე 0-15 წლამდე ასაკის ბავშვთა რაოდენობის მონაცემების არარსებობის გამო ბავშვებში დაავადებების ინციდენტობის გამოთვლა ვერ ხერხდება.

	შემთხვევათა რაოდენობა სულ	ინციდენტობა	ცვლილება 2008 წლის მიმართ (%-ში)	შემთხვევათა რაოდენობა ბავშვებში		ცვლილება 2008 წლის მიმართ (%-ში)
				სულ	% სპორტო რაოდენობიდან	
შიდა ქართლი	86291	27925,9	69,7	37668	43,7	-47,1
გორი	44856	31302,2	68,8	21048	46,9	-48,2
პასვი	10441	19925,6	57,7	3766	36,1	-35,8
ქარელი	13100	25636,0	97,8	2663	20,3	-41,1
ხაშური	17894	28768,5	62,1	10191	57,0	-50,5
ცხინვალი	--	--	--	--	--	--
ძვემო ქართლი	70037	14128,9	28,4	25458	36,3	-36,5
რუსთავი	21535	18142,4	90,0	9140	42,4	-26,1
ბოლნისი	7129	9222,5	36,1	2760	38,7	-13,0
ბარდაბანი	15299	15804,8	23,2	6772	44,3	-23,8
ღმინი	6525	22975,4	142,3	1409	21,6	-67,6
თეთრიწყარო	5332	19531,1	-8,4	1258	23,6	-60,3
მარნეული	11108	8879,3	-27,7	3109	28,0	-82,2
წალკა	3109	14067,9	85,3	1010	32,5	-65,5
გურია	32951	23654,7	36,4	14246	43,2	-20,2
ლაგოდეხი	9536	24577,3	97,1	2927	30,7	-40,5
ოზურგეთი	18600	24000,0	15,6	9178	49,3	-7,1
ჩოქატაური	4815	20934,8	49,0	2141	44,5	-48,3
სამცხე - ჯავახეთი	38086	18162,1	32,3	12684	33,3	-26,3
აღიშენი	3275	15898,1	118,6	1203	36,7	-86,1
ასპინძა	3293	25726,6	97,5	1113	33,8	-60,0
ახალქალაქი	4035	6404,8	-31,6	860	21,3	17,0
ახალციხე	19573	41380,5	42,7	4519	23,1	-14,5
ბორჯომი	6058	19170,9	9,6	4079	67,3	-5,3
ნინოწმინდა	1852	5383,7	292,4	910	49,1	-100,0
მცხეთა - მთიანეთი	34088	31475,5	44,9	9673	28,4	-28,5
ახალგორი	--	--	--	--	--	--
ღუშეთი	7212	21464,3	9,6	2019	28,0	-20,4
თიანეთი	3422	25924,2	-4,6	1050	30,7	3,9
მცხეთა	21126	37325,1	80,0	5585	26,4	-31,8
ყაზბეგი	2328	47510,2	74,0	1019	43,8	-69,0
რაჭა-ლეჩხუმი და ძველი სვანეთი	12153	25478,0	20,4	2608	21,5	-31,9
ამბროლაური	4305	29486,3	36,8	879	20,4	-58,2
ლენტეხი	1741	19344,4	-14,3	486	27,9	46,5
ონი	3034	35694,1	93,6	575	19,0	-44,0
ცაგერი	3073	19698,7	-8,3	668	21,7	-43,9
სამართველი	1169546	26514,9	44,8	394061	33,7	-29,7

ცხრილი 5.8 ბრონქული ასთმით და ასთმური სტატუსით დაავადების ახალი შემთხვევები და ინციდენტობა (ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2008-2009						
	2008			2009		
	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა
	სულ	მათ შორის ბავშვები		სულ	მათ შორის ბავშვები	
აფხაზეთი	91	10	--	61	8	--
აჭარა	190	64	49,8	217	39	56,4
ბათუმი	100	38	81,77	56	7	45,5
ქედი	12	1	60,30	6	1	29,9
ძეგულეთი	13	5	14,51	32	3	35,4
შუახევი	8	4	36,04	17	1	75,6
ხელგანაური	39	11	42,16	76	21	81,4
ხულო	18	5	51,72	30	6	85,2
თბილისი	1143	214	103,3	889	179	77,6
კახეთი	228	14	56,8	283	12	70,2
ახმეტა	5	3	12,05	26	2	62,2
გურჯაანო	26	4	37,14	27	3	38,6
ღვლეფლისწყარო	12	0	39,60	17	0	55,9
თელავი	100	0	143,06	80	0	114,0
ლაგოდეხი	18	4	35,16	38	5	73,8
საბარეჟო	24	0	40,82	48	0	80,9
სიღნაღი	13	2	30,23	25	1	58,1
ყვარელი	30	1	81,08	22	1	59,5
იმერეთი	741	170	106,8	689	120	98,8
ქუთაისი	266	59	141,04	219	43	114,8
ტყიბული	18	2	59,80	32	2	106,7
წყალტუბო	28	0	38,30	27	2	36,8
ჭიათურა	73	17	132,73	80	2	145,7
ბაღდათი	94	26	329,82	129	38	451,0
პანო	16	5	47,48	31	4	91,7
ზესტაფონი	17	7	22,64	29	13	38,5
თერჯოლა	35	6	78,13	26	2	58,0
სამტრედი	30	9	50,17	24	3	39,9
საჩხერე	122	36	260,68	36	9	76,4
ხარაბაული	31	3	113,14	34	2	124,1
ხონი	11	0	35,48	22	0	70,7
სამეგრელო	196	47	41,9	230	51	48,8
გუგდი	57	5	33,24	41	3	23,7
აბაშა	26	9	93,19	28	12	100,7
მარტვილი	35	5	78,83	15	0	33,6
სენაკი	2	0	3,87	19	4	36,5
ნერიოფე	10	3	33,56	38	6	126,7
წალენჯიხა	15	7	37,50	25	2	62,2
სოპი	22	1	53,92	18	5	43,9
ფოთი	25	16	52,74	31	18	65,1
მესტია	4	1	27,78	15	1	103,4

	2008			2009		
	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა
	სულ	მათ შორის ბავშვებში		სულ	მათ შორის ბავშვებში	
შიდა ქართლი	168	4	53,7	288	36	93,2
გორი	55	1	40,53	197	27	137,5
კასპი	10	0	19,31	7	4	13,4
ქარელი	2	0	4,04	32	0	62,6
ხაშური	101	3	164,50	52	5	83,6
ცხინვალში	55	1	40,53	--	--	--
ქვემო ქართლი	160	16	31,7	261	24	52,7
რუსთავი	4	1	3,41	75	9	63,2
ბოლნისი	42	3	55,05	29	0	37,5
ბარდაბანი	19	1	16,87	47	4	48,6
ღმანისი	31	11	109,93	53	9	186,6
თეთრიწყარო	53	0	206,23	14	0	51,3
მარნეული	9	0	7,32	28	0	22,4
წალკა	2	0	9,22	15	2	67,9
გურია	84	44	60,5	102	23	73,2
ლაგოდეხი	15	7	38,76	22	1	56,7
ოჯორბეთი	57	36	73,74	70	19	90,3
ჩოქატაშვილი	12	1	52,63	10	3	43,5
სამცხე - ჯავახეთი	70	0	33,7	93	2	44,3
აღიშენი	6	0	29,41	19	2	92,2
ასპინძა	6	0	47,62	12	0	93,8
ახალქალაქი	14	0	22,47	12	0	19,0
ახალციხე	32	0	68,23	41	0	86,7
ბორჯომი	7	0	22,15	5	0	15,8
ნინოწმინდა	5	0	14,66	4	0	11,6
მცხეთა - მთიანეთი	58	3	49,1	61	0	56,3
ახალგორი	0	0	0,0	--	--	--
ღუშეთი	14	0	42,30	18	0	53,6
თიანეთი	8	0	61,07	6	0	45,5
მცხეთა	29	3	48,82	30	0	53,0
ყაზბეგი	7	0	142,86	7	0	142,9
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	57	2	119,0	46	3	96,4
ამბროლაური	12	1	81,08	11	1	75,3
ლენტეხი	0	0	0,0	7	0	77,8
ოგო	27	0	313,95	10	1	117,6
ცაგერი	18	1	115,38	18	1	115,4
სამხრეთ-დასავლეთი	3189	588	72,8	3323	497	75,3

ცხრილი 5.9 ტიპი I (ინსულირდამოკიდებული) შაქრიანი დიაბეტის ახალი შემთხვევები და ინციდენტობა (ამბულატორულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებების მონაცემები), საქართველო, 2008-2009						
	2008			2009		
	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა
	სულ	მათ შორის ბავშვები		სულ	მათ შორის ბავშვები	
აფხაზეთი	77	1	--	56	1	--
აჭარა	248	4	65,0	346	6	90,0
ბათუმი	102	0	83,40	199	3	161,8
ქედი	6	1	30,15	4	0	19,9
ქობულეთი	87	2	97,10	82	2	90,7
შუახევი	2	0	9,01	4	0	17,8
ხელვაჩაური	41	0	44,32	51	1	54,6
ხულო	10	1	28,74	6	0	17,0
თბილისი	370	3	33,4	505	8	44,1
კახეთი	374	3	93,1	506	6	125,5
ახმეტა	16	0	38,55	21	1	50,2
გურჯაანი	22	0	31,43	63	0	90,1
ღმლოვლისწყარო	12	0	39,60	20	0	65,8
თელავი	119	1	170,24	125	0	178,1
ლაგოდეხი	121	0	236,33	164	0	318,4
საბარეჯო	26	0	44,22	40	5	67,5
სიღნაღი	32	0	74,42	37	0	86,0
ყვარელი	26	2	70,27	36	0	97,3
იმერეთი	560	15	80,7	738	8	105,9
ქუთაისი	202	5	107,10	303	0	158,9
ტიბულა	16	0	53,16	11	2	36,7
წყალტუბო	20	0	27,36	29	0	39,6
ჭიათურა	76	4	138,18	70	4	127,5
ბაღდათი	37	0	129,82	49	0	171,3
კანი	8	0	23,74	11	0	32,5
ჟესტაფონი	36	0	47,94	55	0	73,0
თერჯოლა	31	1	69,20	47	1	104,9
სამტრედი	25	0	41,81	55	0	91,5
სახმერე	66	5	141,03	25	0	53,1
ხარაგაული	22	0	80,29	66	1	240,9
ხონი	21	0	67,74	17	0	54,7
სამეგრელო	147	1	31,4	276	4	58,6
ზუგდიდი	18	0	10,50	62	0	35,8
აბაშა	14	0	50,18	14	0	50,4
მარტვილი	9	0	20,27	95	1	213,0
ხენაკი	14	0	27,08	6	0	11,5
ჩხოროწყუ	9	0	30,20	6	0	20,0
ჭალმეხისა	16	0	40,00	30	1	74,6
ხობი	34	0	83,33	10	0	24,4
ფოთი	33	1	69,62	39	0	81,9
მესტია	0	0	--	14	2	96,6

	2008			2009		
	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა	შემთხვევათა რაოდენობა		ინციდენტობა
	სულ	მათ შორის ბავშვებში		სულ	მათ შორის ბავშვებში	
შიდა ქართლი	279	4	89,2	294	9	95,1
გორი	59	1	43,48	42	6	29,3
კასპი	127	1	245,17	146	1	278,6
ქარელი	28	0	56,57	16	0	31,3
ხაშური	65	2	105,86	90	2	144,7
ცხინვალში	0	0	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	203	4	40,2	206	3	41,6
რუსთავი	35	0	29,84	113	0	95,2
ბოლნისი	15	1	19,66	22	1	28,5
ბარდაბანი	35	3	31,08	28	2	28,9
ღვინისი	4	0	14,18	3	0	10,6
თეთრიწყარო	24	0	93,39	16	0	58,6
მარნეული	90	0	73,17	18	0	14,4
წალკა	0	0	--	6	0	27,1
გურია	57	0	41,1	78	2	56,0
ლაგოდეხი	2	0	5,17	15	1	38,7
ოწორპეთი	32	0	41,40	49	1	63,2
ჩოქატაური	23	0	100,88	14	0	60,9
სამცხე - ჯავახეთი	182	0	87,5	181	6	86,3
აღიგენი	6	0	29,41	12	2	58,3
ასპინძა	9	0	71,43	26	1	203,1
ახალქალაქი	46	0	73,84	15	0	23,8
ახალციხე	102	0	217,48	118	1	249,5
ბორჯომი	4	0	12,66	6	1	19,0
ნინოწმინდა	15	0	43,99	4	1	11,6
მცხეთა - მთიანეთი	57	0	48,3	83	3	76,6
ახალგორი	0	0	--	--	--	--
ღუშეთი	8	0	24,17	8	0	23,8
თიანეთი	5	0	38,17	5	0	37,9
მცხეთა	43	0	72,39	65	3	114,8
ყაზბეგი	1	0	20,41	5	0	102,0
რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	68	0	142,0	80	1	167,7
ამბროლაური	57	0	385,14	67	0	458,9
ლენტეხი	0	0	--	0	0	--
ოწი	1	0	11,63	1	0	11,8
ცაგერო	10	0	64,10	12	1	76,9
სამართველო	2630	35	60,0	3390	57	76,9

ცხრილი 5.10 სასაწყრაო სამედიცინო დახმარების გუზაობა, საქართველო, 2008-2009						
	2008			2009		
	გამოკანებათა რაოდენობა			გამოკანებათა რაოდენობა		
	სულ	გავევებუი	1 სულ მოსასლუჲე	სულ	გავევებუი	1 სულ მოსასლუჲე
აჭარა	67924	11116	0,2	80974	10120	0,2
ბათუმი	34749	1098	0,3	39277	1105	0,3
ქედა	3033	216	0,2	3612	221	0,2
ქობულეთი	13284	4276	0,1	17048	5327	0,2
გუგანუი	2203	1143	0,1	2527	1143	0,1
სელვანაური	11253	4021	0,1	12799	846	0,1
სულო	3402	362	0,1	5711	1478	0,2
თბილისი	320354	13648	0,3	351836	59072	0,3
კახეთი	59469	3445	0,1	65206	4485	0,2
ანკეტა	7047	585	0,2	10064	750	0,2
გურგანანი	8182	374	0,1	8422	536	0,1
დღღოვლისწყარი	5063	412	0,2	5993	378	0,2
თელავი	14038	1362	0,2	15195	1827	0,2
ლაგოდეხი	4506	195	0,1	5051	202	0,1
საბარეო	7073	144	0,1	7193	315	0,1
სიღნაღი	7106	276	0,2	7783	362	0,2
ყვარელი	6454	97	0,2	5505	115	0,1
იმერეთი	94154	11775	0,1	108081	11265	0,2
ქუთაისი	32244	3046	0,2	35636	2703	0,2
ტყიბული	3235	158	0,1	4575	302	0,2
წყალტუბო	8601	517	0,1	8849	577	0,1
ჭიათურა	6435	478	0,1	9224	936	0,2
ბაღდათი	4960	1123	0,2	5216	198	0,2
ვანი	3920	1550	0,1	4647	1397	0,1
წესტაფონი	7600	132	0,1	8288	280	0,1
თერჯოლა	3658	790	0,1	4209	1017	0,1
სამტრედი	7059	1100	0,1	8736	2200	0,1
საწმე	7285	774	0,2	8604	5	0,2
სარაგაული	3187	1750	0,1	3673	1231	0,1
სონი	5970	357	0,2	6424	419	0,2
სამეგრელო	49342	3454	0,1	76625	12632	0,2
წუგდიღი	12818	770	0,1	17019	1020	0,1
აბაშა	7075	306	0,3	8512	335	0,3
მარტვილი	3913	889	0,1	4841	2307	0,1
სენაკი	6671	168	0,1	7582	211	0,1
ჩხოროწყუ	4344	296	0,1	4932	270	0,2
წალენჯიხე	8553	629	0,2	9873	1038	0,2
სოზი	4528	245	0,1	5581	670	0,1
ფოთი	1440	151	0,0	16719	6650	0,4
მესტია	12818	770	0,9	1566	131	0,1

	2008			2009		
	გამოკანცხვამათა რაოდენობა			გამოკანცხვამათა რაოდენობა		
	სულ	გამოკანცხვამი	1 სულ მოსახლეზე	სულ	გამოკანცხვამი	1 სულ მოსახლეზე
შიდა ქართლი	40851	1733	0,1	45177	2102	0,1
გორი	22902	825	0,2	23366	1029	0,2
ქასკი	4620	89	0,1	6123	147	0,1
ქარელი	4312	324	0,1	5195	381	0,1
საშური	9017	495	0,1	10493	545	0,2
ცხინვალე	22902	825	--	--	--	--
ქვემო ქართლი	59314	3287	0,1	65481	6037	0,1
რუსთავი	18910	1393	0,2	20478	1781	0,2
ბოლნისი	6854	511	0,1	8033	678	0,1
გარდაბანი	10619	0	0,1	12641	315	0,1
ღვინისი	3667	196	0,1	2471	215	0,1
თმირიწყარი	4661	309	0,2	5736	728	0,2
მარნეული	11480	183	0,1	12567	1455	0,1
წალკა	3123	695	0,1	3555	865	0,2
გური	24182	1575	0,2	27515	1403	0,2
ღანსუთი	6412	712	0,2	7107	540	0,2
ოჭურბუთი	12238	358	0,2	13201	375	0,2
ჩოხატაური	5532	505	0,2	7207	488	0,3
სამცხე - ჯავახეთი	25657	2275	0,1	28717	3220	0,1
აღიბენი	3367	386	0,2	3715	380	0,2
ასპინძა	3192	375	0,3	3386	766	0,3
ახალქალაქი	3666	47	0,1	3793	41	0,1
ახალციხე	5630	407	0,1	6066	424	0,1
ბორჯომი	6506	740	0,2	8919	1300	0,3
ნინოწმინდა	3296	320	0,1	2838	309	0,1
მცხეთა - მთიანეთი	17282	887	0,1	21735	1063	0,2
ახალგორი	--	--	--	--	--	--
ღუშუთი	4307	219	0,1	4548	225	0,1
თიანეთი	4343	459	0,3	5018	240	0,4
მცხეთა	5445	209	0,1	8624	598	0,2
ყაზბუბი	3187	0	0,7	3545		0,7
რატა-ღმრსუმი და ქვემო სკანეთი	9638	1424	0,2	11782	1300	0,2
ამბროლაური	2982	852	0,2	4516	350	0,3
ღმრსუმი	3513	250	0,4			
ონი	3143	322	0,4	3900	720	0,5
ცაბერი	2982	852	0,2	3366	230	0,2
საქართველო	768167	54619	0,2	883129	112699	0,2

ანბანური საპიკეპი

ინდიკატორი	№№
5 წლამდე ბავშვების მოკვდავობის კოეფიციენტი (MORTALITY UNDER AGE 5, Козффициент смертности детей до 5-летнего возраста)	45
В ჰეპატიტის (3 დოზა) აცრებით მოცვის მაჩვენებელი (HPV VACCINATION COVERAGE, Охват иммунизацией против гепатита В)	107
აბორტი (ABORTION, аборт)	76
აბორტის ასაკობრივი კოეფიციენტი (AGE-SPECIFIC ABORTION RATE, Возрастной козффициент абортов)	79
აბორტის ზოგადი კოეფიციენტი (CRUDE ABORTION RATE, Общий козффициент абортов)	77
აბორტის სიხშირის კოეფიციენტი (ABORTION FREQUENCY, Козффициент частоты абортов)	78
აბორტის ჯამობრივი კოეფიციენტი (TOTAL INDUCED ABORTION RATE, Суммарный козффициент абортов)	80
ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (EARLY NEONATAL MORTALITY RATE, Козффициент ранней неонатальной смертности)	48
ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი სხეულის მასის გათვალისწინებით (EARLY NEONATAL MORTALITY RATE, WEIGHT-SPECIFIC, Козффициент ранней неонатальной смертности с учетом массы тела)	49
ავადობა (MORBIDITY, Заболеваемость)	13
აივ ინფექციით დაავადებულ ორსულთა პროცენტი აივ ინფექციაზე გამოკვლეულ ორსულებში (PERCENTAGE OF HIV INFECTED PREGNANT WOMEN AMONG HIV TESTED PREGNANT WOMEN, Процент ВИЧ инфицированных беременных среди ВИЧ тестированных беременных)	89
აივ ინფექციით დაავადებულთა პროცენტი აივ ინფექციაზე გამოკვლეულ დონორებში (PERCENT OF HIV INFECTED DONORS, Процент ВИЧ инфицированных доноров из общего числа доноров)	92
აივ ინფექციით დაავადებულთა პროცენტი ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში (PERCENT OF HIV INFECTED AMONG TB INFECTED PATIENTS, случаев ВИЧ среди больных туберкулезом)	93
აივ ინფექციის ინციდენტობა (HIV INCIDENCE, Показатель новых случаев ВИЧ инфицирования)	85
აივ ინფიცირებული დედებისაგან დაბადებული აივ ინფიცირებულ ბავშვთა პროცენტი (PERCENTAGE OF HIV INFECTED CHILDREN, BORN BY HIV INFECTED MOTHERS, Процент ВИЧ инфицированных детей, рожденных ВИЧ инфицированными матерями)	91
აივ ინფიცირებული ორსულების ანტირეტროვირუსული პროფილაქტიკური მკურნალობით მოცვის მაჩვენებელი (ANTIRETROVIRAL PREVENTION THERAPY COVERAGE AMONG HIV-INFECTED PREGNANT WOMEN, APB профилактическим лечением ВИЧ инфицированных беременных)	90
ასაკობრივი სტანდარტიზაცია (AGE STANDARDIZATION, Возрастная стандартизация)	7
ახალი მგბ(+) შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი (CASE DETECTION RATIO OF NEW SMEAR-POSITIVE CASES, Показатель выявления новых БК+ случаев)	102

გადაცემის გზების მიხედვით აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების პროცენტული განაწილება (HIV NEW CASES DISTRIBUTION BY WAYS OF TRANSMISSION (HIV) по распределению новых случаев ВИЧ по путям передачи)	86
განმეორებითი მიმართვა (RECURRENT ENCOUNTER (რეკურენტური ვიზიტ))	16
გონოკოკური ინფექციით ავადობის მაჩვენებელი (INCIDENCE OF GONOCOCCAL INFECTION) (ავადებადობა გონოკოკოვით ინფექციით, ახალი შემთხვევები)	95
დაბადების წონა (BIRTH WEIGHT) (მასა დაბადებისას)	31
დამატებითი კვება (COMPLEMENTARY FEEDING) (დამატებითი ვეძინა)	72
დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნა კონტრაცეფციაზე (UNMET NEED FOR CONTRACEPTION, Неудовлетворенный спрос на контрацепцию)	74
დედათა სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (MATERNAL MORTALITY RATIO) (დედათა სიკვდილიანობის კოეფიციენტი)	61
დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (MATERNAL MORTALITY RATE) (დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი)	60
დედის მოგვიანებითი სიკვდილი (LATE MATERNAL DEATH) (დედის მოგვიანებითი სიკვდილი)	58
დედის სიკვდილი (MATERNAL DEATH) (დედათა სიკვდილი)	57
დფტ-3 იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (DPT3 VACCINATION COVERAGE) (დფტ-3 იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი)	104
ექიმთან მიმართვა (ENCOUNTER) (ვიზიტ)	14
ექსკლუზიური ძუძუთი კვება (EXCLUSIVE BREASTFEEDING) (ექსკლუზიური ძუძუთი ვეძინა)	70
ინვალიდობის შედეგად დაკარგული წლები (DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEARS, жизни, скорректированные по нетрудоспособности)	66
ინციდენტობა, პირველადი ავადობა (INCIDENCE) (ინციდენტობა)	18
კონტრაცეფციის გამოყენების მაჩვენებელი (CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE, Коэффициент использования контрацепции)	73
ლეტალობის მაჩვენებელი (HOSPITAL CASE FATALITY RATE) (ლეტალობის მაჩვენებელი)	28
მგბ(+) ავადობა (NOTIFICATION RATE FOR NEW SMEAR-POSITIVE CASES, БК+)	101
მკვდრადშობადობა (მკვდრადშობილი ნაყოფი) (STILLBIRTH (DEADBORN FETUS) Мертворождение (мертворожденный плод))	50
მკვდრადშობადობის კოეფიციენტი (STILLBIRTH RATE) (მკვდრადშობადობის კოეფიციენტი)	51
მკვდრადშობადობის კოეფიციენტი სხეულის მასის გათვალისწინებით (STILLBIRTH RATE, WEIGHT-SPECIFIC) (მკვდრადშობადობის კოეფიციენტი სხეულის მასის გათვალისწინებით)	52
მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებელი (ADOLESCENT PREGNANCY RATE) (მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებელი)	75
მოსახლეობის აღწარმოების ბრუტო კოეფიციენტი (GROSS REPRODUCTION RATE, коэффициент воспроизводства населения)	35
მოსახლეობის აღწარმოების ნეტო კოეფიციენტი (NET REPRODUCTION RATE, коэффициент воспроизводства населения)	36
მოსახლეობის ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი (NATURAL INCREASE RATE, Коэффициент естественного прироста населения)	56

მოსახლეობის საერთო რიცხოვნობა (POPULATION SIZE, численность населения)	5
მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (MID-YEAR POPULATION, Среднегодовое население)	6
ნეონატალური პერიოდი (NEONATAL PERIOD, неонатальный период)	46
ნეონატალური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (NEONATAL MORTALITY RATE, Коэффициент неонатальной смертности)	47
ორსულთა აივ ინფექციაზე ტესტირებით მოცვის მაჩვენებელი (HIV TESTING COVERAGE RATE AMONG PREGNANT WOMEN, беременность ВИЧ тестированием)	88
ორსულობასთან დაკავშირებული მიზეზებით გამოწვეული დედის სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (PREGNANCY-RELATED MORTALITY RATE, коэффициент материнской смертности от причин, связанных с беременностью)	63
ორსულობასთან დაკავშირებული სიკვდილი (PREGNANCY-RELATED DEATH, смерть, связанная с беременностью)	59
ორსულობის ვადა (GESTATIONAL AGE, срок беременности)	29
პერინატალური პერიოდი (PERINATAL PERIOD, перинатальный период)	53
პერინატალური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (PERINATAL MORTALITY RATE, Коэффициент перинатальной смертности)	54
პირდაპირი სამეანო მიზეზებით გამოწვეული დედის სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (DIRECT OBSTETRIC MORTALITY RATE, коэффициент материнской смертности от прямых акушерских причин)	62
პირველადი დახმარების დაწესებულებები (PRIMARY HEALTH CARE FACILITIES, Учреждения первичного здравоохранения)	12
პირველადი მიმართვა (FIRST ENCOUNTER, первый визит)	15
პირველადი სამედიცინო დახმარება (PRIMARY HEALTH CARE, первичное здравоохранение)	11
პოლიომიელიტის წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (POLIO VACCINATION COVERAGE, охват иммунизацией против полиомиелита)	106
პოპულაცია (POPULATION, популяция)	4
პოსტნეონატალური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (POSTNEONATAL MORTALITY RATE, Коэффициент постнеонатальной смертности)	55
პრევალენტობა, საერთო ავადობა (PREVALENCE, prevalence)	19
პრევალენტობა წლის ბოლოსთვის (PREVALENCE BY THE END OF THE YEAR, Превалентность на конец года)	20
რეპროდუქციული ჯანმრთელობა (REPRODUCTIVE HEALTH, репродуктивное здоровье)	68
საავადმყოფო (HOSPITAL, больница)	21
საავადმყოფოს საწოლი (HOSPITAL BED, больничная койка)	22
სავალდებულო წესით რეგისტრირებული დაავადება (OBLIGATORY REGISTRATION DISEASE, заболевание, подлежащее обязательной регистрации)	84
საკეისრო კვეთების მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე (CESAREAN SECTIONS RATE PER 1000 LIVE BIRTHS, показатель кесаревых сечений на 1000 живорожденных)	83
საკეისრო კვეთების მაჩვენებელი (პროცენტი) მშობიარობების საერთო რაოდენობიდან (PERCENT OF CESAREAN SECTIONS FROM ALL BIRTHS, кесаревых сечений из общего числа родов)	82

სამედიცინო სტატისტიკა (MEDICAL STATISTICS/Медицинская статистика)	8
საწოლის ბრუნვის მაჩვენებელი (HOSPITAL BED ROTATION/Оборот койки)	26
საწოლის დატვირთვის მაჩვენებელი (BED OCCUPANCY RATE/Загрузка койки)	27
საწოლზე დაყოვნების საშუალო ხანგრძლივობა (AVERAGE LENGTH OF STAY/Средняя продолжительность пребывания на койке)	25
სიკვდილი (DEATH/Смерть)	38
სიკვდილიანობის ასაკობრივი კოეფიციენტი (AGE-SPECIFIC DEATH RATE/Возрастной коэффициент смертности)	43
სიკვდილიანობის ზოგადი კოეფიციენტი (CRUDE DEATH RATE/Общий коэффициент смертности)	41
სიკვდილიანობის კოეფიციენტი სიკვდილის მიზეზის მიხედვით (DEATH RATE BY CAUSE OF DEATH/Коэффициент смертности по причинам смерти)	42
სიკვდილის მიზეზი (CAUSE OF DEATH/Причина смерти)	39
სიკვდილის პირველადი მიზეზი (UNDERLYING CAUSE OF DEATH/Первоначальная причина смерти)	40
სიფილისით ავადობის მაჩვენებელი (INCIDENCE OF SYPHILIS/Заболеваемость сифилисом, новые случаи)	94
სიფილისით ავადობის მაჩვენებელი ორსულ ქალებში (INCIDENCE OF SYPHILIS AMONG PREGNANT WOMEN/Заболеваемость сифилисом среди беременных)	96
სიცოცხლის მოსალოდნელი საშუალო ხანგრძლივობა (ESTIMATED LIFE EXPECTANCY, Ожидаемая продолжительность жизни)	64
სტატისტიკა (STATISTICS/Статистика)	1
სტატისტიკური მონაცემები (STATISTICAL DATA/Статистические данные)	2
სტატისტიკური მონაცემების წყაროები (STATISTICAL DATA SOURCES/Источники статистических данных)	3
სქესთა მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობა (NUMERICAL SECONDARY RATIO OF SEXES/Вторичное соотношение численности полов)	37
ტრიქომონიაზით ავადობის მაჩვენებელი (INCIDENCE OF TRICHOMONIASIS, Заболеваемость трихомониазом)	97
ტრიქომონიაზით ავადობის მაჩვენებელი რეპროდუქციული ასაკის ქალებში (INCIDENCE OF TRICHOMONIASIS AMONG WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE/Заболеваемость трихомониазом среди женщин репродуктивного возраста)	98
ტუბერკულოზის წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (TB VACCINATION COVERAGE/Охват иммунизацией против туберкулеза)	103
უპირატესად ძუძუთი კვება (PREDOMINANT BREASTFEEDING/Преимущественно грудное вскармливание)	71
ქლამიდიოზით ავადობის მაჩვენებელი (INCIDENCE OF CHLAMIDIOSIS/Заболеваемость хламидиозом)	99
ქლამიდიოზით ავადობის მაჩვენებელი რეპროდუქციული ასაკის ქალებში (INCIDENCE OF CHLAMIDIOSIS AMONG WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE/Заболеваемость хламидиозом среди женщин репродуктивного возраста)	100
შემთხვევის გამოვლენა (CASE DETECTION/Выявление случая)	17
შიდსის ინციდენტობა (AIDS INCIDENCE/Заболеваемость СПИДом, новые случаи)	87

შობადობის ასაკობრივი კოეფიციენტი (AGE-SPECIFIC BIRTH RATE - Возрастной коэффициент рождаемости)	33
შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი (TOTAL FERTILITY RATE - Суммарный коэффициент рождаемости, Коэффициент суммарной рождаемости)	34
შობადობის ზოგადი კოეფიციენტი (CRUDE BIRTH RATE - Общий коэффициент рождаемости)	32
ჩატარებული ოპერაციების მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე (SURGICAL ACTIVITY RATE PER 100000 POPULATION - Показатель хирургической активности на 100000 населения)	81
ჩვილთა სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (INFANT MORTALITY RATE - Коэффициент младенческой смертности)	44
ცოცხლადშობადობა (LIVE BIRTHS - Живорождение)	30
ძუძუთი კვება (BREASTFEEDING - Грудное вскармливание)	69
წითელას წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (MEASLES VACCINATION COVERAGE - Охват иммунизацией против кори)	105
ხარისხიანი ცხოვრების წლები (QUALITY ADJUSTED LIFE YEAR (QALY) - Одн. жизни, скорректированные по качеству здоровья)	67
ჯანმრთელი სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა (HEALTH ADJUSTED LIFE EXPECTANCY - Ожидаемая продолжительность здоровой жизни)	65
ჯანმრთელობა (HEALTH - Здоровье)	9
ჯანმრთელობის მდგომარეობა (HEALTH STATUS - Состояние здоровья)	10
ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (HOSPITALIZATION LEVEL - Показатель госпитализации)	24
ჰოსპიტალური ავადობა (HOSPITAL MORBIDITY - Больничная заболеваемость)	23

**ბაეროს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპული რეგიონის
ოფისის მიერ რეკომენდებული ბანსაზღვრებების და მაჩვენებლების ლექსიკონი**

- 1. სტატისტიკა (STATISTICS/Статистика)** – საზოგადოებრივი მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის მასობრივი საზოგადოებრივი მოვლენების რაოდენობრივ მხარეს, მჭიდრო კავშირში მათ ხარისხობრივ მხარესთან.
- 2. სტატისტიკური მონაცემები (STATISTICAL DATA/Статистические данные)** – გაზომვების, დაკვირვებების, ანალიზის, ცდების შედეგები.
- 3. სტატისტიკური მონაცემების წყაროები (STATISTICAL DATA SOURCES/Источники статистических данных)** – სახელმწიფო მართვის ორგანოები (მაგ. ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც განსაზღვრულ მონაცემებს იღებს სამედიცინო დაწესებულებებიდან); მოსახლეობის აღწერის მონაცემები; შერჩევითი კვლევები.
- 4. პოპულაცია (POPULATION/Население)** - ჯგუფი, რომელზეც ფოკუსირებულია კვლევა (მთელი ქვეყნის მოსახლეობა, გარკვეული რეგიონის მოსახლეობა, ან რომელიმე ეთნიკური, სოციალური ან ასაკობრივი ჯგუფი).
- 5. მოსახლეობის საერთო რიცხოვნობა (POPULATION SIZE/Численность населения)** - საბაზო მოსახლეობის რიცხოვნობას, ბოლო აღწერის მიხედვით, მიმატებული ბუნებრივი (დაბადებულთა და გარდაცვლილთა სხვაობა) და მიგრაციული (ჩამოსულთა და წასულთა) მატება განვლილი პერიოდის განმავლობაში.
- 6. მოსახლეობის საშუალო წლიური რიცხოვნობა (MID-YEAR POPULATION/Среднегодовое население)** - წლის დასაწყისსა და წლის ბოლოსათვის მოსახლეობის რიცხოვნობის საშუალო არითმეტიკული.
- 7. ასაკობრივი სტანდარტიზაცია (AGE STANDARDIZATION/Возрастная стандартизация)** – დემოგრაფიული კოეფიციენტების შედარებისას სტრუქტურულ განსხვავებათა გავლენის აცილების მეთოდი. სტანდარტიზაცია ჩვეულებრივ გამოიყენება ორი ან მეტი შესადარებელი პოპულაციის ასაკობრივ სტრუქტურაში განსხვავებების გავლენის მოცილებისათვის, რომლებიც ჩვეულებრივ არსებით გავლენას ახდენენ გამოსათვლელი მაჩვენებლების სიდიდეზე. სიკვდილიანობის მაჩვენებლების გამოანგარიშებისას ტარდება სტანდარტიზაცია ევროპული სტანდარტული მოსახლეობის შესაბამისად.

მოსახლეობის სტრუქტურის ევროპული სტანდარტი

ასაკი (წლები)	პროცენტი მოსახლეობიდან	ასაკი (წლები)	პროცენტი მოსახლეობიდან
0	1.6	45-49	7
1-4	6.4	50-54	7
5-9	7	55-59	6
10-14	7	60-64	5
15-19	7	65-69	4
20-24	7	70-74	3
25-29	7	75-79	2
30-34	7	80-84	1
35-39	7	85+	1
40-44	7	ყველა წელი	100

- 8. სამედიცინო სტატისტიკა (MEDICAL STATISTICS/Медицинская статистика)** - შეისწავლის მედიცინასთან და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს და ორ ნაწილად იყოფა:
 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატისტიკა
 - ჯანდაცვის სტატისტიკა
- 9. ჯანმრთელობა (HEALTH/Здоровье)** - წარმოადგენს სრულფასოვან ფიზიკურ, სულიერ და სოციალურ კეთილდღეობის მდგომარეობას და არ განისაზღვრება ავადმყოფობის ან ფიზიკური დეფექტის არარსებობით. ცალკეული ადამიანის ჯანმრთელობა და ავადმყოფობა ძირითადად გამოიხატება შემგუებლობითი და მემკვიდრეობითი ბიოლოგიური კრიტერიუმებით. ამასთან ადამიანის საერთო ბიოლოგიური მახასიათებლები გასაშუალოდდება ცხოვრების სოციალური პირობებით. ამიტომ ადამიანთა ჯანმრთელობის და ავადმყოფობის შეფასების დროს ადამიანი განხილული უნდა იქნეს

არა მარტო როგორც ბიოლოგიური ორგანიზმი, არამედ როგორც სოციალური პიროვნება, ე.ი. „ჯანმრთელობა“ და „ავადმყოფობა“ განიხილება, როგორც ბიოსოციალური კატეგორიები.

- 10. ჯანმრთელობის მდგომარეობა (HEALTH STATUS/Состояние здоровья)** – მაჩვენებელი, რომელიც სპეციალურად აღრიცხული ნიშნების ერთობლიობის (ავადმყოფობის არსებობა ან არარსებობა, სამედიცინო დახმარებისთვის მიმართვა, დისპანსერული დაკვირვების საჭიროება და ა.შ.) საშუალებით სამედიცინო შეფასებას აძლევს მოსახლეობის ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობის მდგომარეობის მახასიათებელი ნიშნები აღირიცხება სამედიცინო გასინჯვების, დისპანსერიზაციის და სამედიცინო დახმარებისთვის მიმართვების დროს.

ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით, გასინჯვების მონაცემებზე დაყრდნობით, პიროვნებები შეიძლება დაიყოს სამ ჯგუფად:

- ჯანმრთელები, რომლებიც არაფერს უჩივიან, ანამნეზში არ აქვთ ქრონიკული დაავადებები და ცალკეული ორგანოს ან სისტემის ფუნქციის დარღვევა; გამოკვლევის დროს განსაზღვრული ნორმებიდან გადახრები არ აღმოაჩნდათ.
- პრაქტიკულად ჯანმრთელები, რომლებსაც ანამნეზში აქვთ მწვავე ან ქრონიკული დაავადება, რომელთაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ორგანოების ფუნქციებზე და შრომისუნარიანობაზე გავლენა ვერ მოახდინეს.
- ქრონიკული დაავადებებით დაავადებულები, რომლებისთვისაც აუცილებელია სისტემატური საექიმო დაკვირვება:
 - ავადმყოფობის კომპენსირებული მიმდინარეობით, იშვიათი და არახანგრძლივი შრომისუნარიანობის დაკარგვით;
 - ავადმყოფობის სუბკომპენსირებული მიმდინარეობით, ხშირი გამწვავებებით და შრომისუნარიანობის ხანგრძლივი დაკარგვით;
 - ავადმყოფობის დეკომპენსირებული მიმდინარეობით, მდგრადი პათოლოგიური ცვლილებებით, რომლებიც იწვევენ შრომისუნარიანობის სრულ დაკარგვას.

- 11. პირველადი სამედიცინო დახმარება (PRIMARY HEALTH CARE/Первичное здравоохранение)** - ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო სისტემის სტრატეგიული მიმართულება, რომელიც მოიცავს მოსახლეობის განათლებას ჯანმრთელობისა და პროფილაქტიკის ძირითადი ასპექტების სფეროში; დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნვას ოჯახის დაგეგმარების ჩათვლით; ფართოდ გავრცელებული დაავადებების პროფილაქტიკას და მეურნეობას; საკვები პროდუქტების და სასმელი წყლის ადეკვატური ხარისხის ხელშეწყობას; მოსახლეობის მომარაგებას აუცილებელი მედიკამენტებით. საქართველოში 2006 წლიდან პირველადი ჯანდაცვა განისაზღვრება, როგორც არაჰოსპიტალური სამედიცინო მომსახურება, რაც გულისხმობს ნებისმიერ სამედიცინო მომსახურებას, რომელიც მოსახლეობას მიეწოდება არასტაციონარულ დონეზე.

- 12. პირველადი დახმარების დაწესებულებები (PRIMARY HEALTH CARE FACILITIES/Учреждения первичного здравоохранения)** - ყველა დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც აწარმოებენ ამბულატორიულ დახმარებას (საავადმყოფოების ამბულატორიული განყოფილებები, პოლიკლინიკები, ამბულატორიები, სამედიცინო ცენტრები, სამედიცინო დახმარების პუნქტები და ა.შ.). დაწესებულებები, რომლებიც დაკომპლექტებულია ჯანდაცვის ერთი სპეციალისტით მაინც (ექიმი, ექთანი). დაწესებულებები, რომლებიც აწარმოებენ მხოლოდ სტომატოლოგიურ დახმარებას (სტომატოლოგიური კაბინეტები). არასტაციონარული დახმარების დაწესებულებების საერთო რაოდენობაში არ ჩაითვლება.

პირველადი დახმარების დაწესებულებებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე:

პირველადი დახმარების დაწესებულებების საერთო რაოდენობა * 100000

მოსახლეობის რაოდენობა

- 13. ავადობა (MORBIDITY/Заболеваемость)** – დროის გარკვეულ პერიოდში მოსახლეობაში დაავადებათა გავრცელების მახასიათებელი; დაავადებები, ტრავმები და მიზეზები, რომელთა გამოც ხდება სამედიცინო სამსახურებთან კონტაქტი.

- 14. ექიმთან მიმართვა (ENCOUNTER/Визит)** – ექიმთან პირადი კონტაქტი გასინჯვის, დიაგნოსტიკის, კონსულტაციის ან მეურნეობისათვის. კონტაქტების ადგილები და ტიპები: ექიმის კაბინეტები (ოფისები), ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური დაწესებულებები, საავადმყოფოს მიმღები განყოფილებები (სასწრაფო დახმარების განყოფილება), სახლები/ბინები (ნებისმიერი ადგილი, სადაც იმყოფებოდა პაციენტი, რომელთანაც გამოიძახეს ექიმი), კლინიკები, ჯანმრთელობის შესანარჩუნებელი ნებისმიერი ორგანიზაცია, სტაციონარების გარდა.

მიმართვების რაოდენობა წელიწადში 1 სულ მოსახლეზე:

სულ მიმართვების რაოდენობა წელიწადში * 100000

მოსახლეობის რაოდენობა

15. **პირველადი მიმართვა (FIRST ENCOUNTER/Первый визит)** - ექიმთან სამედიცინო დახმარებისთვის პაციენტის პირველი მიმართვა.
16. **განმეორებითი მიმართვა (RECURRENT ENCOUNTER/Рекуррентный визит)** - მწვავე (მკურნალობის გასაგრძელებლად) ან ქრონიკული (აღრე გამოვლენილი და რეგისტრირებული) დაავადების გამო ექიმთან მიმართვა.
17. **შემთხვევის გამოვლენა (CASE DETECTION/Выявление случая)** - დაავადების დიაგნოსტიკა და აღრიცხვა.
18. **ინციდენტობა, პირველადი ავადობა (INCIDENCE/Инцидентность)** - ადამიანის სიცოცხლეში პირველად გამოვლენილი დაავადება, რომელიც ადრე არ იყო რეგისტრირებული (ყველა მწვავე დაავადება, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება წელიწადში რამდენჯერმე განმეორდეს, ქრონიკული დაავადებები, რომლებიც შეიძლება შემთხვევით (მაგ. ექიმთან ვიზიტის დროს) პირველად გამოვლინდეს.

დაავადების ახლად დიაგნოსტირებული შემთხვევის რაოდენობა * 100000

მოსახლეობის რაოდენობა

19. **პრევალენტობა, საერთო ავადობა (PREVALENCE/Превалентность)** - წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ყველა დაავადება (როგორც პირველადი, ასევე წინა წლებში გამოვლენილი ქრონიკული დაავადების შემთხვევები, რომელთა გამოც მოცემულ წელს პაციენტმა მიმართა ექიმს).

დაავადების ყველა დიაგნოსტირებული შემთხვევის რაოდენობა * 100000

მოსახლეობის რაოდენობა

20. **პრევალენტობა წლის ბოლოსთვის (PREVALENCE BY THE END OF THE YEAR/Превалентность на конец года)**

საანგარიშო წლის ბოლოს მეთვალყურეობაზე მყოფ ავადმყოფთა რაოდენობა * 100000

მოსახლეობის რაოდენობა

21. **საავადმყოფო (HOSPITAL/Больница)** - სტაციონარული სამკურნალო დაწესებულება, სადღეღამისო სამედიცინო და საექიმო დახმარების, ავადმყოფების და ტრავმირებულების დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, რეაბილიტაციის საშუალებებით უზრუნველყოფით (როგორც წესი სამედიცინო და ქირურგიული მდგომარეობებისთვის), რომელიც დაკომპლექტებულია პროფესიულად მომზადებული ექიმი-პრაქტიკოსებით (ყველაზე მცირე ერთი ექიმით მაინც) საავადმყოფოს შეუძლია, თუმცა ვალდებული არ არის გაწიოს ამბულატორული მომსახურება.
- საავადმყოფოების საერთო რაოდენობაში შედის:** ზოგადი პროფილის საავადმყოფოები, სპეციალიზებული საავადმყოფოები, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საავადმყოფოები და საავადმყოფოები პაციენტების გრძელვადიანი დაყოვნებით.
- საავადმყოფოების საერთო რაოდენობაში არ შედის: ბალნეოლოგიური დაწესებულებები, სანატორიუმები, ფიზიკური და გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობების პირების მოვლის სახლები, ხანშიშესულთა მოვლის სახლები (ე.ი. ის დაწესებულებები, რომლებიც ძირითადად უზრუნველყოფენ მოვლას), დღის ცენტრები, დღის სტაციონარები.
- სტაციონარებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე:

სტაციონარების რაოდენობა * 100000

მოსახლეობის რაოდენობა

22. **საავადმყოფოს საწოლი (HOSPITAL BED/Больничная койка)** - საავადმყოფოს პალატაში განთავსებული საწოლი, რომელიც განკუთვნილია პაციენტის მიღებისთვის და მისი სადღეღამისო დახმარებისთვის, რომელსაც რეგულარულად ემსახურება მიმაგრებული პერსონალი და უზრუნველყოფილია უწყვეტი სამედიცინო დახმარება.
- საავადმყოფოში საწოლთა რაოდენობა ასახავს საავადმყოფოს ტევადობას და სიმძლავრეს. საწოლთა საერთო რაოდენობაში არ ითვლება ახალშობილთა და დღის არასტაციონარული დახმარების დაწესებულებების საწოლები.
- სტაციონარული საწოლებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი:

სტაციონარული საწოლების საერთო რაოდენობა * 100000

მოსახლეობის რაოდენობა

23. **ჰოსპიტალური ავადობა (HOSPITAL MORBIDITY/госпитальная заболеваемость)** – განისაზღვრება სტაციონარული მკურნალობისთვის ჰოსპიტალიზებულ ავადმყოფთა რაოდენობით. აღრიცხვის ერთეულია ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა.
24. **ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი (HOSPITALIZATION LEVEL/показатель госпитализации)**

$\frac{\text{ჰოსპიტალიზაციის ყველა შემთხვევის რაოდენობა} * 100000}{\text{მოსახლეობის რაოდენობა}}$

25. **საწოლზე დაყოვნების საშუალო ხანგრძლივობა (AVERAGE LENGTH OF STAY/средняя продолжительность пребывания на койке)**

$\frac{\text{გატარებული საწოლ-დღეების საერთო რაოდენობა}}{\text{ჰოსპიტალიზაციის ყველა შემთხვევის რაოდენობა}}$

26. **საწოლის ბრუნვის მაჩვენებელი (HOSPITAL BED ROTATION/оборачив койки)**

$\frac{\text{ჰოსპიტალიზაციის ყველა შემთხვევის რაოდენობა}}{\text{სტაციონარული საწოლების რაოდენობა}}$

27. **საწოლის დატვირთვის მაჩვენებელი (BED OCCUPANCY RATE/загрузка койки)**

$\frac{\text{გატარებული საწოლ-დღეების საერთო რაოდენობა}}{\text{სტაციონარული საწოლების რაოდენობა}}$

28. **ლეტალობის მაჩვენებელი (HOSPITAL CASE FATALITY/летальность)**

$\frac{\text{სიკვდილის შემთხვევები სტაციონარში} * 100}{\text{ჰოსპიტალიზაციის ყველა შემთხვევის რაოდენობა}}$

29. **ორსულობის ვადა (GESTATIONAL AGE/век беременности)** - ორსულობის ხანგრძლივობა იანგარიშება უკანასკნელი ნორმალური მენსტრუაციის პირველი დღიდან, რომელიც არის ნულოვანი დღე და არა პირველი დღე. ორსულობის ვადა გამოიხატება სრული დღეებით ან სრული კვირებით (ნორმალური ორსულობის ხანგრძლივობად მიჩნეულია 280-286 დღე, ანუ 40 კვირა).

ორსულობის ვადად ითვლება პერიოდი უკანასკნელი ნორმალური მენსტრუაციის პირველი დღიდან მშობიარობის დამთავრებამდე. უნდა ჩაითვალოს, რომ ეს პირველი დღე არის ნულოვანი დღე და არა ერთი დღე; აქედან გამომდინარე, იგულისხმება, რომ 0-6 დღეები შეესაბამება “ნულოვან კვირას” და მე-40 კვირა არის შესატყვისი “39 სრული კვირისა.” როდესაც უკანასკნელი მენსტრუაციის თარიღის დადგენა შეუძლებელია, მაშინ ორსულობის ვადის დადგენა ეფუძნება საუკეთესო კლინიკურ გამოკვლევებს. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ შეცდომები, უნდა აღირიცხოთ კვირებიც და დღეებიც.

ნაადრევი მშობიარობა (PRE-TERM/недоношенность)

37 სრულ კვირაზე ნაკლები (259 დღეზე ნაკლები) ორსულობის პერიოდი.

დროული მშობიარობა (TERM/доношенность)

37 სრული კვირიდან 42 სრულ კვირაზე ნაკლები (259-დან 293 დღემდე) ორსულობის პერიოდი.

ვადაგადაცილებული მშობიარობა (POST-TERM/переношенность)

42 სრული კვირა ან მეტი (294 დღე ან მეტი) ორსულობის პერიოდი.

30. **ცოცხლადშობადობა (LIVE BIRTH/живорождение)** - დედის ორგანიზმიდან ნაყოფის (ჩასახვის პროდუქტის) სრულად გამოდევნა ან ხელოვნურად გამოყვანა, როდესაც ნაყოფი სუნთქავს ან ავლენს სიცოცხლის სხვა რომელიმე ნიშანს, როგორცაა გულისცემა, ჭიპლარის პულსაცია ან ჩონჩხის კუნთების ცალკეული ჯგუფების შეკუმშვა სხეულის შესაბამისი ნაწილების მოძრაობით, მიუხედავად იმისა, რა ხანგრძლივობისაა ორსულობა, ჭიპლარი გადაკვეთილია თუ არა ან პლაცენტა მოცილებულია საშვილოსნოს კედელს თუ არა.

31. **დაბადების წონა (BIRTH WEIGHT/Масса тела при рождении)** - დაბადების შემდეგ გაზომილი ნაყოფის ან ახალშობილის პირველი წონა.

ცოცხლადშობილების დაბადების პირველი წონა უნდა გაიზომოს არა უგვიანეს სიცოცხლის პირველი საათისა, ვიდრე მოხდება პოსტნატალური მასის შესამწნევი დაკარგვა. ფაქტობრივი პირველი წონა უნდა ჩაიწეროს იმ სიზუსტით, რა სიზუსტითაც ის გაიზომა, რადგან სტატისტიკური ცხრილები შედგენილია 500 გრამიანი შუალედებით, ამიტომ წონის ზუსტი მაჩვენებელი შუალედში ვერ მოთავსდება.

“მცირე, “ძალიან მცირე” და “უკიდურესად მცირე” დაბადების პირველი წონის განმარტებები არ წარმოადგენს ურთიერთგამომრიცხავ რუბრიკებს (ე.ი. “მცირე” მოიცავს “ძალიან მცირეს” და “უკიდურესად მცირეს,” მაშინ როდესაც “ძალიან მცირე” მოიცავს “უკიდურესად მცირეს”).

მცირე წონის ახალშობილები

2500 გ-ზე ნაკლები (2500 გ-მდე და მოიცავს 2499 გ)

ძალიან მცირე წონის ახალშობილები

1500 გ-ზე ნაკლები (1500 გ-მდე და მოიცავს 1499 გ)

უკიდურესად მცირე წონის ახალშობილები

1000 გ-ზე ნაკლები (1000 გ-მდე და მოიცავს 999 გ)

- 32. შობადობის ზოგადი კოეფიციენტი (CRUDE BIRTH RATE) – Коэффициент рождаемости** – წარმოადგენს გარკვეულ დროში ცოცხალშობილთა საერთო რაოდენობის შეფარდებას იმავე პერიოდის მოსახლეობის საშუალო რაოდენობასთან. გამოისახება პრომილეთი (‰), უჩვენებს ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობას მოსახლეობის 1000 სულზე.

$$\frac{\text{ცოცხალშობილთა რაოდენობა} \times 1000}{\text{მოსახლეობის რაოდენობა}}$$

- 33. შობადობის ასაკობრივი კოეფიციენტი (AGE-SPECIFIC BIRTH RATE) – Возрастной коэффициент рождаемости** – წარმოადგენს მოცემული დროის პერიოდში (მაგ., წელი) გარკვეული ასაკის ქალების მიერ გაჩენილი ბავშვების საშუალო რაოდენობას.

$$\frac{\text{ქალთა X ასაკში დაბადებულ ბავშვთა საერთო რაოდენობა} \times 1000}{\text{იგივე X ასაკის ქალთა საერთო რაოდენობა}}$$

- 34. შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი (TOTAL FERTILITY RATE) – Суммарный коэффициент рождаемости, Коэффициент суммарной рождаемости** – წარმოადგენს ერთი ქალის მიერ მთელი ცხოვრების მანძილზე (პირობითად 15-49 წლის ასაკში) დაბადებულ ბავშვთა საშუალო რაოდენობას. ეს მაჩვენებელი გამოიანგარიშება შობადობის ერთწლიანი ასაკობრივი კოეფიციენტების ჯამის გაყოფით 1000-ზე (ე.ი. ერთ ქალზე გაანგარიშებით). იმ შემთხვევაში, როდესაც ხუთწლიანი ასაკობრივი ინტერვალებია მოცემული (მაგ; 20-24, 25-29 და ა.შ.) ასაკობრივი კოეფიციენტის ჯამი საჭიროა გავამრავლოთ ხუთზე და შემდეგ გავყოთ 1000-ზე (ერთ ქალზე გაანგარიშებისთვის). კოეფიციენტი წარმოადგენს შობადობის დონის განმსაზღვრელ საკმაოდ ზუსტ მაჩვენებელს.

$$\frac{\text{შობადობის ერთწლიანი ასაკობრივი კოეფიციენტების ჯამი}}{1000}$$

- 35. მოსახლეობის აღწარმოების ბრუტო კოეფიციენტი (GROSS REPRODUCTION RATE) – Коэффициент воспроизводства населения** – თაობათა შენაცვლების მაჩვენებელი, რომელიც არ ითვალისწინებს სიკვდილიანობას. წარმოადგენს მოსახლეობის აღწარმოების რეჟიმის ერთ-ერთ მახასიათებელს და შობადობის კრესით დახასიათებას. კოეფიციენტი შეიძლება გაანგარიშებულ იქნას ცალ-ცალკე ორივე სქესის მოსახლეობისთვის, თუმცა უმრავლეს შემთხვევაში გამოითვლება ქალებისთვის. იმის გამო, რომ ის არ ითვალისწინებს ქალიშვილების სიკვდილიანობას მათ მიერ დედის ასაკის მიღწევამდე, ის არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც ქალიშვილების თაობის მიერ დედათა თაობის შენაცვლების რეალური მაჩვენებელი. კოეფიციენტი უჩვენებს ერთი ქალის მიერ თავისი ცხოვრების მანძილზე დაბადებული გოგონების საშუალო რაოდენობას (თუ ქალი იცოცხლებდა ფერტილური პერიოდის ბოლომდე და მისი სიცოცხლის მანძილზე ყოველ ასაკში შენარჩუნებულ იქნებოდა შობადობის არსებული დონე).

$$(\text{ცოცხალშობილთა შორის გოგონათა წილი}) \times (\text{შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი})$$

- 36. მოსახლეობის აღწარმოების ნეტო კოეფიციენტი (NET REPRODUCTION RATE) – Коэффициент воспроизводства населения** – მოსახლეობის აღწარმოების რეჟიმის განმარტებული მახასიათებელი, რომელშიც გათვალისწინებულია შობადობა და სიკვდილიანობა. შეიძლება გამოთვლილ იქნას ცალ-ცალკე ორივე სქესისათვის, თუმცა როგორც წესი, გამოითვლება ქალების შემთხვევაში. იგი წარმოადგენს ქალიშვილების თაობის მიერ დედათა თაობის შენაცვლების რაოდენობრივ მაჩვენებელს და უჩვენებს ერთი ქალის მიერ თავისი ცხოვრების მანძილზე დაბადებული გოგონების საშუალო რაოდენობას, რომლებიც იცოცხლებენ იმ ასაკამდე, რომელშიც დედა იყო თითოეული ამ გოგონას გაჩენისას.

(ცოცხალშობილთა შორის გოგონათა წილი) *
(შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი) * (ცოცხლად დარჩენილ ქალთა რაოდენობა)

37. **სქესთა მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობა (NUMERICAL SECONDARY RATIO OF SEXES - соотношение численности полов)** – წარმოადგენს ბიჭებისა და გოგონების რაოდენობათა თანაფარდობას ცოცხლად დაბადებულთა შორის. სქესთა მეორეული რაოდენობრივი თანაფარდობა შეადგენს 105-106 ბიჭს 100 გოგონაზე, ანუ 51,2% ბიჭების სასარგებლოდ. ეს თანაფარდობა განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ იშვიათად აღემატება 107-ს და ასევე იშვიათად არის 104-ზე ნაკლები.
38. **სიკვდილი (DEATH/Смерть)** – ცხოვრების ნებისმიერ პერიოდში (დაბადების მომენტიდან) სიცოცხლის ყველა ნიშნის შეუქცევადი გაქრობა (ყველა სასიცოცხლო ფუნქციის შეწყვეტა, რომელიც გამორიცხავს რეანიმაციის შესაძლებლობას).
39. **სიკვდილის მიზეზი (CAUSE OF DEATH/Причина смерти)** - ყველა ავადმყოფობა, პათოლოგიური მდგომარეობა ან დაზიანება, რომელმაც გამოიწვია სიკვდილი ან ხელი შეუწყო მას, აგრეთვე უბედური შემთხვევა ან ძალადობის აქტი, რომელიც იწვევს ნებისმიერ ასეთ დაზიანებას. ეს განსაზღვრება ფორმულირდება სიკვდილთან დაკავშირებული ინფორმაციის რეგისტრაციის მიზნით, რათა სიკვდილის შესახებ ცნობის შემდგომში პირმა არ ამოირჩიოს ერთი მდგომარეობა და არ უარყოს სხვები. ეს განსაზღვრება არ ითვალისწინებს სიკვდილის ცნობაში იმ სიმპტომებისა და მოვლენების შეტანას, რომელიც თან ახლავს სიკვდილს, როგორცაა გულის ან სუნთქვის უკმარისობა.
40. **სიკვდილის პირველადი მიზეზი (UNDERLYING CAUSE OF DEATH/Первоначальная причина смерти)** - განისაზღვრება, როგორც „(ა) ავადმყოფობა ან დაზიანება, რომელიც იწვევს ავადმყოფობის პროცესის ჯაჭვს, რაც უშუალოდ მიგვიყვანს სიკვდილამდე ან (ბ) უბედური შემთხვევის ან ძალადობის გარემოებები, რაც იწვევს სასიკვდილო დაზიანებას“.
41. **სიკვდილიანობის ზოგადი კოეფიციენტი (CRUDE DEATH RATE/Общий коэффициент смертности)** - წარმოადგენს მოკვდავობის ყველაზე გავრცელებულ მაჩვენებელს. უწვენებს გარდაცვლილთა რაოდენობას მოსახლეობის 1000 სულზე.

$$\frac{\text{გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა} * 1000}{\text{მოსახლეობის საშუალო რაოდენობა}}$$

42. **სიკვდილიანობის კოეფიციენტი სიკვდილის მიზეზის მიხედვით (DEATH RATE BY CAUSE OF DEATH, Коэффициент смертности по причинам смерти)** – გამოითვლება სიკვდილის მიზეზთა გარკვეული კლასებისთვის ასაკთა ჯგუფების მიხედვით. სიკვდილიანობაში სიკვდილის ცალკეული მიზეზის მნიშვნელობის შეფასება შესაძლებლობას იძლევა გააკეთდეს დასკვნა იმის თაობაზე, თუ სიკვდილიანობის დონის შემცირებისთვის რომელი დაავადებების წინააღმდეგ უნდა იქნას მიმართული ძირითადი ძალისხმევა, განისაზღვროს ამა თუ იმ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლაში ღონისძიებათა ეფექტიანობა.

$$\frac{\text{გარდაცვლილთა რაოდენობა სიკვდილის მიზეზის მიხედვით} * 100000}{\text{მოსახლეობის რაოდენობა}}$$

43. **სიკვდილიანობის ასაკობრივი კოეფიციენტი (AGE-SPECIFIC DEATH RATE/Возрастной коэффициент смертности)** – მოკვდავობის დონე ცალკეული ასაკობრივი ჯგუფების (ერთწლიანი, 5 წლიანი და სხვა) მიხედვით. განისაზღვრება როგორც გარკვეულ დროში (ჩვეულებრივ 1 ან 2 წელი) მოცემულ ასაკობრივ ჯგუფში გარდაცვლილთა აბსოლუტური რაოდენობის შეფარდება ამ ასაკობრივ ჯგუფის საშუალო რაოდენობასთან.

$$\frac{\text{გარდაცვლილთა რაოდენობა მოცემულ ასაკობრივ ჯგუფში} * 1000}{\text{მოცემული ასაკობრივი ჯგუფის საშუალო რაოდენობა}}$$

44. **ჩვილთა სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (INFANT MORTALITY RATE/Коэффициент младенческой смертности)** – მაჩვენებელი, რომელიც ზომავს დაბადებიდან ერთ წლამდე ბავშვების მოკვდავობის დონეს. გაანგარიშებას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ჩვილთა მოკვდავობის დონე მნიშვნელოვნად მაღალია შემდგომი ასაკობრივი ჯგუფების მოკვდავობის დონესთან შედარებით (ხანდაზმული მოხუცებულობის ასაკის გარდა). მოკვდავობის სხვა კოეფიციენტებისაგან განსხვავებით, მოცემულ შემთხვევაში, გარდაცვლილთა რაოდენობა შეეფარდება ცოცხალშობილთა რაოდენობას და არა მოსახლეობას, გამოისახება პრომილეითი (‰) და უწვენებს ერთ წლამდე ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობას ყოველ 1000 ცოცხალშობილზე.

1 წლამდე ასაკის გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა * 1000

ცოცხალშობილთა რაოდენობა

45. **5 წლამდე ბავშვების მოკვდავობის კოეფიციენტი (MORTALITY UNDER AGE 5 - коэффициент смертности детей до 5-летнего возраста)** – მაჩვენებელი, რომელიც ზომავს დაბადებიდან 5 წლამდე (0-4 წელი) ასაკის ბავშვების მოკვდავობის დონეს. გაიანგარიშება როგორც რომელიმე პერიოდში (მაგ., წელი) 5 წლამდე ასაკის გარდაცვლილი ბავშვების რაოდენობის შეფარდება იმავე პერიოდში ცოცხალშობილთა რაოდენობასთან. გამოისახება პრომილეთი (‰) და უჩვენებს დაბადებიდან 5 წლამდე პერიოდში სიკვდილის ალბათობას.

5 წლამდე ასაკში გარდაცვლილ ბავშვთა რაოდენობა * 1000

ცოცხალშობილთა რაოდენობა

46. **ნეონატალური პერიოდი (NEONATAL PERIOD - перинатальный период)** - ნეონატალური პერიოდი იწყება დაბადებიდან და გრძელდება მშობიარობიდან 28-ე სრული დღის დადგომამდე. ნეონატალური პერიოდი (დაბადებიდან 28-ე სრული დღის დადგომამდე) შეიძლება დაიყოს ადრეულ (დაბადებიდან 7 დღემდე) და გვიან (7 დან 28-ე სრულ დღემდე) ნეონატალურ პერიოდებად.
47. **ნეონატალური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (NEONATAL MORTALITY RATE - коэффициент неонатальной смертности)** – უჩვენებს დაბადებიდან სიცოცხლის 28 დღემდე (0-27 დღე) გარდაცვლილ ჩვილთა რაოდენობას ყოველ 1000 ცოცხალშობილზე.

სიცოცხლის პირველ 27 დღეს გარდაცვლილ ჩვილთა რაოდენობა * 1000

ცოცხალშობილთა რაოდენობა

48. **ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (EARLY NEONATAL MORTALITY RATE - коэффициент ранней неонатальной смертности)**

ადრეულ ნეონატალურ პერიოდში გარდაცვლილ ჩვილთა რაოდენობა * 1000

ცოცხალშობილთა რაოდენობა

49. **ადრეული ნეონატალური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი სხეულის მასის გათვალისწინებით (EARLY NEONATAL MORTALITY RATE, WEIGHT-SPECIFIC - коэффициент ранней неонатальной смертности с учетом массы тела)**

ადრეულ ნეონატალურ პერიოდში გარდაცვლილ ჩვილთა რაოდენობა (1000 გ მასის და მეტი) * 1000

1000 გ და მეტი მასის ცოცხალშობილთა რაოდენობა

50. **მკვდრადშობადობა (მკვდრადშობილი ნაყოფი) (STILLBIRTH (DEADBORN FETUS) - мертворождение (мертворожденный плод))** - ორსულობის ვადის მიუხედავად ნაყოფის სიკვდილი დედის ორგანიზმიდან სრულ გამოსვლამდე ან გამოყოფამდე. გამოსვლის შემდეგ მკვდრად დაბადებულის კრიტერიუმებია სუნთქვის ან სიცოცხლის სხვა ნიშნების (გულისცემა, ჭიპლარის პულსაცია ან კუნთების შეკუმშვა) არარსებობა.

51. **მკვდრადშობადობის კოეფიციენტი (STILLBIRTH RATE - коэффициент мертворождаемости)** – უჩვენებს მკვდრადშობილი ბავშვების რაოდენობას ყოველ 1000 დაბადებულზე.

მკვდრადშობილი ბავშვების რაოდენობა * 1000

დაბადებულ (მკვდრად + ცოცხლად) ბავშვთა რაოდენობა

52. **მკვდრადშობადობის კოეფიციენტი სხეულის მასის გათვალისწინებით (STILLBIRTH RATE, WEIGHT-SPECIFIC, коэффициент мертворождаемости с учетом массы тела)**

1000 გ და მეტი მასის მკვდრადშობილთა რაოდენობა * 1000

1000 გ და მეტი მასის დაბადებულთა საერთო რაოდენობა

53. **პერინატალური პერიოდი (PERINATAL PERIOD - перинатальный период)** - პერინატალური პერიოდი იწყება ორსულობის 22 კვირის (154 დღე) ვადიდან (ნაყოფის წონა ჩვეულებრივ 500 გ-ს უტოლდება) და მთავრდება მშობიარობიდან მე-7 სრულ დღეზე.

54. პერინატალური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (PERINATAL MORTALITY RATE) – коэффициент перинатальной смертности)

$$\frac{(\text{მკვდრადშობილთა რაოდენობა} + 0-6 \text{ დღეს გარდაცვლილ ჩვილთა რაოდენობა}) * 1000}{\text{დაბადებულთა (მკვდრად} + \text{ცოცხლად) რაოდენობა}}$$

55. პოსტნეონატალური სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (POSTNEONATAL MORTALITY RATE) – коэффициент постнеонатальной смертности) – უჩვენებს სიცოცხლის 27 დღის შემდეგ ერთი წლის ასაკამდე გარდაცვლილ ჩვილთა რაოდენობას.

$$\frac{\text{სიცოცხლის 28-ე დღიდან 1 წლამდე ასაკის გარდაცვლილ ჩვილთა რაოდენობა} * 1000}{\text{ცოცხალშობილთა რაოდენობა}}$$

56. მოსახლეობის ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი (NATURAL INCREASE RATE) – коэффициент естественного прироста населения) – წარმოადგენს შობადობისა და სიკვდილიანობის ზოგადი კოეფიციენტების სხვაობას. გამოისახება პრომილეთი (‰) და აჩვენებს, თუ რამდენია ბუნებრივი მატება მოსახლეობის 1000 სულზე.

ა) შობადობის ზოგადი კოეფიციენტი – სიკვდილიანობის ზოგადი კოეფიციენტი

$$\text{ბ) } \frac{(\text{ცოცხალშობილთა რაოდენობა} - \text{გარდაცვლილთა რაოდენობა}) * 1000}{\text{მოსახლეობის რაოდენობა}}$$

57. დედის სიკვდილი (MATERNAL DEATH) – материнская смерть) - ორსულობის პერიოდში ან მისი დამთავრებიდან 42 დღის განმავლობაში (ორსულობის ხანგრძლივობისა და ლოკალიზაციის მიუხედავად), ორსულობასთან დაკავშირებული რომელიმე მიზეზით განპირობებული სიკვდილი, რომელიც მოხდა მათ შორის სამკურნალო ზემოქმედებით ან რომელიმე პათოლოგიით, რომელიც დამძიმდა ორსულობის, მშობიარობის ან ლოგინობის პერიოდში, მაგრამ არა უბედური შემთხვევით ან შემთხვევითი მიზეზით.

58. დედის მოგვიანებითი სიკვდილი (LATE MATERNAL DEATH) – поздняя материнская смерть) - ორსულობის დასასრულიდან 42 დღის შემდეგ, მაგრამ არა უგვიანეს ერთი წლისა, ქალის სიკვდილი პირდაპირი ან არაპირდაპირი სამედიცინო მიზეზებით.

59. ორსულობასთან დაკავშირებული სიკვდილი (PREGNANCY-RELATED DEATH) – смерть, связанная с беременностью) - ორსულობის ან მისი დასასრულიდან 42 დღის განმავლობაში, სიკვდილის გამოწვევი მიზეზებისაგან დამოუკიდებელი ქალის სიკვდილი.

პირდაპირი სამედიცინო სიკვდილი: პირდაპირი სამედიცინო სიკვდილი არის ორსულობის სტატუსის (ორსულობა, მშობიარობა და მშობიარობის შემდგომი პერიოდი) სამედიცინო გართულების შედეგი, რომელიც გამოწვეულია არასწორი მკურნალობით ან მოვლენათა ისეთი ჯაჭვით, რომელსაც მიუყვანართ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შედეგამდე.

არაპირდაპირი სამედიცინო სიკვდილი: არაპირდაპირი სამედიცინო სიკვდილი არის მანამდე არსებული ან ორსულობის პერიოდში განვითარებული ავადმყოფობის შედეგი, რომელიც არ არის დაკავშირებული უშუალოდ სამედიცინო მიზეზებთან, მაგრამ დამძიმდა ორსულობით.

60. დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი (MATERNAL MORTALITY RATE) – показатель материнской смертности) - დედათა სიკვდილიანობის დონის გამომხატველი მაჩვენებელი. უჩვენებს, თუ რამდენი დედა გარდაიცვალა 100000 ფერტილური ასაკის ქალზე.

$$\frac{\text{დედის სიკვდილის შემთხვევათა რაოდენობა}}{(\text{პირდაპირი და არაპირდაპირი მიზეზებით}) * 100000}$$

ფერტილური ასაკის ქალთა რაოდენობა

61. დედათა სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (MATERNAL MORTALITY RATE) – коэффициент материнской смертности) – დედათა სიკვდილიანობის დონის გამომხატველი მაჩვენებელი. უჩვენებს, თუ რამდენი დედა გარდაიცვალა 100000 ცოცხალშობილზე.

$$\frac{\text{დედის სიკვდილის შემთხვევათა რაოდენობა}}{(\text{პირდაპირი და არაპირდაპირი მიზეზებით}) * 100000}$$

ცოცხალშობილთა რაოდენობა

62. პირდაპირი სამედიცინო მიზეზებით გამოწვეული დედის სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (DIRECT OBSTETRIC MORTALITY RATE) – коэффициент материнской смертности от прямых акушерских причин)

მხოლოდ პირდაპირი სამეანო მიზეზებით გამოწვეული დედის სიკვდილის
შემთხვევათა რაოდენობა * 100000

ცოცხალშობილთა რაოდენობა

63. **ორსულობასთან დაკავშირებული მიზეზებით გამოწვეული დედის სიკვდილიანობის კოეფიციენტი (PREGNANCY-RELATED MORTALITY COEFFICIENT)** **коэффициент материнской смертности от причин, связанных с беременностью)**

ორსულობასთან დაკავშირებული მიზეზებით გამოწვეული დედის სიკვდილის
შემთხვევათა რაოდენობა * 100000

ცოცხალშობილთა რაოდენობა

64. **სიცოცხლის მოსალოდნელი საშუალო ხანგრძლივობა (ESTIMATED LIFE EXPECTANCY)** **Ожидаемая продолжительность жизни** – სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობაში იგულისხმება გარკვეული ასაკის მოსახლეობის დარჩენილი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა (წლებში). მოცემული მაჩვენებლის გაანგარიშება ხდება სიკვდილიანობის ასაკობრივი მაჩვენებლების საფუძველზე მოცემული მომენტისათვის ე.წ. სიკვდილიანობის ტაბულის (დარჩენილი სიცოცხლე) რეალური ან ჰიპოთეტური თაობისთვის. სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა შეიძლება განისაზღვროს რასობრივი კუთვნილების, სქესის და სხვა პარამეტრებით, რომელიც გამოიყენება სიკვდილიანობის მაჩვენებლის გამოსაანგარიშებლად მოსახლეობის მოცემული ჯგუფისთვის. დარჩენილი სიცოცხლის ტაბულები ჰიპოთეტური თაობისათვის, რომელიც გამოიყენება დემოგრაფიაში, იწოდება აგრეთვე დარჩენილი სიცოცხლის მიმდინარე ტაბულებად. ანსხვავებენ დარჩენილი სიცოცხლის სრულ ცხრილებს, რომლებშიც მაჩვენებლების მნიშვნელობები მოყვანილია ასაკის ყოველი წლისათვის, და მოკლე ცხრილებს, რომლებშიც ამ მაჩვენებლების მნიშვნელობები მოყვანილია ჩვეულებისამებრ ხუთი და ათწლიანი ასაკობრივი ინტერვალით.
65. **ჯანმრთელი სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა (HEALTH ADJUSTED LIFE EXPECTANCY - HALE, Ожидаемая продолжительность здоровой жизни)** - მოსახლეობის ჯანმრთელობის ჯამური ინდიკატორი (ასაკობრივ და სქესობრივ ჭრილში), რომელიც ასახავს ჯანმრთელი სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის ექვივალენტს წლებში და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და სიკვდილიანობის საშუალო მონაცემებს ეფუძნება.
66. **ინვალიდობის შედეგად დაკარგული წლები (DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEARS - DALYs, жизни, скорректированные по нетрудоспособности)** - მოსახლეობის დონეზე ნაადრევი სიკვდილის მიზეზით და კონკრეტული დაავადების შედეგად დაინვალიდების გამო დაკარგული სიცოცხლის წლების საერთო რაოდენობა. ეფუძნება ინფორმაციას სიკვდილის გამომწვევი მიზეზების შესახებ და ჯანმრთელობის ძირითადი პრობლემების ეპიდემიოლოგიურ შეფასებებს.
67. **ხარისხიანი ცხოვრების წლები (QUALITY ADJUSTED LIFE YEAR (QALY), жизни, скорректированные по качеству здоровья)** - ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხის მაჩვენებელი. გამოიყენება სამედიცინო ჩარევებზე დანახარჯების შესაფასებლად.
68. **რეპროდუქციული ჯანმრთელობა (REPRODUCTIVE HEALTH, репродуктивное здоровье)** – სრული ფიზიკური, ფსიქიკური და სოციალური კეთილდღეობის მდგომარეობა, რომელიც დაკავშირებულია რეპროდუქციულ სისტემასთან, მის ფუნქციებსა და პროცესებთან. იგი გულისხმობს, რომ ადამიანს უნდა ჰქონდეს გამრავლების უნარი და თავისუფალი არჩევანის უფლება – როდის და რა სიხშირით გამოიყენოს ეს უნარი. ეს უკანასკნელი მოიცავს ქალებისა და მამაკაცების უფლებას, ჰქონდეთ ინფორმაცია და ხელი მიუწვდებოდეთ ოჯახის დაგეგმვის უსაფრთხო, ეფექტურ, მოსახერხებელ და მისაღებ მეთოდებზე მათი არჩევანის შესაბამისად, ისევე როგორც შობადობის რეგულირების სხვა არაკანონსაწინააღმდეგო მეთოდებზე და ჯანდაცვის სათანადო სამსახურებზე, რომლებიც ქალებს მისცემს უსაფრთხო ორსულობის და მშობიარობის საშუალებას, წყვილებს კი, საუკეთესო შესაძლებლობას, ჰყავდეთ ჯანმრთელი შვილი.
69. **ძუძუთი კვება (BREASTFEEDING, грудное вскармливание)** - ჩვილის გამოკვება დედის ან დონორის რძით (სარძევე ჯირკვლის მოწოვით ან გამოწველით).
70. **ექსკლუზიური ძუძუთი კვება (EXCLUSIVE BREASTFEEDING, эксклюзивное грудное вскармливание)** - ჩვილის გამოკვება მხოლოდ დედის ან დონორის რძით. ჩვილი არ უნდა იღებდეს სხვა რომელიმე თხიერ ან მყარ ნივთიერებებს, გარდა ვიტამინების, მინერალური დანამატებისა ან წამლების შემცველი წვეთებისა.
71. **უპირატესად ძუძუთი კვება (PREDOMINANT BREASTFEEDING, преимущественно грудное вскармливание)** - ჩვილის გამოკვება უპირატესად დედის ან დონორის რძით. შესაძლებელია წყლის

ან წელისშემცველი სითხეების, ხილის წვენების და ვიტამინების, მინერალური დანამატებისა ან წამლების შემცველი სითხეების და წვეთების მიღება.

72. **დამატებითი კვება (COMPLEMENTARY FEEDING)** - დედის რძესთან ერთად წვილის დამატებითი კვება.

73. **კონტრაცეფციის გამოყენების მაჩვენებელი (CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE)** - **Коэффициент использования контрацепции**

15-49 წლის ასაკის ქალთა რაოდენობა, რომელიც იყენებს კონტრაცეფციის ნებისმიერ (თანამედროვე ან ტრადიციულ) მეთოდს * 100000

ფერტილური ასაკის ქალების რაოდენობა

74. **დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნა კონტრაცეფციაზე (UNMET NEED FOR CONTRACEPTION, Неудовлетворенный спрос на контрацепцию)**

რეგისტრირებულ და არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი ქალების რაოდენობა, რომელთაც ოჯახის დაგეგმვისათვის დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილება გააჩნიათ * 100

რეპროდუქციული ასაკის (15-49 წლის) ქალთა რაოდენობა, რომლებიც იმყოფებიან რეგისტრირებულ და არარეგისტრირებულ ქორწინებაში

75. **მოზარდთა ორსულობის მაჩვენებელი (ADOLESCENT PREGNANCY RATE)** - **Зател подростковой беременности**

15-19 წლის ასაკის ქალების მიერ დაბადებულ ცოცხალშობილთა რაოდენობა + იმავე ასაკის ქალთა მიერ გაკეთებული აბორტების რაოდენობა * 1000

15-19 წლის ასაკის ქალთა რაოდენობა

76. **აბორტი (ABORTION)** - **Аборт** - მუცლის მოწყვეტა, მოშლა, ორსულობის ნაადრევი შეწყვეტა და საშვილოსნოდან ნაყოფის გამოძევება ორსულობის 22 კვირის შესრულებამდე. აბორტი შეიძლება იყოს სპონტანური და ხელოვნური. **სპონტანური აბორტი** - ვითარდება ქალის ორგანიზმზე ან ნაყოფზე უშუალო ზემოქმედების გარეშე. მისი გამოწვევა მიზეზებია ქალისა და ნაყოფის ფიზიკური და ფსიქიკური ტრავმები. **ხელოვნური აბორტი** - გამოწვეულია ქალის ორგანიზმზე ან ნაყოფზე უშუალო ზემოქმედებით (წამლების მიღება, საშვილოსნოში ინსტრუმენტული ჩარევა ან რაიმე ნივთიერების შეყვანა). ხელოვნური აბორტი უარყოფითად მოქმედებს ქალის ჯანმრთელობაზე, იწვევს უნაყოფობას. განსაკუთრებით მავნეა აბორტი პირველი ორსულობის დროს.

77. **აბორტის ზოგადი კოეფიციენტი (CRUDE ABORTION RATE)** - **Средний коэффициент абортов** - წარმოადგენს წლის განმავლობაში გაკეთებული აბორტების რაოდენობის შეფარდებას ფერტილური ასაკის (15-49 წ.) ქალების რაოდენობასთან. გამოისახება პრომილეითი (%), 1000 ქალზე გაანგარიშებით.

78. **აბორტის სიხშირის კოეფიციენტი (ABORTION FREQUENCY RATE)** - **Коэффициент частоты абортов** - წარმოადგენს წლის განმავლობაში გაკეთებული აბორტების რაოდენობის შეფარდებას იმავე პერიოდში მშობიარობათა რაოდენობასთან. გვიჩვენებს აბორტების რაოდენობას ყოველ 100 მშობიარობაზე.

79. **აბორტის ასაკობრივი კოეფიციენტი (AGE-SPECIFIC ABORTION RATE)** - **Возрастной коэффициент абортов** - წარმოადგენს წლის განმავლობაში გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფის ქალებისთვის აბორტების რაოდენობის შეფარდებას იმავე ასაკობრივი ჯგუფის ქალების საერთო რაოდენობასთან.

80. **აბორტის ჯამობრივი კოეფიციენტი (TOTAL INDUCED ABORTION RATE)** - **Общий коэффициент абортов** - ხელოვნური აბორტების ჯამური მაჩვენებელი ასახავს, საშუალოდ რა რაოდენობის აბორტს გაიკეთებდა ქალი ცხოვრების მანძილზე, იმ პირობით, რომ მთელი პერიოდის განმავლობაში აბორტის ასაკობრივი კოეფიციენტის დონეები გამოანგარიშების დროისათვის უცვლელი დარჩებოდა. გამოითვლება აბორტების ასაკობრივი მაჩვენებლების შეჯამებით.

81. **ჩატარებული ოპერაციების მაჩვენებელი 100000 მოსახლეზე (SURGICAL ACTIVITY RATE PER 100000 POPULATION)** - **Показатель хирургической активности на 100000 населения**

ჩატარებული ქირურგიული ოპერაციების რაოდენობა * 100000

მოსახლეობის რაოდენობა

82. **საკეისრო კვეთების მაჩვენებელი (პროცენტი) მშობიარობების საერთო რაოდენობიდან (PERCENT OF CESAREAN SECTIONS FROM ALL DELIVERIES)** - **Процент кесаревых сечений из общего числа родов**

საკეისრო კვეთების რაოდენობა * 100

83. საკეისრო კვეთების მაჩვენებელი 1000 ცოცხალშობილზე (CESAREAN SECTIONS RATE PER 1000 LIVE BIRTHS)
Показатель кесаревых сечений на 1000 живорожденных)

საკეისრო კვეთების რაოდენობა * 1000

ცოცხალშობილთა საერთო რაოდენობა

84. სავალდებულო წესით რეგისტრირებული დაავადება (OBLIGATORY REGISTRATION DISEASE)
подлежащее обязательной регистрации) – დაავადება, სოციალურად საშიში თავისი სიმძიმის, გავრცელების ან დაავადების გადაცემის მაღალი ხარისხის გამო, რომლის გამოვლენის ყოველი შემთხვევის შესახებ სამედიცინო მუშაკები ვალდებული არიან აცნობონ ჯანდაცვის მართვის ადგილობრივ ან ცენტრალურ ორგანოებს.
85. აივ ინფექციის ინციდენტობა (HIV INCIDENCE)
Показатель новых случаев ВИЧ инфицирования)

აივ ინფექციის ახალ შემთხვევათა რაოდენობა * 100000

მოსახლეობის რაოდენობა

86. გადაცემის გზების მიხედვით აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების პროცენტული განაწილება (HIV NEW CASES DISTRIBUTION BY WAYS OF TRANSMISSION)
Процентное распределение новых случаев ВИЧ по путям передачи)

გადაცემის კონკრეტული გზის მიხედვით აივ ინფექციის ახალ შემთხვევათა რაოდენობა * 100

აივ ინფექციის ახალ შემთხვევათა რაოდენობა

87. შიდსის ინციდენტობა (AIDS INCIDENCE)
Заболеваемость СПИДом, новые случаи)

შიდსის ახალი შემთხვევების რაოდენობა * 100000

მოსახლეობის რაოდენობა

88. ორსულთა აივ ინფექციაზე ტესტირებით მოცვის მაჩვენებელი (HIV TESTING COVERAGE RATE AMONG PREGNANT WOMEN)
Квот беременных ВИЧ тестированием)

აივ ინფექციაზე ტესტირებულ ორსულთა რაოდენობა * 100

აღრიცხვაზე აყვანილ ორსულთა რაოდენობა

89. აივ ინფექციით დაავადებულ ორსულთა პროცენტი აივ ინფექციაზე გამოკვლეულ ორსულებში (PERCENTAGE OF HIV POSITIVE PREGNANT WOMEN AMONG HIV TESTED PREGNANT WOMEN)
инфицированных беременных среди ВИЧ тестированных беременных)

აივ ინფექციის შემთხვევათა რაოდენობა ორსულებში * 100

აივ ინფექციაზე გამოკვლეულ ორსულთა რაოდენობა

90. აივ ინფიცირებული ორსულების ანტირეტროვირუსული პროფილაქტიკური მეურნალობით მოცვის მაჩვენებელი (ANTIRETROVIRAL PREVENTION THERAPY COVERAGE AMONG HIV-INFECTED PREGNANT WOMEN)
АРВ профилактическим лечением ВИЧ инфицированных беременных)

აივ ინფიცირებული ორსული ქალების რაოდენობა, რომლებსაც განვლილი 1 წლის

განმავლობაში ჩაუტარდათ პროფილაქტიკური არე მეურნალობა * 100

ამავე წლის მანძილზე გამოვლენილი აივ ინფიცირებული ორსული ქალების რაოდენობა (მშობიარობის დროს გამოვლენილი ორსული ქალების ჩათვლით)

91. აივ ინფიცირებული დედებისაგან დაბადებული აივ ინფიცირებულ ბავშვთა პროცენტი (PERCENTAGE OF HIV POSITIVE CHILDREN, BORN BY HIV INFECTED MOTHERS)
ВИЧ инфицированных детей, рожденных ВИЧ инфицированными матерями)

$T * (1 - E) + (1 - T) * V$

სადაც:

T = ანტირეტროვირუსული მეურნალობით მოცული აივ ინფიცირებული ორსული ქალების პროცენტი;

V = მეურნალობის გარეშე დედიდან შვილზე აივ ინფექციის გადაცემის მაჩვენებელი;

E = ჩატარებული მეურნალობის ეფექტურობა.

V და E შეიძლება შეთანხმებით გამოყენებული იქნას მნიშვნელობები, შესაბამისად, 25% და 50%.

92. აივ ინფექციით დაავადებულ დონორთა პროცენტი აივ ინფექციაზე გამოკვლეულ დონორებში (PERCENT OF HIV INFECTED DONORS) (Процент ВИЧ инфицированных доноров из общего числа доноров)
- $$\frac{\text{აივ ინფექციით დაავადებულ დონორთა რაოდენობა} * 100000}{\text{აივ ინფექციაზე გამოკვლეულ დონორთა რაოდენობა}}$$
93. აივ ინფექციით დაავადებულთა პროცენტი ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში (PERCENT OF HIV INFECTED AMONG TB INFECTED PATIENTS) (Процент случаев ВИЧ среди больных туберкулезом)
- $$\frac{\text{აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების რაოდენობა}}{\text{ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტებში} * 100000}$$
94. სიფილისით ავადობის მაჩვენებელი (INCIDENCE OF SYPHILIS) (Заболеваемость сифилисом, новые случаи)
- $$\frac{\text{სიფილისის ახალი შემთხვევების რაოდენობა} * 100000}{\text{მოსახლეობის რაოდენობა}}$$
95. გონოკოკური ინფექციით ავადობის მაჩვენებელი (INCIDENCE OF GONOCOCCAL INFECTION, Заболеваемость гонококковой инфекцией, новые случаи)
- $$\frac{\text{გონოკოკური ინფექციის ახალი შემთხვევების რაოდენობა} * 100000}{\text{მოსახლეობის რაოდენობა}}$$
96. სიფილისით ავადობის მაჩვენებელი ორსულ ქალებში (INCIDENCE OF SYPHILIS AMONG PREGNANT WOMEN, Заболеваемость сифилисом среди беременных)
- $$\frac{\text{ახლადგამოვლენილი სიფილისით დაავადებული ორსულების რაოდენობა} * 100000}{\text{სიფილისზე ტესტირებული ორსულების რაოდენობა}}$$
97. ტრიქომონიაზით ავადობის მაჩვენებელი (INCIDENCE OF TRICHOMONIASIS) (Заболеваемость трихомониазом)
- $$\frac{\text{ტრიქომონიაზის ახალი შემთხვევების რაოდენობა} * 100000}{\text{მოსახლეობის რაოდენობა}}$$
98. ტრიქომონიაზით ავადობის მაჩვენებელი რეპროდუქციული ასაკის ქალებში (INCIDENCE OF TRICHOMONIASIS AMONG WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE, Заболеваемость трихомониазом среди женщин репродуктивного возраста)
- $$\frac{\text{ახლადგამოვლენილი ტრიქომონიაზით დაავადებული რეპროდუქციული ასაკის ქალების რაოდენობა} * 100000}{\text{რეპროდუქციული ასაკის ქალების რაოდენობა}}$$
99. ქლამიდიოზით ავადობის მაჩვენებელი (INCIDENCE OF CHLAMIDIOSIS) (Заболеваемость хламидиозом)
- $$\frac{\text{ქლამიდიოზის ახალი შემთხვევების რაოდენობა} * 100000}{\text{მოსახლეობის რაოდენობა}}$$
100. ქლამიდიოზით ავადობის მაჩვენებელი რეპროდუქციული ასაკის ქალებში (INCIDENCE OF CHLAMIDIOSIS AMONG WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE, Заболеваемость хламидиозом среди женщин репродуктивного возраста)
- $$\frac{\text{ახლადგამოვლენილი ქლამიდიოზით დაავადებული რეპროდუქციული ასაკის ქალების რაოდენობა} * 100000}{\text{რეპროდუქციული ასაკის ქალების რაოდენობა}}$$
101. მგბ(+) ავადობა (NOTIFICATION RATE FOR NEW SMEAR-POSITIVE CASES) (случаи БК+)
- $$\frac{\text{რეგისტრირებული ახალი მგბ(+) შემთხვევები} * 100000}{\text{მოსახლეობის რაოდენობა}}$$
102. ახალი მგბ(+) შემთხვევების გამოვლენის მაჩვენებელი (CASE DETECTION RATIO OF NEW SMEAR-POSITIVE CASES, Показатель выявления новых БК+ случаев) - შემთხვევათა გამოვლენის მაჩვენებელი

წარმოადგენს გამოვლენილი ახალი მგბ(+) შემთხვევების რაოდენობის შეფარდებას პროგნოზირებულ ახალ მგბ(+) შემთხვევების რაოდენობასთან (თითოეული ქვეყნისათვის ახალი მგბ(+) შემთხვევების პროგნოზირებას ახორციელებს ჯანმო). ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამის ეფექტურობის შეფასებისათვის. ტუბერკულოზთან ბრძოლის წარმატებული პროგრამის შემთხვევაში იგი, ჯანმო-ს რეკომენდაციების შესაბამისად, 70%-ს აღემატება.

წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ახალი მგბ(+) შემთხვევები * 100

პროგნოზირებული მგბ(+) შემთხვევები

103. ტუბერკულოზის წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (TB VACCINATION COVERAGE) **წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (TB VACCINATION COVERAGE) წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (TB VACCINATION COVERAGE) წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (TB VACCINATION COVERAGE)**

1 წლამდე ასაკში ტუბერკულოზის წინააღმდეგ იმუნიზებულ ბავშვთა რაოდენობა * 100

1 წლამდე ბავშვთა რაოდენობა

104. დტპ-3 იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (DPT3 VACCINATION COVERAGE) **დტპ-3 იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (DPT3 VACCINATION COVERAGE) დტპ-3 იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (DPT3 VACCINATION COVERAGE) დტპ-3 იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (DPT3 VACCINATION COVERAGE)**

1 წლამდე ასაკში დტპ-3 იმუნიზებულ ბავშვთა რაოდენობა * 100

1 წლამდე ბავშვთა რაოდენობა

105. წითელას წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (MEASLES VACCINATION COVERAGE) **წითელას წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (MEASLES VACCINATION COVERAGE) წითელას წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (MEASLES VACCINATION COVERAGE) წითელას წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (MEASLES VACCINATION COVERAGE)**

2 წლამდე ასაკში წითელას წინააღმდეგ იმუნიზებულ ბავშვთა რაოდენობა * 100

2 წლამდე ბავშვთა რაოდენობა

106. პოლიომიელიტის წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (POLIO VACCINATION COVERAGE) **პოლიომიელიტის წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (POLIO VACCINATION COVERAGE) პოლიომიელიტის წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (POLIO VACCINATION COVERAGE) პოლიომიელიტის წინააღმდეგ იმუნიზაციით მოცვის მაჩვენებელი (POLIO VACCINATION COVERAGE)**

1 წლამდე ასაკში პოლიომიელიტის წინააღმდეგ იმუნიზებულ ბავშვთა რაოდენობა * 100

1 წლამდე ბავშვთა რაოდენობა

107. B ჰეპატიტის (3 დოზა) აცრებით მოცვის მაჩვენებელი (HPB VACCINATION COVERAGE) **B ჰეპატიტის (3 დოზა) აცრებით მოცვის მაჩვენებელი (HPB VACCINATION COVERAGE) B ჰეპატიტის (3 დოზა) აცრებით მოცვის მაჩვენებელი (HPB VACCINATION COVERAGE) B ჰეპატიტის (3 დოზა) აცრებით მოცვის მაჩვენებელი (HPB VACCINATION COVERAGE)**

1 წლამდე ასაკში B ჰეპატიტის (3 დოზა) წინააღმდეგ იმუნიზებულ ბავშვთა რაოდენობა * 100

1 წლამდე ბავშვთა რაოდენობა

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების სტატუსი გვალვისგან დაზარალებულ საქართველოს ექვს რეგიონში 2000 - 2001 წელი, საბოლოო ანგარიში, თბილისი, 2002.
2. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2004, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2005.
3. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2005, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2006.
4. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2006, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2007.
5. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2007, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2008.
6. ჯანმრთელობის დაცვა, სტატისტიკური ცნობარი, საქართველო 2008, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2009
7. საქართველოს სტატისტიკური წელიწადეული, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, თბილისი, 2005.
8. საქართველოს სტატისტიკური წელიწადეული, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, თბილისი, 2006.
9. საქართველოს სტატისტიკური წელიწადეული, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, თბილისი, 2007.
10. საქართველოს სტატისტიკური წელიწადეული, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი, თბილისი, 2008.
11. წულაძე გ., მაღლაფერიძე ნ., ვადაჭკორია ა. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარება, თბილისი, 2002.
12. დემოგრაფიული მოკლე ენციკლოპედიური ლექსიკონი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, დემოგრაფიული და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი, თბილისი, 2005.
13. ვასაძე ო., ჯანელიძე ც., კობალაძე ლ., ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი, თბილისი, 2002.
14. ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასება, საქართველო, 2009.
15. დაავადებათა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების საერთაშორისო სტატისტიკური კლასიფიკაცია, მე-10 გადახედვა, 1995.
16. რეპროდუქციული ასაკის სიკვდილიანობის კვლევა, საქართველო, 2008, ნაწილი 1, 2.
17. DEMOGRAPHIC OVERVIEW OF GEORGIA, G. TSULADZE ET AL, TBILISI, 2002.
18. ATLAS OF HEALTH IN EUROPE, WHO, 2008.
19. INTRODUCTION TO PRIMARY HEALTH CARE IN GEORGIA, DFID GEORGIA PRIMARY HEALTH CARE REFORM SUPPORT PROGRAMME 2003-2006, VOL.1.
20. MATERNAL HEALTH EPIDEMIOLOGY, CDC ATLANTA, 2001.
21. REPRODUCTIVE HEALTH SURVEY, GEORGIA, 1999-2000.
22. REPRODUCTIVE HEALTH SURVEY, GEORGIA, 2005.
23. HEALTH QUESTIONS ABOUT THE CAUCASUS AND CENTRAL ASIA, WHO, 2009.
24. NHA (2001-2008), [HTTP://WWW.MOH.GOV.GE/PAGE.PHP?117](http://www.moh.gov.ge/page.php?117)
25. STATE-OF-THE-SCIENCE CONFERENCE STATEMENT. CESAREAN DELIVERY ON MATERNAL REQUEST, NI OBSTET GYNECOL 107: 1386-97, 2006.
26. THE EUROPEAN HEALTH REPORT, WHO, 2009.
27. WORLD HEALTH STATISTICS, WHO, 2009.
28. MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS IN GEORGIA, TBILISI, 2004.
29. Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, ВОЗ, 2005.
30. Скотт В., Человеческое развитие в зеркале статистики, как читать цифры?, Братислава, 2006.
31. Социальный Мониторинг «ИННОЧЕНТИ», UNICEF, 2003.
32. Социальный Мониторинг «ИННОЧЕНТИ», UNICEF, 2004.
33. Проект MONEE - ЦВЕ/СНГ/Балтия, Региональный мониторинговый доклад, №5, UNICEF, 1998.
34. Проект MONEE - ЦВЕ/СНГ/Балтия, Региональный мониторинговый доклад, №7, UNICEF, 2000.

35. Мониторинг выполнения Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, ЮНЭЙДС, 2005.
36. [HTTP://HDR.UNDP.ORG/DOCS/STATISTICS/INDICES/TECHNOTE](http://hdr.undp.org/docs/statistics/indices/technote)
37. [HTTPS://WWW.MEDICINE.USASK.CA/RESEARCH/HEALTH-RESEARCH-GROUPS](https://www.medicine.usask.ca/research/health-research-groups)