

საინფორმაციო ფურცელი ჯანდაცვის მუშაკებისათვის

პნევმოკოკური ინფექციის საინააღმდეგო ვაქცინა (13 ვალენტია)

პოლისაქარიდული კონიუგირებული, ადსორბირებული ვაქცინაა, ერთი დოზა (0.5 მლ) შეიცავს 2,2 მკგ 11, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F და 4,4 მკგ 6B სეროტიპების პოლისაქარიდებს. ვაქცინა თხევადია და აცრის ჩატარების წინ აუცილებელია ფლაკონის შენჯღრევა ერთგვაროვანი შიგთავსის მიღებამდე.

ვაქცინაციის სქემა

აცრა ტარდება 2, 4, 12 თვის ასაკში, კურსი არის სამდობიანი:

- პირველ და მეორე აცრას შორის მინიმალური ინტერვალი არის 8 კვირა;
- მეორე და მესამე დოზებს შორის მინიმალური ინტერვალი არის 6 თვე;

არავაქცინირებული ჩვილები და ბავშვები – 7 თვე და უფროსი ასაკი:

- 7-11 თვის ასაკში ვაქცინაციის კურსი არის სამდობიანი – ორი პირველადი აცრა კეთდება მინიმალური 4 კვირის ინტერვალით. მესამე აცრა უნდა გაკეთდეს სიცოცხლის მეორე წელს, მეორე აცრიდან მინიმალური 8 კვირის ინტერვალით;
- 12 თვე – 5 წლის ასაკში ვაქცინაციის კურსი არის ორდობიანი. დოზებს შორის დასაშვებია მინიმალური ინტერვალი 8 კვირა.

საინექციო დოზა

ერთი საინექციო დოზა შეადგენს 0,5 მლ-ს.

ინექციის ადგილი

აცრა კეთდება კუნთში:

- 2 წლამდე ასაკის ბავშვებში - ბარძაყის გარეთა ანტეროლატერალურ ზედაპირზე;
- უფროს ასაკის ბავშვებსა და მოზრდილებში - დელტისებული კუნთის ზედა მესამედში;

პნევმოკოკური ინფექციის საინააღმდეგო ვაქცინის უსაფრთხოება და იმუნიზაციის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები

პნევმოკოკური კონიუგირებული ვაქცინა უსაფრთხოა ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის. ვაქცინით გამოწვეული მძიმე გვერდით მოვლენები ძალზედ იშვიათია. მსუბუქი გვერდითი მოვლენები, როგორცაა რეაქციები ინექციის ადგილზე აღინიშნება ვაქცინირებულების 10% -ში. ცხელება ვლინდება 1%-ზე ნაკლებ ვაქცინირებულში.

უპრევენება:

- მძიმე ალერგიული რეაქცია ვაქცინის წინა დოზაზე ან ვაქცინის კომპონენტზე.

გაფრთხილება:

- საშუალო სიმძიმის ან მძიმე მწვავე დაავადება ტემპერატურით ან მის გარეშე – ვაქცინაცია უნდა გადაიდოს გამოჯანმრთელებამდე.

შენახვის პირობები

ვაქცინა ინახება +2°C - +8°C ტემპერატურაზე.

წყაროები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. იმუნიზაცია პრაქტიკაში: პრაქტიკული იმუნიზაციის სახელმძღვანელო სამედიცინო პერსონალისთვის

<https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-practice-a-practical-guide-for-health-staff>

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 16 სექტემბრის №01-60/ნ ბრძანება; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-51/ნ

<https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4869455?publication=0>