

ვინ უნდა აიცრას წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინით ?

- ✓ ნებისმიერი აუცრელი და/ან არასრულად აცრილი პირი, განსაკუთრებით თუ მიეკუთვნება 20-40 წლის ასაკობრივ ჯგუფს;
- ✓ წითელათი ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირები;

როდის არ შეიძლება აცრის ჩატარება ?

აცრა არ ტარდება:

- პირებში, რომელთაც ჰქონდათ მძიმე ალერგიული რეაქცია ვაქცინის წინა დოზაზე ან ვაქცინის კომპონენტზე;
- იმუნოდეფიციტის მქონე პირებში;
- ორსულებში (აცრა უნდა ჩატარდეს 3 თვით ადრე ორსულობამდე);
- პირებში, რომელთაც აქვთ არაგანკურნებული აქტიური ტუბერკულოზი;

რამდენად უსაფრთხოა წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ?

- ✓ ვაქცინა უსაფრთხოა და გამოიყენება მსოფლიოს 150-ზე მეტ ქვეყანაში.
- ✓ საქართველოში სახელმწიფოს მიერ ხდება მხოლოდ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ პრეკვალიფიცირებული მაღალი ხარისხის ვაქცინების შეძენა.

შესაძლებელია თუ არა წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინაციის

ჩატარება ლაქტაციის პერიოდში? - დიახ, შესაძლებელია.

რა ღირს ვაქცინაცია? - ვაქცინაციას უფასოდ უზრუნველყოფს სახელმწიფო.

სად შეგიძლიათ ჩაიტაროთ აცრა ?

ვაქცინაცია შესაძლებელია პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში; დამატებით დაწესებულებები, სადაც შეგიძლიათ ჩაიტაროთ ვაქცინაცია:

<https://www.moh.gov.ge/ka/news/4252/>

ვაქცინაცია წითელასაგან თავის დაცვის ერთადერთი საშუალებაა!

შეიტანე შენი ნვლილი საკუთარი თავისა და გარშემოცოფთა დასაცავად!



დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნული ცენტრი

GEORGIAN NATIONAL CENTER FOR DISEASE
CONTROL AND PUBLIC HEALTH