

საინფორმაციო ფურცელი ჯანდაცვის მუშაკებისათვის

პაპილომავირუსის სანიმალდებო ვაქცინა

ოთხვალენტიანი აპვ ვაქცინა თეთრი ფერის გაუმჭვირვალე სითხეა, რომელიც შეიცავს პაპილომავირუსის 6, 11, 16 და 18 ტიპების დამუშავებულ და გასუფთავებულ L1 სტრუქტურის ცილებს. ვაქცინის ერთი საინექციო დოზა (0.5 მლ) შეიცავს აპვ LI ცილას შემდეგი რაოდენობებით: ტიპი 6 (20 მკგ); ტიპი 11 (40 მკგ); ტიპი 16 (40 მკგ); ტიპი 18 (20 მკგ).

ვაქცინაციის სქემა

აცრა ტარდება 10 - 11 - 12 წლის გოგონების ასაკობრივ ჯგუფში, აცრების კურსი არის ორდობიანი, აცრებს შორის მინიმალური ინტერვალია 6 თვე. ვაქცინაციის დანყების მინიმალური ასაკია 9 წელი.

15 წლამდე ასაკის გოგონების აპვ ვაქცინაციის კურსი არის ორ დობიანი. მინიმალური ინტერვალი დობებს შორის არის 6 თვე.

15 წლის და უფროსი ასაკის გოგონებში ვაქცინაციის კურსი არის 3 დობიანი (0, 2 და 6 თვე). პირველ და მეორე დობას შორის მინიმალური ინტერვალი შესაძლებელია იყოს 1 თვე, ხოლო მეორე და მესამე დობას შორის 3 თვე.

საინექციო დოზა

ერთი საინექციო დოზა შეადგენს 0,5 მლ-ს.

ინექციის ადგილი

აცრა კეთდება კუნთში, დელტისებური კუნთის ზედა მესამედზე.

პაპილომავირუსის სანიმალდებო ვაქცინის უსაფრთხოება და იმუნიზაციის შემდგომ განვითარებული არასასურველი მოვლენები

ვაქცინას აქვს უსაფრთხოების მაღალი პროფილი. მძიმე რეაქციებიდან იშვიათად შეიძლება აღინიშნოს ანაფილაქსია (1,7 -2,6 მილიონ დოზაზე). მსუბუქი რეაქციებიდან შეიძლება აღინიშნოს ინექციის ადგილზე სინითლე, შეშუპება და მტკივნეულობა, რომელიც მკურნალობის გარეშე გაივლის. ასევე შეიძლება აღინიშნოს ტემპერატურის მომატება, თავბრუსხვევა და გულისრევა. გულის ნასვლა მოზარდებში ცნობილი მოვლენაა, რომელიც შეიძლება განვითარდეს ნებისმიერი ინექციის დროს, ამიტომ ვაქცინაციისას და ვაქცინაციიდან 15 წუთის განმავლობაში მოზარდი უნდა იყოფებოდეს მჭიდროდ მდომარეობაში.

უკუჩვენება:

მძიმე ალერგიული რეაქცია ვაქცინის წინა დოზაზე ან ვაქცინის რომელიმე კომპონენტზე;

გაფრთხილება:

საშუალო სიმძიმის ან მძიმე მწვავე დაავადება ტემპერატურით ან მის გარეშე – ვაქცინაცია უნდა გადაიდოს გამოჯანმრთელებამდე. ორსულობა;

შენახვის პირობები

ვაქცინა ინახება +2°C - +8°C ტემპერატურაზე.

ავრის ჩატარების წინ იხილეთ ვაქცინის თანმხლები ინსტრუქცია

წყაროები

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია. იმუნიზაცია პრაქტიკაში: პრაქტიკული იმუნიზაციის სახელმძღვანელო სამედიცინო პერსონალისთვის

<https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-practice-a-practical-guide-for-health-staff>

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 16 სექტემბრის №01-60/ნ ბრძანება; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-51/ნ

<https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4869455?publication=0>

მასალა მომზადებულია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. აქ გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძლოა არ ასახავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.